



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Bonplandia. Zeitschrift fur die gesammte Botanik**

Hannover, C. Rmpler,

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/5823>

**j.7 (1859):** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27873>

Page(s): Page 241

Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz  
Library

Sponsored by: MSN

Generated 10 November 2023 4:56 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1639279i00027873.pdf>

This page intentionally left blank.



Hondura, ubi muris vetustis quoque insidet eosque mire ornat. Rarius, aquarum impetu devectum in torrentis glare. — Circa la Cueva del Conde prope Herdune. El Risco de America supra Valla del Gran-Rey.

Floret vere praecipue m. Aprili. In horto Regio botanico Berolinensi laete viget et, culturae minime impatiens, quotannis flores ostendit. Ex putcherrimis generis totius.

7. *Ae. Manriqueorum*, C. Bolle.

Fruticosum, 2—3-pedale, ramis glaberrimis robustis crassis divaricato-patentibus foliorum cicatricibus oblongis cinereo-fuscis conspicuis notatis, plantae quiescentis rosulis compactissimis incurvo-capitatis paris, demum apertis laxiusculis multo majoribus, foliis elongato-spathulatis sessilibus mucronatis glabris, margine dense ciliatis, nervo medio colorato saepe rubro-lineolatis, caulibus florigeris foliatis semipedalibus et ultra, corymbo thyrsoido brevi ramulis pedicellisque puberulis, calycis tomentoso-puberuli laciniis lanceolatis acutis, petalis oblongis retusis aureis, squamis nectariferis apice membranaceis ovaria glabra amplectantibus.

HAB. in Canaria Magna frequens: La Vega de S. Brigida. Barranco de Tenteniguada. El Dragonal. Monte Doramas.

Dicatum familiae nobili canariensi Maurique de Lara mihi conjunctissimae benevolaeque cujus in terris planta nostra provenit locumque proximi *Ae. holochrysi*, Webb et Berth. pro Canaria Magna tenere videtur.

8. *Ae. undulatum*, Webb et Berth. Phyt. canar. 1. p. 197. (inter species inquirendas incomplete descriptum) Sempervivum undulatum, Webb in hort. Milford. — *Ae. Youngianum*, Bourg. Pl. canar. No. 738 nec Webb et Berth.

Fruticosum, glabrum, trunco robusto ramoso, rosularum foliis spathulato-ovatis basi attenuatis mucronatis tenuibus crispato-undulatis dilute viridibus saepe rubentibus margine ciliatis ciliis densis mollissimis, caule florifero erecto foliato, foliis caulinis summis squamiformibus margine membranaceis, thyrso circ. 6" lato neque altiore, racemis squamato-bracteatis basi nudis floribus secundis 8-meris breviter pedicellatis, calycis laciniis triangulari-lanceolatis margine membranaceis acuminatis, petalis lanceolatis, obtusiusculis flavis saturatius carinatis, staminibus petalis brevioribus, squamis nectariferis qua-

dratis apice utrinque obtuse dentatis, ovariis oblongis intus leviter gibbosis glabris.

HAB. in Canariae Magnae rupestribus elatis ad basin jugi la Cumbre supra Tenteniguada. Florit Aprili et Majo.

9. *Ae. Saundersii*, C. Bolle.

Fruticulus humilis vix semipedalis e basi fere ramosissimus, trunco brevi subnodoso tenui glabro fusco, ramis dichotomis vel 4-fidis gracillimis horizontaliter expansis, infimis subnodosis, foliorum cicatricibus valde remotis oblongis brevissimis notatis, (ramis) dense glanduloso-pubescentibus lucide fuscis, rosulis numerosissimis per aestatem clausis arcte compactis cerasiformibus viscosis, demum apertis, tunc diametro 1-pollicari laete viridibus, foliis ovalibus sessilibus basi extus subgibbosis apice rotundatis muticis planis crassiusculis, inferioribus cujusve rosulae cochleariformi-concavis, omnibus pilis albidis densissime glanduloso-puberulis viscosis dimidium pollicem circ. longis, panicula brevi laxa vix e foliis emersa, floribus majusculis, calyce 16-partito viscoso-hirto, laciniis linearibus petalis dimidio brevioribus, his late lanceolatis 3-nerviis pallide luteis, carpellis ciliolatis in stylum longiusculum elongatis.

HAB. in Gomerae Barranco de la Laja rupibus siccis adnatum, jam paulo retro la Hacienda de Honduras incipiens.

Planta habitu a caeteris Aeoniiis longe aliena.

10. *Ae. viscatum*, Webb in Bourg. Pl. canar. No. 736. (nomen sine descriptione.)

Fruticosum, ramososissimum, 1-pedale, ramis tortuosis diffusis, basi deflexis adscendentibus, cortice rufo vel nigrescente longitudinaliter rimoso, foliorum cicatricibus vix ullis in ramulis novellis angustissime linearibus, ramulis viridibus sub lente puberulis, foliorum rosulis laxis viscosissimis, foliis latiuscule lanceolato spathulatis acutis basi in petiolum longiusculum attenuatis subtus carinatis sursum convexis succulentis glanduloso-puberulis, papillis crystallinis viscosissimis inductis laete viridibus, floribus paniculatis, calycis subcampanulati laciniis 12 linearibus apicem versus sensim attenuatis acutis incano-puberulis, petalis oblongo-linearibus apice aristatis aureis, carpellis antice rectis erectis.

HAB. in Gomerae rupestribus calidis: Barranco de S. Sebastian; Hermigna, abunde. Floret aestate.



The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 241]

241

^

|

Hondura, ubi niuris veluslis qioqjie in-  
sidel eosque inire ornat. Rariis, iuniaruii  
impolu (levecliiMi in torrenlis oiaiea.  
Circa la Cueva ilel Condé prope Her-  
dune. El Risco de America siipra  
Valla del Gran-Rey.  
Fiorel vere praecipue in. Aprili. In liorlū  
Regio bülanii'ü Berolinensi lade vigot el, cni-  
turac minime inipaliens, qnotanis ilures oslcndil.  
E.\ putcierrimis generi.s totius.

7. Ae. Ulanriqueorinn, C. Bolle.

Fruticosni, 2 — , '5-podalo, ranii.>< t;lal)erriniis

robn.stis crassis divarifalo-palcntilins füliornni  
cicatricibus obloiigis cinerco-fuscis conspicuis  
notalis, plantae qniescenlis rosulis coinpaclis-  
simis incurvo-capilatis paris, dennnnn aperti.s  
laxiusculis nuillo majoribus, foliis elongalo-spa-  
lhulalis sessilibus mucronatis glabris, margine

dense cillialis, nervo medio colorato .saepe  
rubro-lineolalis, caulibus florigris foliatis senii-  
pedalibus et ultra, corynibus tlyrsoideo brevi ra-  
mulis pedicellisque puberulis, calycis tonientoso-  
]uberuli lacini lanceolatis aculis, pelalis ob-  
longis retusis aureis, squamis neclariferis apico  
membranaceis ovaria glabra amplectantibus.

HAB. in Canaria Magna i're (Jucns : La Vcga  
de S. Brigida. Barranco de Tenteni-  
guada. El Dragonal. Monte Doramas.

Dicalum familiae nobili canariensi Maurique  
de Lara mihi conjunctissimae benevolaeque  
cujus in terris planis nostra provenit locum  
pro. xiii Ae. holochrysi, Webb et Bertl. i)ro  
Canaria Magna tenere videtur.

8. Ae. undulata Mi, Webb et Bertl. l'hyt.  
canar. 1. p. 177. [inter species iuppiendas in-  
conite descriplum) Seinprvivuni undulata,  
Webb in hort. Milford. — Ae. Youngianum,  
Bourg. Pl. canar. No. 738 nee Webb et Bertl.

Fruticosum, glabrum, lrunco robusto rainoso,  
rosularum foliis spathulato-ovalis basi attenuatis  
mucronatis tenuibus crisjialo- undulatis dilute  
viridibus saepe rubentibus margine ciliatis ciliis  
densis mullissimis, caule (origero erc clo l'olialo,  
foliis cauiinis summis squamiformibus margine

membranaceis, thyrsis circ. 10" lato netpie alliore,  
racemis squamato-bractealis basi nudis floribus  
secundis 8-meris breviter pedicellatis, calycis  
laciniis triangulari-lanceolatis margine mem-  
branaceis acuminalis, petalis lanceolatis, oblu-  
siusculis flavis saturatius carinatis, staminibus  
petalis brevioribus, squamis nectariferis (pia-  
dralis apice utrinque obtuse dentatis, ovario  
oblongo inclusit leviter gibbosis glabris.

HAB. in Canariis Magriis rupesibus elatis  
ad basin jugi la Cumbre! supra Tenle-  
niguada. Florit Aprili et Majo.

U. Ae. Saundersii, C. Bolle.

Fruticulus humilis 6-8 pedalis e basi  
ferax ramosissimus, truncis breviter nodosis leniter  
glabro fuscis, ramis didioliis vel 4-5-angulis ura-  
cillimis horizontaliter expansis, internodiis subnu-  
ditis, foliorum cicatricibus valde remotis ob-  
longis breviter sessilibus notatis, (ramis) dense glan-  
(Inioso-pubescentibus) Inca fuscis, rosulis  
numerissimis per aestivum clausis arcte com-  
pactis crassioribus viscosis, demum aperitis,  
tunc diametro 1-pollicari laete viridibus, foliis  
ovalibus sessilibus basi cuneatis subgibbosis apice  
rotundatis mucosis planis crassiusculis, inferioribus

cujnsve rosulac cochleariformi-concavis, Omnibus pilis albidis densissime glanduloso-puberulis viscosis dimidium pollicem circ. longis, panicula brevi laxa vix e foliis emersa, floribus majusculis, calyce IG-partito viscoso-lirto, laciniis linearibus petalis dimidio brevioribus, bis late lanceolatis 3-nerviis pallide luteis, carpellis ciliolatis in stylo longiusculum elongatis.

HAB. in Gomerac Barranco de la Laja rupibus siccis adnatum, jam paulo retro la Hacienda de Honduras incipiens.

Planta habitu a caeteris Aeonis longo alicna.

10. Ae. viscalum, Wcbb in Bourg. Pl. canar. No. 736. (nomen sine descriptione.)

Fruticosum, ramosissimum, 1-pedale, ramis tortuosis diffuis, basi deflexis adscendentibus, cortice riifo vel nigrescente longitudinaliter rimoso, foliorum cicatricibus vix vis in ramulis novellis angustissimis linearibus, ramulis viridibus sub lente tuberculatis, foliorum rosulis laxis viscosissimis, foliis latiuscule lanceolato spatulatis aculis basi in petiolum longiusculum attenuatis sublus carinatis sursum convexis succulentis glanduloso-puberulis, papillis crystallinis viscosissimis inductis lade viridibus, floribus pa-

niculatis, calycis subcampaniilati laciniis 12 li-  
nearibus apicem versus seiisim allcnalis aculis  
inraio - pubcrulis, petalis oblongo- linearibus  
apice arislalis aureis, carpcllis antice rcttis  
ereclis.

HAB. in Gomerae rupcsiribus calidis ; Bar-  
ranco de S. Sebastian; Hermigna,  
abunde. Fiorel aeslate.