

de la réunion de ceux de Tournefort et de Vaillant, deux rameaux, et des baies très bien conservées, dans un petit paquet, sur lequel étoit écrit de la main de Vaillant : *fruit de l'Arbutus folio non serrato. G. Bauh.*, qui est le nom que Tournefort donne à cet arbre. Les recherches que nous avons faites nous ont convaincu qu'elles lui appartiennent réellement.

Les baies qui sont rondes, très lisses, glabres et luisantes, sans aucune apparence d'aspérités, donnent un caractère essentiel qui distingue parfaitement cette espèce de l'Andrachne, dont les baies sont âpres et tuberculées. Ces deux espèces ont d'ailleurs des dissemblances dans la forme des feuilles et dans l'inflorescence.

Arbre de la grandeur d'un amandier, mais qui a plus de ressemblance avec le poirier, par la forme et la disposition de ses rameaux et de ses feuilles.

Tronc droit, rameaux nombreux, cylindriques, étalés, irréguliers; écorce très lisse, rougeâtre quand il s'en dépouille au milieu de l'été; celle qui la remplace est d'un beau verd pâle, et devient ensuite rousse. Feuilles éparses, pétiolées, ovales, ou ovales-mucronées, glabres, réticulées, toutes très entières, sans aucune crénelure. Fleurs aux sommités des rameaux, formant des grappes très glabres, feuillées, toujours droites, jamais réfléchies ni penchées. Fleurs presque sessiles, axillaires, ordinairement solitaires; pédoncules pas plus longs que la corolle. Calice monophylle, persistant, à cinq lobes, glabre. Corolle ovale-globuleuse, urcéolée, jaunâtre. Etamines, dix. Pistil; ovaire globuleux, glabre; style plus court que la corolle; stigmate obtus. Péricarpe; baie sphérique, très lisse, glabre et luisante, de la grandeur d'une cerise, à cinq loges polyspermes.

FLEURIT. Vers le milieu de l'été, jusqu'à l'automne. Les fruits mûrissent pendant l'hiver comme ceux de l'espèce précédente; mais nous ne savons pas s'ils ont la même qualité, et sont également bons à manger.

HABITE. Dans l'isle de Crète, au pied du mont Ida, dans les lieux secs, sur les rochers, sur le bord du chemin, entre les deux couvents d'Asomatos et Arcadi (1). On pourroit le cultiver et le multiplier de la même manière que l'Arbousier Andrachne. Il est certain qu'il n'a point encore été cultivé en France.

Cet arbre paroît être particulier à l'isle de Crète, et ne se trouve pas en d'autres lieux de la Grèce. Aucun voyageur n'en a parlé, depuis que Tournefort a parcouru ces belles et intéressantes contrées, a visité et décrit les ruines augustes de tant de villes fameuses, où l'on voit à chaque pas la demeure ou le tombeau d'un grand homme.

4. ARBUTUS Canariensis.

A. foliis lanceolatis, serratis; paniculis verticalibus, hispido-glutinosis.

ARBOUSIER de Canarie.

A. feuilles lancéolées, dentées en scie; à panicules verticales, diffuses, hispides.

Arbre ou arbrisseau qui a beaucoup de ressemblance avec l'Arbousier Unedo; mais qui en est bien distingué par sa panicule qui n'est pas inclinée, mais toujours droite, hispide et glutineuse; ses feuilles plus longues et glauques en dessous.

(1) « Le 10 juillet (1700) nous repassâmes à Asomatos, pour prendre notre bagage, et nous allâmes coucher à six milles de là, dans le couvent d'Arcadi. Nous y trouvâmes l'Arbousier de Grèce; cette plante que nous avions cherchée inutilement jusqu'alors nous fit un vrai plaisir: elle croit entre ces deux monastères, dans les fentes d'un rocher sur le grand chemin; c'est là un des meilleurs endroits de l'isle pour herboriser ». TOURNEFORT. *Voyage au Levant. Vol. I. page 71.*

Tige droite, élancée, peu rameuse; écorce brune. Feuilles rassemblées en touffe au sommet des rameaux, alternes, pétiolées, divergentes, oblongues-lancéolées, aiguës, dentées en scie, glabres, luisantes, coriaces, persistantes, d'un verd foncé par-dessus, et glauques en-dessous, ayant six à huit pouces de longueur. Fleurs en panicule terminale, très grande, ou grappe composée, toujours droite et jamais réfléchie, hispide, poils glutineux; bractées scarieuses, lancéolées; pédicelles uniflores, velus, glutineux. Calice à cinq lobes, velus. Corolle ovale, urcéolée, blanche ou couleur de rose, de sept à dix lignes de long, et beaucoup plus grande que dans l'Arbousier Unedo. Etamines, dix. Pistil; ovaire glabre, arrondi; style simple, persistant; stigmate obtus. Baie arrondie, à cinq loges polyspermes.

FLEURIT. Vers la fin de l'été, pendant l'automne, et une partie de l'hiver.

HABITE. Les isles Canaries, où il a été découvert en 1797, par M. Riedle, jardinier-botaniste pour le Muséum, dans l'expédition commandée par le capitaine Baudin, à l'isle de la Trinité. Cette belle espece, qui n'a pas encore été décrite, nous a été communiquée par M. Richard, membre de l'Institut. Elle pourra se naturaliser dans les contrées méridionales de la France; mais plus au nord, il faudra lui faire passer l'hiver dans l'orangerie.

5. ARBUTUS laurifolia.

ARBOUSIER à feuilles de laurier.

A. *foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, serratis; racemis axillaribus, sessilibus, solitariis, simplicissimis, secundis.*

A. à feuilles oblongues-lancéolées, acuminées, dentées en scie; à grappes axillaires, sessiles, solitaires, très simples, unilatérales.

ARBUTUS laurifolia — arborea, foliis oblongis utrinque acuminatis, acutè serratis, glabris, racemis axillaribus, secundis, sessilibus, solitariis. LAM. Supplem. 258. = Murr. Syst. veget. 407. Willden. Spec. Plant. II. 617.

Arbre ou arbrisseau qui a beaucoup de ressemblance avec l'Arbousier Unedo, par son port, et la forme de ses feuilles; et avec l'Andromede axillaris et Catesbœi, par la disposition de ses fleurs.

Tige droite, rameuse, cylindrique, écorce brune. Feuilles oblongues, lancéolées, acuminées, glabres; dentées en scie, persistantes. Fleurs en petites grappes axillaires, sessiles, solitaires, simples et non rameuses, unilatérales, blanchâtres. Baie globuleuse, rougeâtre, charnue, à cinq loges polyspermes.

FLEURIT. Au commencement de l'été. Les baies mûrissent pendant l'automne.

HABITE. L'Amérique septentrionale. On ne l'a point encore cultivé en Europe, mais il pourra s'y naturaliser comme toutes les plantes de ces contrées. Il est peu connu. Nous le décrivons d'après un rameau desséché, cueilli en Amérique.

6. ARBUTUS lanceolata.

ARBOUSIER lancéolé.

A. *foliis lanceolato-oblongis, acutis, integerrimis; racemis terminalibus, ramosis, nutantibus, glabris; floribus quadrifidis.*

A. à feuilles lancéolées-oblongues, aiguës, très entières; à grappes terminales, rameuses, réfléchies, glabres; à fleurs quadrifides.

ARBUTUS lanceolata — foliis oblongis, lanceolatis, integerrimis, coriaceis. LAM. Dict. ency. Arbousier n° 4.