



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Abhandlungen der physikalischen Klasse der Königlich-
Preussischen Akademie der Wissenschaften**

Berlin, Realschul-Buchhandlung,

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/10599>

1816-17: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/41594>

Page(s): Title Page, Page 370

Holding Institution: Natural History Museum Library, London

Sponsored by: Natural History Museum Library, London

Generated 12 June 2024 5:46 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1707112i00041594.pdf>

This page intentionally left blank.

Abhandlungen

d e r

physikalischen Klasse

d e r

Königlich-Preussischen

Akademie der Wissenschaften

a u s

den Jahren 1816—1817.



B e r l i n

in der Realschul-Buchhandlung.

1 8 1 9.

Centaurea canariensis W.	Anthemis revoluta †).
Conyza sericea.	Bupthalmum spinosum.
- - - canariensis.	- - - - - sericeum. Joriada.
Senecio palmensis *). Turgayte.	Scabiosa fruticosa nov.
Tanacetum fruticosum. Faro (palma).	Placoma pendula. Balo.
Chrysanthemum anethifolium.	Rubia fruticosa.
- - - - - crithmifolium.	Valantia filiformis.
- - - - - fruticosum. Ma-	Viburnum rugosum. Fallado.
garsa.	Hedera canariensis.
Tussilago rubra.	Crithmum canariense.
- - - nutans.	- - - latifolium. Perexil de
Cacalia Kleinii. Verode.	la mar.
Cineraria cruenta.	Pimpinella cumbrae.
- - - Tussilaginis.	Peucedanum aureum.
- - - populifolia.	Bowlesia (Drusa) oppositifolia.
- - - lanata.	Ranunculus Teneriffae. Morgallona.
Artemisia argentea. Axeuxo.	Crambe strigosa.
- - - ramosa Sm. **).	Cheiranthus scoparius.
- - - reptans Sm. ***).	- - - longifolius.

ribus longis. Receptaculo piloso, pappo piloso. Unicum exemplar inter fragm. pumie. declivi occident. mont. Chahorrae supra 8000 ped. Dr. Smith's Noten.

*) *Senecio palmensis, fruticosa. Ramis filiformibus pendentib. Fol. linearib. cuneat. profunde dentat. dentib. paucis longis linear. glabris subcarnos. infim. interdum. integerrim. Floribus cymosis pedicellis filiformib. Calyce tubulos. cylindric subcaliculat. 5 dentat. Coroll. rad. 2—3 linear. disco 3—5. pappo. simplici. Receptaculo nudo. Dr. Smith's Noten.*

**) *Artemisia ramosa. Caule tomentoso, sericeo. Foliis bipinnat. pinnis filiformib. Florib. paniculat. erectis. Calycib. suborbiculat. angulatis. Florib. ovatis conicis. Dr. Smith's Noten.*

***) *Artemisia reptans. Calyce haemisphaerico. Florib. racemosis, secundis, nutantib. Caule repente, radicante; foliis pinn. pinnul. 3 fidis, paucis, simplicib. Tota planta tomentoso-nivea. — Artemisiae semper modo unico crescunt; una alteras duas excludens. Dr. Smith's Noten.*

†) *Anthemis revoluta. Fol. petiolatis. pinnatif. pinnis oblongis, sinuato crenat. s. lobat. lobis dentat. margine revolutis. supra glaberrim. infra hirsuta. — Juniorib. cum toto petiolo villosis. Peduncul. foliosis. Cymis simplicib. parviflor. pedicellis clavatis. Flores magnae, albae. Frutex pedal. cespitos. ad Rupes part. inferior. convall. Tagananae Teneriff. Dr. Smith's Noten.*

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

Abhandlungen

physikalischen Klasse

der

Königlich-Preulsischen

=.

> ”

Akademie der Wissenschaften

den Jahren 1816—18 17.

BESTER -

in der Realschul-Buchhandlung.

819.

[Begin Page: Page 370]

370 v Buch

Centaurea canariensis W. *Anthemis revoluta* f}).

Conyza sericea. *Buphthalmum spinosum*,

-- - canariensis. - - - - - sericeum. Joriada.

Senecio palmensis *), *Turgayte*. *Scabiosa fruticosa* nov.

Tanaoetum fruticosum. Faro (palma). *Placoma pendula*, Balo.

Chrysanthemum anethifolium. *Rubia fruticosa*.

"» - . - - - - *crithmifolium*. *Valantia Aliformis*.

- - - - - fruticoum. Ma- *Viburnum rugosum*. Fallado.
garsa. *Hedera canariensis*.

Tussilago rubra. *Crithmum canariense*.

- - - - - nmutans. - - - - - latifolium. *Perexil de*

Cacalia Kleinii. Verode. la mar.

Cineraria cruenta. *Pimpinella cumbrae*.

--- Tussilaginis. Peucedanum aureum.

--- populifolia. Bowlesia (Drusa) oppositifolia.

--- länata Ranunculus Teneriffae. Morgallona.

Artemisia argentea. Axeuxo. Crambe strigosa.

--- .ramosa Sm. **).. Cheiranthus scoparius.

-- .- reptans Sm. **). -- = = longifolius.

ribus longis. Receptaculo piloso, pappo piloso. Unicum exemplar inter fragm. pumie. de= ribi oceident. mont. Chahorrae supra 8000 ped. Dr. Smith's Noten.

©) Senecio palmensis, fruticosa, Ramis filiformibus pendentib. Fol. linearib. cuneat. pro-

eo)

u)

funde dentat. dentib. paucis longis linear. glabris subcarnos. infim, interdum. integerrim, Floribus cymosis pedicellis filiformib, Calyce tubulos. eylindrie subealiculat. 5 dentat. Coroll. rad. 2—3 linear. disco 3—5. pappo. simplici, Receptaculo nudo. Dr. Smith's Noten.

Artemisia ramosa. Caule tomentoso, sericeo, Foliis bipinnat. pinnis filiformib. Florib. paniculat. erectis. Calycib. suborbiculat. angulatis. Florib. ovatis conicis. Dr. Smith's Noten,

+

"Artemisia reptans. Cällyce haemisphaerico. Florib. racemosis, secundis, nutantib. Caule repente, radicante; folüs pinn. pinnul. 3 fidis, paucis, simplicib. Tota planta tomentoso-nivea, — Artemisiae semper modo unico erescunt; una alteras duas excludens. Dr. Smith's Noten,

}) Anthemis revoluta, Fol. petiolatis. pinnatif. pinnis oblongis, sinuato crenat. s. lobat.

lobis dentat. margine revolutis. supra glaberrim. infra hirsuta, — Juniorib. cum toto petiolo villosis. Peduneul. foliosis. Cymis simplicib. parviflor. pedicellis clavatis. Flores magnae, albae. Frutex pedal. cespitos. ad Mupes part. inferior, convall. Tagananae Teneriff. Dr. Smiel's Noten,