

E. libris Linn. fil. 1784. J. W. Smith.

CAROLI A LINNÉ

ORDINIS REG. STELLAE POLARIS EQVITIS
ARCHIATRI REGIS SVEC.
MEDICINAE ET HISTORIAE NATVR. IN ACAD. R. VPS.
PROFESSORIS PVBL. ORD. ACADEMIARVM SCIENT. PERE
OMNIVM MEMERI, FVNDI HAMMARBY
DOMINI REL.

SYSTEMA
VEGETABILIVM

SECVNDVM

CLASSES ORDINES
GÈNERA SPECIES

CVM

CHARACTERIBVS ET DIFFERENTIIS

EDITIONE SECVNDA TERTIA

ACCESSIONIBVS ET EMENDATIONIBVS NOVISSIMIS

MANV PERILLVSTRIS AVCTORIS SCRIPTIS

ADORNATA

A

IOANNE ANDREA MURRAY D.

MEDIC. ET BOTAN. IN ACAD. R. GOTTING. PROFESSORE PVBL. ORD.
HORTI R. BOT. PRAEFECTO R. ACAD. SCIENT. GOTTING.
ET STOCKHOLM. VII ET SOCIETATVM OECONOM.
BERNENS. ET CELLENS. MEMBRO.

GOTTINGAE et GOTHAE

TYPIS et IMPENSIS JO. CHRIST. DIETERICH

1774

424. ASPARAGUS. Cor. 6-partita, erecta: petalis
448. 3-bus interioribus apice re-
flexis. Bacca 3-ocularis, 2-
sperma.

- ✓ *officinalis*. 1. A. caule herbaceo tereti erecto, fol. setaceis, sti-
pulis paribus. Varietas β. *Mant.* 366. *
- ✓ *declinatus*. 2. A. caule inermi tereti, ram. declinatis, fol. seta-
ceis. *Similis A. officinali, sed altior Foliis plu-
ribus, duploque longioribus. Caulis annuus.
Stipulae solitariae, lanceolato-subulatae, basi de-
orsum mucrone membranaceo. Folia 7. f. 10,
filiformia, patentia. Pl. mea mas est e Cap. b. sp.*
- falcatus*. 3. A. aculeis solitariis reversis, ramis teretibus, foliis
eniformibus falcatis.
- ✓ *retrofractus*. 4. A. aculeis solitariis, ram. teretibus reflexis retro-
fractisque, fol. setaceis fasciculatis. *Rami te-
retes, dichotomi dichotomiis verrucosis aculeo mi-
nuto nutante.*
- aethiopi-
cus*. 11. A. aculeis solitariis reversis, ramis angulatis, fol.
lanceolato-linearibus. *Mant.* 63.
- ✓ *asiaticus*. 5. A. aculeis solitariis, caule erecto, ram. filiformi-
bus, fol. fasciculatis setaceis. *Asparagus acu-
leatus minor sarmentosus. Pluk. alm. 54. t. 14.
f. 4. Burm.*
- ✓ *albus*. 6. A. aculeis solitariis, ram. angulatis flexuosis, fol.
fasciculatis triquetris muticis deciduis. *Caulis
albus. Spinae rectae patentae s. reflexae.*
- ✓ *acutifolius*. 7. A. caule inermi angulato fruticoso, fol. aciformi-
bus, rigidulis perennantibus mucronatis aequa-
libus. *Corruda prior. Clus. hist. 2. p. 77. Si-
milis A. aphylo, sed folia septena saepius, filo
vix crassiora; at illi saepius terna triplo crassio-
ra valdeque subulata.*
- horridus*. A. aphyllus fruticosus pentagonus, aculeis tetra-
gonis compressis striatis. *Asparagus hispani-
cus, aculeis crassioribus horridus. Tourn. in-
stit. 300. Aculei longitudine digiti.*
- ✓ *aphyllus*. 8. A. caule inermi angulato fruticolo, fol. subulatis
striatis inaequalibus divergentibus.
- ✓ *capensis*. 9. A. spinis quaternis, ramis aggregatis teretibus fol.
setaceis. *Asparagus rubicundus. Berg. cap. 88.
Pluk. alm. t. 78. f. 3. melius. Corruda africa-
na,*