



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive,
Enumeratio contracta ordinum generum specierumque
plantarum huc usque cognitarum, juxta methodi naturalis,
normas digesta**

Parisii, Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz, 1824-73

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/286>

v.5 (1836): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/7154>

Page(s): Page 486, Page 487

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 16 March 2024 2:18 AM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1682238i00007154.pdf>

This page intentionally left blank.

CCXLVIII. ASTERISCUS *Mœnch* meth. 592. *Less.* syn. 209. — *Nauplius Cass.* dict. 34. p. 272. — *Asterisci* sp. *Tourn.* — *Asteroidis* sp. *Vail.* — *Odonstosperma Neck.*? ex *Less.*

Radius 1-serialis, ligulis cuneiformibus apice tridentatis, tubo brevi basi biauriculato, cor. disci exalatâ tubo infernè incrassato. Anth. basi longè caudatæ. Achænum triquetro-obcompressum exalatum conforme. Pappus conformis coroniformis irregulariter dentatus. — Herbæ basi sæpè suffruticosæ ramosæ regiones mediterraneas habitantes plus minus hirsutæ. Folia obovata oblonga aut linearia integerrima. Capitula terminalia sæpius ramis lateraliter ortis et elongatis lateralia facta. Invol. squamæ ext. foliaceæ inermes obtusæ disco multò longiores.

1. A. **MARITIMUS** (*Mœnch* l. c.), caule irregulariter ramoso, ramis apice 1-cephalis nunc foliosis nunc denudatis, foliis oblongo-spathulatis villosis, inv. bracteis spathulatis. 2 in rupibus maritimis Hispaniæ, Galliæ australis, Italiae, Aleppi, ins. Meditarran., Mauritaniæ. *Buphthalmum maritimum* Linn. sp. 1274. *Nauplius maritimus* Cass. dict. 34. p. 274. *Buphthalmum crassifolium* Raf. speech. 1. p. 191. ex descr. et sp. à cl. Guss. miss. — Barr. ic. t. 251. Bocc. mus. t. 129. Clus. hist. 2. p. 13. Variat caule basi suffruticoso et herbaeo, supino et suberecto, ramis brevibus foliosis (*Buphth. sessile* Mill.) aut elongatis parcè foliosis post anthesin nudis. Invol. squamæ ext. spathulatae post anthesin deciduæ, int. tunc adpressæ [in discum depresso. (v. v. et s.)]
2. A. **AQUATICUS** (*Mœnch* l. c.), caule erecto di- aut trichotomo, capitulis sessilibus axillaribus et terminalibus, foliis oblongis obtusis villosis aut glabriusculis. (1) in maritimis aquaticis regionis Mediterraneæ à Canariis ad Cretam, à Lusitaniâ ad Byzantium. *Buphthalmum maritimum* Linn. sp. 1274. Gærtn. fr. t. 169. DC. fl. fr. 4. p. 217. Schkuhr handb. t. 257. *Nauplius aquaticus* Cass. dict. 34. p. 273. — Seba thes 1. t. 29. f. 7. Zan. hist. t. 24. Breyn. cent. t. 77. Interdùm caulis induratur. (v. v. et s.)
3. A. **GRAVEOLENS**, caule erecto, ramis sub capitulis ortis elongatis proliferis, foliis oblongis basi cordato-amplexicaulibus incisis dentatis villosis, capitulis axillaribus brevissimè pedicellatis et terminalibus, invol. bracteis oblongo-linearibus acutis. 2? in Ægypti desertis circa Kahiram, necnon circa Suez, Sinaï (Bové!). *Buphthalmum graveolens* Forsk. descr. 151. Vahl symb. 1. p. 74. t. 19. Sieb.! herb. Ægypt. Delil. ill. Capitulum post anthesin subglobosum. (v. s.)
4. A. **SERICUS**, caule fruticoso ramoso, foliis cuneatis linearibusve integerrimis viloso-sericeis, capitulis terminalibus et lateralibus sessilibus, bracteis linearibus, rec. bracteolis acuminatis. 3 in ins. Canariis. *Buphthalmum sericeum* Linn. f. suppl. 379. Folia alterna nec opposita.
 - a. *latifolius*, foliis spathulato-oblongis densè viloso-sericeis, bracteis radio brevioribus linearisubspathulatis, invol. squamis linearibus sericeo-hirsutissimis. 3 in insulâ Fuertâventurâ. *B. sericeum* L'Hér.! herb. et mss. Ait. kew. 3. p. 245. Sims. bot. mag. t. 1836. opt. Capit. cum radio diam. sesquipollaci. (v. s.)
 - β. *intermedius*, foliis spathulato-oblongis adpressiùs viloso-sericeis bracteis oblongo-subspathulatis radio subæqualibus, invol. squamis linearibus pubescenti-sericeis. 3 in ins. Lancerotte. *Buphth. sericeum* Link in Buch.! can. 150. (v. s.)
 - γ. *stenophyllus*, foliis linearibus acutis viloso-sericeis, caule ramosissimo depresso, bracteis folio conformibus, invol. squamis adpressissimis. 3 in campis maritimis ins. Magnæ-Canariæ. *Bupht. stenophyllum* Link in Buch.! can. 150. Gravè olet ex Chr. Smith. Capit. cum radio 9-10 lin. diam. (v. s.)
5. A. **ODORUS**, caule suffruticoso erecto trichotomo, foliis linearis-lanceolatis

acutis integerrimis pubescenti-subsericeis, capitulis terminalibus et axillaribus subsessilibus, bracteis plurimis folio conformibus, rec. bracteolis obtusè truncatis apice ciliato-villosis. ♂ in arenosis imperii Maroccani (Schousb.), prope Mogador (Brouss.!), *Buphthalmum odoratum* Schousb. mar. 2. p. 199. t. 7. Prioris var. γ affinis sed bracteolis obtusis facile differt. (v. s.)

6. A. IMBRICATUS, glaber atrovirens, caule fruticoso ramoso, foliis in petiolum attenuatis spathulatis obtusis argute et grossè serratis, capitulis terminalibus solitariis, bracteis cuneiformibus apice 3-dentatis. ♂ in agro Mogadriensi detexit cl. Broussonet. *Buphthalmum imbricatum* Cav. annal. scienc. nat. 1801. v. 4. p. 94. *Buphth. elegans* Willd. mag. naturl. ges. Berl. 1807. p. 138. *Buph. chrysanthemooides* Poir.! suppl. v. 1. (1810) p. 747 excl. patr. Nomina 3 certè synonyma cum tres deser. è specim. Broussonetianis concinnatae! (v. s. comm. à cl. Brouss.)

CCXLIX. PALLENIS *Cass. dict.* 37. p. 275. *Less. syn.* 210. — *Athalmum Neck.* elem. 1. p. 20? — *Asterisci* sp. *Tourn.* — *Asteroidis* sp. *Vaill.*

Radius biserialis. Cor. radii angustè ligulata apice tridentata tubo crasso utrinquè alato, disci tubo crasso hinc marginato-alato. Achænum obcompressum orbiculatum alatum; disci subtriquetrum villiosulum. Pappus denticulato-ciliaris, radii dimidiatus externus, disci coroniformis. — Inv. squamæ exter. foliaceæ patentæ apice spinosæ.

1. P. SPINOSA (*Cass. l. c.*), caule erecto hirsuto, foliis obovato-aut. oblongo-lanceolatis, invol. squamis ext. patulis spinescentibus. (I) in asperis et sub-humidis apricis, ad margines agrorum Europæ australis et Africæ borealis, à Teneriffâ ad Ægyptum, ab Armoricâ Nannetensi ad Constantinopolim. *Buphthalmum spinosum* Linn. sp. 1274. DC. fl. fr. 4. p. 217. Schkuhr handb. t 258. *Buphth. asteroideum* Viv. fl. lyb. sp. p. 57. t. 25. f. 2. — *Blackw. herb.* t. 272. Clus. hist. 2. p. 13. f. 1. Variat caule plus miuùs hirsuto simplici 1-cephalo aut corymboso, capitulis centralibus sessilibus cæteris longè pedunculatis, foliis integerrimis aut denticulatis. B. aureum Salzm.! pl. exs. circa Tanger lectum videtur var. foliis latioribus caule et involucri basi hirsutissimis. (v. v. sp.)

CCL. ANVILLEA.

Capitulum multiflorum homogamum, fl. omnibus tubulosis 5-dentatis hermaphroditis. Recept. convexi paleæ basi oblongæ convexæ, apice ext. in acumen, interiores in setam productæ. Involucri campanulati squamæ ext. seu bracteæ foliaceæ spathulatæ patulæ, inter. biseriales adpressæ imbricatæ. Antheræ basi ecaudatæ (Vent.). Achænum tetragonum durum pappo coroniformi brevi integro coronatum. Herba, erecta aut multicaulis diffusa præsertim ad summitates velutino-canescens, caule ad basin aut rhizomate fruticoso. Folia obovata spathulatave basi attenuata grossè et obtusè dentata. Capitula sessilia terminalia, ramis sæpè sub capitulis ortis quasi lateralia. Flores aurei. — Genus à cæteris Buphthalmeis distinctum floribus omnibus tubulosis hermaphr. et ideo ut ex antheris ecaudatis ad Ceruanam vergens. — Dicavi cl. d'Anville (Joh. Bapt. Bourguignon d'Anville), summo geographo Parisiensi qui Orientalium regionum situs labore indefesso sagacissimè exploravit.

1. A. GARCINI. ♂ in Oriente non longè à Bagdad leger. cl. Olivier et Bruguière! in Arabiâ-Petræa (ex syn. Delil.) et in Persiâ olim legit Garcin (ex Burm.). *Buphthalmum Persicum* Garc. ex Burm. *Buphthalmum Garcini* Burm. fl. ind. t. 60. f. 1. *Anthemis Garcini* Burm. fl. ind. p. 183. *Buphthalmum Arabicum*

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 486]

486 DICOTYL. seu. EXOGENJE.

CCXLVIII. ASTERISCUS Afench meth. 5g». Less. syn. 209. — Nauplius Cass. dict. 34. p. 272. — Asterisci sp. Tourn.. — Asteroidis sp. Paill. — Odonsto- sperma JVeck.? ex Less.

Radius r-serialis, ligulis cuneiformibus apice tridentatis , tubo brevi basi biauriculato, cor. disci exalatà tubo infernè incrassato. Ánth. basi longé caudatze. Achenium triquetro-obcompressum exalatum.conforme. Pappus conformis coroniformis irregulariter dentatus. — Herbae basi szpé suffruticosze ramos; regiones mediterraneas habitantes plüs minus hirsutz. Folia obovata oblonga aut linearia integerrima. Capitula terminalia sspiüs ramis lateraliter ortis et elongatis lateralia facta. Invol. squam ext. foliacez inermes obtuse disco multó longiores.

1. À. maRrrIMUs (Moench l. o.), caule irregulariter ramoso, ramis apice 1-cephalis nunc foliosis nunc denudatis, foliis oblongo-spathulatis villosis, inv. bracteis spathulatis. 2f in rupibus maritimis Hispaniz , Galliz australis , Italie, Aleppi, ins. Meditarran. , Mauritanie. Buphthalmum maritimum Linn. sp. 1274. Nauplius maritimus Cass. dict. 34. p. »74. Buphthalmum crassifolium Raf. speech. 1. p. gr. ex descr. et sp. à cl. Gnss, misso. — Barr. ic. t. 25r. Bocc. mus. t. 129. Clus. hist. 2. p. 13. Variat caule basi suffruticoso et herbaeo, supino et suberecto, ramis brevibus foliosis (Buphth. sessile Mill.) aut elongatis parcé foliosis post anthesin nudis. Invol. squama ext. spathulatz post anthesin deciduz, int. tunc adpresse [in discum depresso. (v. v. et s.)

. À. AQUATICUS (Moench 1. c.), caule erecto di- aut trichotomo, capitulis sessilibus axillaribus et terminalibus, foliis oblongis obtusis villosis aut glabriusculis. (T) in maritimis aquaticis regionis Mediterranea à Canariis ad Cretam, à Lusitanìà ad Byzantium. Buphthalmum maritimum Linn. sp. 1274. Gaertn. fr. t. 169. DC. fl. fr. 4. p. 217. Schkuhr handb. t. 257. Nauphus aquaticus Cass. dict. 34. p. 273.— Seba thes 1. t. 29. f. 7. Zan. hist. t, 24. Breyen. cent. t. 7. Interdüm caulis induratur. (v. v. et s.)

3. A. cRAVEOLENS, caule erecto, ramis sub capitulis ortis elongatis proliferis , foliis oblongis basi cordato-amplexicaulibus incisis dentatisve villosis, capitulis axillaribus brevissimé pedicellatis et terminalibus, invol. bracteis oblongo-linearibus acutis. 27? in JEgypti desertis circa Kahiram , necnon circa Suez , Sinai (Bové!). Buphthalmum graveolens Forsk. descr. 151. Vahl symb. r. p- 74. t. 19. Sieb.! herb. JEgypt. Delil. ill. Capitulum post anthesin subglobosum. (v. s.)

4. À. SEBICEUS, caule fruticoso ramoso , foliis cuneatis linearibusve integrerrimis viloso-sericeis , capitulis terminalibus et lateralibus sessilibus, bracteis linearibus, rec. bracteolis acuminatis. /j in ins. Canariis. Buphthalmum serieeum Linn. f. suppl. 379. Folia alterna nec opposita.

a. latifolius , foliis spathulato-oblongis densé viloso-sericeis, bracteis radio brevioribus linearisubspathulatis,, invol. squamis linearibus serieo-hirsutissimis. 5 in insulà Fuertáventurá. B. sericeum L'Hér.! herb. et mss.

Ait. kew. 3. p. 245. Sims. bot. mag. t. 1836. opt. Capit. cum radio diam.
sesquipollicari, (v. s.)

P. intermedius, foliis spathulato-oblongis adpressiūs villosō-sericeis bracteis
oblongo-subspathulatis radio subzqualibus, invol. squamis linearibus pu-
bescēti-sericeis, 5 in ins. Lancerotte. Bupht. sericeum Link in Buch.!
can. 150. (v. s.)

y. stenophyllus, foliis linearibus acutis villosō-sericeis, caule ramosissimo
depresso, bracteis folio conformibus, invol. squamis adpressissimis. i in
campis maritimis ins. Magna-Canarie. Bupht. stenophyllum Link in
Buch.! can. 150. Gravé olet ex Chr. Smith. Capit. cum radio 9- 10 lin. diam.

(v. s.)

5. *À. ononmus*, caule suffruticoso erecto trichotomo, foliis lineari-lanceolatis
M

[Begin Page: Page 487]

ASTERISCUS. COMPOSIT/E-ASTEROIDEJE. 487

acutis integerrimis pubescēti-subsericeis, capitulis terminalibus et axillaribus
subsessilibus, bracteis plurimis folio conformibus, rec. bracteolis obtusē trun-
catis apice ciliato-villosis, 5 in arenosis imperii Maroccani (Schousb.), prope
Mogador (Brouss.), Buphtalmum odorum Schousb. mar. 2. p. 199. 1. 7.
Prioris var. * affinis sed bracteolis obtusis facilē differt, (v. s.)

G. *À. rwsRrcATUs*, glaber atrovirens, caule fruticoso ramoso, foliis in petio-
lum attenuatis spathulatis obtusis argutē et grossē serratis, capitulis termina-
libus solitariis, bracteis cuneiformibus, apice 3-dentatis. j in agro Mogado-
riensi detexit cl. Broussonet. Buphtalmum irbricatum Cav. annal. scienc. nat.
180r. v. 4. p. 94. Bupht. elegans Willd, mag. naturl. ges. Berl. 1807. p. 138.
Buph. chrysanthemoides Poir. suppl. v. x. (1810) p. 747 excl. patr. Nornina
3 certē synonyma cūm tres descr. é specim. Broussonetianis eoncinnate! (v. s.)
comm. à cl. Brouss.)

CCXLIX. PALLENI Cass. dict. 37. p. 275. Less. syn. 210. — Athalmum JVck.
elem. 1. p. 20? — Asterisci Sp. Tourn. — Asteroidis sp. Fall.

Radius biserialis. Cor. radii angustē ligulata apice tridentata tubo
crasso utrinqué alato, disci tubo crasso hinc marginato-àlato. Achze-
nium obcompressum orbiculatum alatum; disci subtriquetrum villo-
siusculūm.' Pappus denticulato-ciliaris, radii dimidiatus externus,
disci cōroniformis. — Inv. squams exter. foliaces patentes apice spi-
nos.]

1. P. sPrNosA (Cass, l. c.), caule erecto hirsuto, foliis obovato-aut. oblongo-
lanceolatis, invol. squamis ext. patulis spinescentibus. (T) in asperis et sub-
humidis àpricis, ad margines agrorum Europ: australis et Afric borealis, à
Teneriffá ad /Egyptum, ab Armoricá Nannetensi ad Constantinopolim. Buph-
thalmum spinosum Linn. sp. 1274. DC. fl. fr. 4. p. 217. Sehkuhr handb. t 258.
Bupht. asteroideum Viv. fl. lyb. sp. p. 57. t. »5. f. 2. — Blackw. herb. t. 252.

Clus. hist. z. p. 13. f. 1. Variat caule plàüs miuus hirsuto simplici r-cephalo aut corymboso , capitulis centralibus sessilibus carteris longé pedunculatis, foliis integerrimis ant denticulatis. B. aureum Salzm.! pl. exs. circa Tanger lectum videtur var. foliis latioribus caule et involucri basi hirsutissimis. (v. v. sp.)

CCL. ANVILLEA.

Capitulum multiflorum homogamum, fl. omnibus tubulosis 5-dentatis hermaphroditis. Recept. convexi pales basi oblonge convexz, apice ext. in acumen , interiores in setam producta. Involucri campnulati squama ext. seu bractez foliaces spathulate patulis, inter. biseriales adpresso imbricate. Anthere basi ecaudate (Vent.). Acheneum tetragonum durum pappo coroniformi brevi integro coronatum. Herba, erecta aut multicaulis diffusa presertim ad summitates velutino-canescens, caule ad basin aut rhizomate fruticoso. Folia obovata ,Spathulatave basi attenuata grossé et obtusé dentata. Capitula sessilia terminalia , ramis szpé sub capitulis ortis quasi lateralia. Flores aurei.
— Genus à cxteris Buphthalmeis distinctum floribus omnibus. tubulosis hermaphr. et ideó ut ex antheris ecaudatis ad Ceruanam vergens.
— Dicavi cl. d'Anville (Joh. Bapt. Bourguignon d'Anville), summo geographo Parisiensi qui Orientalium regionum situs labore indefesso sagacissimé exploravit.

r. À. Ganar, Jj in Oriente non longé à Bagdad leger. cl. Olivier et Bruguiére! in Arabiá-Petreà (ex syn. Delil) et in Persià olim legit Garcin (ex Burm.).
Buphthalmum Peisicum Garc. ex Burm, Buphthalmum Garcini Burm. fl. ind. t. 60. f. 1. Anthemis. Garcini Burm. fl. ind. p. 183. Buphthalmum Arabicum