



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Histoire des plantes

Paris, Librairie Hachette, 1867-95

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/40796>

v. 7: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/91636>

Page(s): Title Page, Page 208

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library
Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 13 June 2024 1:46 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1707326i00091636.pdf>

This page intentionally left blank.

HISTOIRE DES PLANTES

PAR

H. BAILLON

PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
DIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FACULTÉ
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE PARIS

TOME SEPTIÈME

MÉLASTOMACÉES, CORNACÉES, OMBELLIFÈRES, RUBIACÉES
VALÉRIANACÉES, DIPSACACÉES

Illustrées de 432 figures dans les textes

DESSINS DE FAGUET

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE & C^{IE}

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

LONDRES, 18, KING WILLIAM STREET, STRAND

—
1880

Tous droits réservés.

minutis v. 0. Petala¹ integra v. retusa. Stylopodia depressa, margine integra v. undulata. Fructus plus minus longe ovoideus, a dorso compressus; jugis dorsalibus et intermediis prominulis haud v. angustissime alatis; lateralibus in alas crassiusculas (*Levisticum*²) v. submembranaceas productis; margine ob alas cito hiantes duplicato; commissura inde facie angustiore. Vittæ ad vallecule solitariæ (*Euangelica*, *Levisticum*), v. ∞ (*Archangelica*³). Carpophorum 2-partitum. Semen a dorso compressum, facie planum v. concaviusculum. Herba sæpius elata; foliis pinnatim v. ternatim compositis v. decompositis; laciniis plerumque latis dentatis; umbellis compositis, ∞ -radiatis; involucrorum bracteis ∞ (*Levisticum*), angustis, v. paucis, nunc 0; involucellorum bracteolis setaceis v. 0 (*Archangelica*, *Euangelica*), nunc ∞ (*Levisticum*), basi connatis. (*Europa*, *America bor.*, *Asia bor. et arctica*, *N.-Zelandia*⁴.)

18. **Astydamia** DC.⁵ — Flores asepali v. calyce minimo donati. Petala⁶ ovata, integra v. retusa. Stylopodia crasse conica, margine undulata. Fructus elliptico-ovatus compressus; commissura lata. Mericarpia dorso convexiuscula; marginibus crassiusculis latis suberosis ante dehiscenciam sulco solutis; jugis dorsali intermediisque parum prominulis; vittis latis solitariis; carpophoro 2-partito. Semen compressum, facie planum v. concaviusculum⁷. — Herba perennis glabra; caule basi suffrutescente; foliis latis inciso-pinnatis; segmentis cuneatis incisis; umbellis compositis; involucri involucellorumque bracteis ∞ , breviusculis⁸. (*Ins. Canar.*⁹)

— *Callisace* FISCH., in *Hoffm. Umb.*, 170. — DC., *Prodr.*, IV, 184. — *Eustylis* HOOK., F., *Fl. N.-Zel.*, t. 19. — *Angelophyllum* RUPR., *Rev. Umbell. Kamtch.*, 8.

1. Alba, lutescentia, virescentia v. rarius atropurpurea.

2. KOCH, *Umb.*, 101, fig. 41. — DC., *Prodr.*, IV, 164. — ENDL., *Gen.*, n. 4453. — B. H., *Gen.*, 916, n. 120.

3. HOFFM., *Umb.*, 166. — DC., *Prodr.*, IV, 169. — SPACH, *Suit. à Buffon*, VIII, 155. — ENDL., *Gen.*, n. 4457. — B. H., *Gen.*, 917, n. 122. — *Czernaevia* TURCZ., *Fl. baik.-dahur.*, I, 498; in *Ledeb. Fl. ross.*, II, 293.

4. Spec. 20-22. REICHB. F., *Ic. Fl. germ.*, t. 1936, 1937; 1940 (*Archangelica*), 1941 (*Levisticum*). — LEDEB., *Ic. Fl. ross.*, t. 166 (*Archangelica*). — F. SCHM., in *Maxim. Prim. Fl. amur.*, 127. — BOISS., *Diagn. or.*, ser. 2, II, 87; *Fl. or.*, II, 978. — HOOK. F., *Fl. N.-Zel.*, t. 19; *Man. N. Zeal. Fl.*, 97. — MIQ., in *Ann. Mus. lugd.-*

bat., III, 61. — FR. et SAV., *En. Jap.*, I, 187. — TORR., *Fl. N. York*, t. 36 (*Archangelica*). — A. GRAY, *Man.* (ed. 5), 192, 193 (*Archangelica*). — CHAPM., *Fl. S. Unit. St.*, 164. — S. WATS., in *King's Rep., Bot.*, 126, 127 (*Archangelica*). — GREN. et GODR., *Fl. de Fr.*, I, 684. — WALP., *Rep.*, II, 406, 407 (*Archangelica*), 938; V, 873 (*Archangelica*); *Ann.*, I, 349; V, 873; II, 703; V, 73 (*Archangelica*).

5. *Mém.*, 53, t. 1, D; *Prodr.*, IV, 190. — ENDL., *Gen.*, n. 4475. — B. H., *Gen.*, 909, n. 103. — *Tenoria* SPRENG., *Umb.*, 20 (part.).

6. Flava dicuntur.

7. Embryo conspicuus, albuminis dimidio subæqualis; cotyledonibus oblongo-lanceolatis.

8. Fructus fere *Peucedani* a quo distinguitur imprimis marginibus citius solutis, character, ut videtur, levioris momenti. Affinitates cæterum cum *P. (Bubone) Galbano* magnæ.

9. Spec. 1. *A. latifolia*. — *A. canariensis* DC. — WEBB, *Phyt. canar.*, t. 76. — *Crith-*

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

HISTOIRE

DES PLANTES

H. BAILLON

PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE MÉDICALE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

DIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE DE LA -FACULTÉ

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE LE PARIS

TOME SEPTIÈME

MÉLASTOMACÉES, CORNACÉES, OMBELLIFÈRES, RUBIACÉES

VALÉRIANACÉES, DIPSACACÉES

Illustrées de 432 figures dans les textes

DESSINS DE FAGUET

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE & C'

BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

LONDRES, ##, KING WILLIAM STREET, STRAND

1380

tous droits réservés.

[Begin Page: Page 208]

208 HISTOIRE DES PLANTES.

minutis v. 0. Peiala! integra v. retusa. Stylopodia depressa, margine integra v. undulata. Fructus plus minus longe ovoideus, a dorso compressus; jugis dorsalibus et intermedüs prominulis haud v. angustissime alatis; lateralibus in alas crassiusculas (Levisticum *) v. submembranaceas productis; margine ob alas cito hiantes duplicato; commissura inde facie angustiore. Vittæ ad valleculas solitariæ (Æuangelica, Levisticum), v. > (Archangelica *). Garpophorum 2-partitum. emen à dorso compressum, facie planum v. concaviusculum. Herbæ sæpius elatæ; foliis pinnatim v. ternatim compositis v. decompositis; lacmus plerumque latis dentatis; umbellis compositis, œæ-radiatis; involucrorum bracteis œ (Levisticum), angustis, v. paucis, nune 0; involucellorum bracteolis setaceis v. 00 (Archangelica, Euangelica), nune œ (Levisticum), basi connatis. (Ewropa, America bor., Asia bor. et arclice, N.-Zelandia *.)

18. Astydamia DC. — Flores asepali v. calyce minimo donati.

Petala 5 ovata, fut v. retusa. Stylopodia crasse conica, margine undulata. Fructus elliptico-ovatus; commissura lata. Mericarpla dorso converse: marginibus crassiusculis latis suberosis ante dehiscentiam sulco Lohitis Jjugis dorsali intermedisque parum promimulis; vittis latis solitariis; carpophoro 2-partito. Semen compressum, facie planum v. concaviuseulum *, — Herba perennis glabra; caule basi suffrutescente; foliis latis inciso-pinnatis; segmentis cunealis incis; umbellis compositis; involucri involucellorumque bracteis ®, breviuseulis *. (ns. Canar. *)

— Callisace ... in Ho. Umb., 170. — bat, IN, 61, — FR. et SAV., En. ur AL 187. pC., ne 184. — Eustylis Hook., F., FL. — ToRr., Fi N. York, t. 36 (Ar ca). — N.-Zel.; n. — Aa) dpt auts RUPR., L'fEe a. GrAY, Man. (ed. 5), rca) re Kam, 8. — CHAPM., FL. S. Unit. St., 164. — S. WATS;

ei aa virescentia v. rarius atro- ex Rep. 7 196, 15 Cirehagelis. =
Be GREN. et GODR., de 4. #
& Koch. Linge an fig. 41. — Re oo Rep., H, 406, Fi remit) 938 ;
IV, 164. — Gen, n. 4453. —B. H., G _—. gelica) : Ann., 1, 349; V, 873; hé gr
916, n. 20. Le nt GER
3. Horrs., Umb., 166.—DC., Prodr., IV, 169. ne 53, t. 1,D; Prodr., IN, de. RE
— SPACH, Suit. à pure VIN, es en us Ca a. 4475 , 909, n. 103
Gen., n. 4457. , Gen., n..199.— Tenir ia SPRENG.; ‘ Umb., 20 { {part ve
Cernaevia hace 3 + baik. mn I, 2 Flaya dicuntur
deb. Fl. ross., 11, 29: : Éubts conspicu albuminis dimidio sub
4. Spec. 20-22. REIC 4
rer — LEDER., lc. Fl. ross., : 106 {Aren-
ica).—
gelic F. SGH. in Maxim. Pr rm amur.,
127.—Boïss., Diagn or., ser. 9, | . FL 07,
11, 978. — Hook. F., FI N.-Zel., t. 19; Man
N. Zeal. F1., 97. — Mio., in Ann. dei “lugd.-
mprimis marginibus citius s0 olutis,
ut videtur, levioris momenti. Affinitates cæle-
rum cum P. (Bubone) Galbano magnæ-. js
9. Spec. 1. A. latifolia. — À. cc
DC. — Wess, Phyt. camar., t. 76. — Critlr