



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas
rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis,
nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus,
secundum systema sexuale digestas...**

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 2: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13830>

Page(s): Title Page, Page 830

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 12 June 2024 8:54 AM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1707152i00013830.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI
S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,

NOMINIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS II.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Poloniæ ac Electoris Saxon.

HOLMIAE,
IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

Crocodiloides atractylidis folio, flore purpureo coronato. *Vaill. act. 1718. p. 172.*
Habitat Madritii in collibus. Læfl. VII: 35.
Habitus A. cancellatae, sed folia sinuata. Flos radiatus.
Calycis squamæ mucronatæ. Involucrum ex foliis
veris patentibus.

- cancellata.* 4. **ATRACTYLIS** involucris cancellatis ventricosis linearibus dentatis, calycibus ovatis, floribus flosculosis.
Atractylis foliis linearibus dentatis, calycibus conniventibus. *Hort. cliff. 395. Roy. lugdb. 137.*
Acarna capitulis globosis. *Baub. pin. 379.*
Eryngium parvum palmare, foliis ferratis. *Moris. hist. 3. p. 166. f. 7. t. 36. f. 16.*
Carduus parvus. *Baub. hist. 3. p. 93. Raj. hist. 316.*
Carduus minimus. *Alp. exot. 254.*
Habitat in Hispaniæ, Siciliæ, Cretæ agris. ⊖
Receptaculum tectum paleis coalitis. Pappus plumosus,
basi quasi monophyllos sub florescentia, corollulis longior. *Læfling.*

CARTHAMUS.

- tinctorius.* 1. **CARTHAMUS** foliis ovatis integris ferrato-aculeatis. *Hort. cliff. 394. Hort. upf. 251. Mat. med. 377.*
Cnicus sativus f. *Carthamus officinarum. Baub. pin. 378.*
Cnicus vulgaris. *Clas. hist. 2. p. 152.*
Habitat in Ægypto. ⊖
- lanatus.* 2. **CARTHAMUS** caule piloso: superne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis, summis amplexicaulibus dentatis. *Hort. upf. 251. Sauv. monsp. 292.*
Carthamus foliis amplexicaulibus acuminato-dentatis. *Hort. cliff. 394. Dalib. paris. 250.*
Atractylis lutea. *Baub. pin. 379.*
Atractylis theophrasti & dioscoridis succo sanguineo. *Col. ecphr. I. p. 19. t. 23.*
Atractylis. *Dod. pempt. 736.*
Habitat in Gallia, Italia. Creta. ⊖
- cæruleus.* 3. **CARTHAMUS** foliis lanceolatis acuminato-serratis. *Hort. cliff. 135. Roy. lugdb. 136.*
Cnicus perennis cæruleus tingitanus. *Herm. lugdb. 162. t. 163.*
Carduus cæruleus erectus tingitanus, cnicæ facie, foliis magis integris. *Moris. hist. 3. p. 159.* β. *Cni-*

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

> CAROLI LINNÆI
S:g£ R:cæ M:ris Sveciæ ARculAaTRI; Mapic. & Bora,
PRorrss. UrsAr; EQUITIS DE STELLA POLARI;
SPECIES
PLANTARUM,
EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS,
AD
GENERA RELATAS,
CUM
DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NoMiNIBUs 'TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
Loci NaTALiBUs,
t
SECUNDUM
SYSTEMA SEXUALE
DIGESTAS.
TowuusII.
Cum Privilegio S. R. Mitis Suecia. id. S. R. Mtis Polonie ac Eletforis Saxon,
T S TT TU MONT NIIS IS TUIS T DS ND ee
HOLMIZ,
'IMPENSIS LAURENTII SALVIL
17535,

[Begin Page: Page 830]

830 SYNGENESIA: POLYGAMIA /EQUALIS. |
Crocodiloides atra&tylidis folio, flore purpureo corona- :
to. Vaill. acf. 1718. p. 172.
Habitat Madridi s collibus. Lefl.V II: 35.
Habitus A4. capcellate, fed folia finnata. Flos radiatus. -
Calycis /7z4se mucroswate. Involucrum ex folis
veris patewtibus.
coneelíata, 4. ATRACTYLIS involucris cancellatis ventricofis li-. —
nearibus dentatis, calycibus ovatis, floribus floícu-
lofis.
Atraétylis foliis linearibus dentatis, calycibus conniven-
tibus. Hort. cliff. 39«. Roy. Iugdé. 137.
Acarna capitulis elobofis. Banh. pia. 3
79- 7: id
lo. Eryngium parvum paimare, foliis ferratis. 7Mor:f.biff. 3e
p- 166. f... 7. 36. f. 16: i
Carduus parvus. Bauh. hift. 3. p. 93. Raj. hift. 316.
Carduus minimus; Alp. exot. 254. :
Habitat is Mifpanim, Sicilie, Crete agris. ©
Receptaculum zeam- palets coalitis. Pappus. plumofus, —
gior. Læfiing.
I CARTHAMUS. '

tindor5, 1, CARTHAMUS foliis ovatis integris ferrato-aculeata
bafi quafi ravnophyllos fub flore[centia , corolluliston-

tis. Hort. cliff. 594. Hort. upi. 251. Mat. med. 371

Cnicus fativus. f. Carthamus officinarum. Bauh. pite —

* 378. !

Cnicus vulgaris. Claf. hift. 2. p. i52.

Habitat in Aegypto. (9 i ;

lanatus. 2. CARTHAMUS caule pilofo : fuperne lanato, foliis
inferioribus pinnatifidis , fummis amplexicaulibus denz
tatis. Hort. upf. 251. Sauv. monfp: 292.

Carthamus foiiis amplexicaulibus acuminato-dentatis..

Hort. cliff. 394. Dalib. parif. 259.

Atractylis lutea. Bazh. pia. 379.

Atractylis theophraiti & diolcoridis fucco (anghineo.

C»l. ephr. 1. p. 19. £. 23.

Atractylis. Dod. pemapt. 736.

' — Habitat 15 Gallia, Italia. Creta. ©

eerie, 3. CARTHAMUS foliis lanceolatis: acuminato-ferratis.

Hort. cliff. 135. Koy., lugdb. 136.

Cnicus perennis c&ruléus tingitanus. Herm. Jugdb. 162-

t. 163.

| ; STS A

Carduus caruleus erectus tingitanus, cnici facie; m

magis integeis. Morif. hift. 3. p. 159. fo