

»*B. canariensis* L'Hérit.«

»Caule ramoso, hirsuto, foliis petiolatis, ovato-oblongis, obtusis vel acutis, basi rotundatis vel cuneatis, subtus pilis brevibus canis, floribus subsessilibus, florum glomerulis rotundatis in panicula laxa dispositis, calycis dentibus ovato-lanceolatis acutis.«

»var. β Smithianus.«

»*B. punctatus* Webb, Phyt. can. III. 66 non L'Herit.«

»*B. Smithii* Webb exs. caule foliisque pubescentibus glabrescentibus- que florum glomerulis paulo majoribus, paniculis magis aggregatis.«

»*B. serrulatus* Webb.«

»Caule ramoso foliis petiolatis, ovato-ellipticis vel oblongo-ellipticis, crebre minuteque dentato serratis, subcoriaceis, subtus pilis canescentibus praecipue ad nervos adpresso obsessis, floribus pedunculatis, florum glomerulis rotundatis, in spicato-panicula dispositis, calycis 5 fidi dentibus lanceolatis acuminatis.«

»Hab. In Canaria Despréaux.«

»*B. plumosus* L'Hérit.«

»Caule ramoso ramis junioribus petiolatisque niveo-tomentosis, foliis petiolatis, ovatis vel subrhomboideo-ovatis, obtusis vel acutis, obsolete serratis, omnibus supra viridibus pilosis pilis brevibus albis, infra dense tomentoso-niveis, florum glomerulis rotundatis in spica cylindracea lanata dispositis, calycis tubulosi dentibus e basi ovata longe subulatis, divaricatis villosissimis, tubo longioribus.«

»var. β organifolius.«

»Caule glabriuscule foliis subtus adpresso tomento pertenui incanis, florum glomerulis minus densis spicam cylindraceam laxam dilatam constitutis. *B. organifolius* L'Hérit. sert. Angl. 20, Webb, Phyt. III. 63., tab. 450. Benth. in DC. prod. XII. 485.«

Ego contra *B. organifolium* L'Hérit. speciem distinctissimam censeo. E Palma, e M. Canaria, e Teneriffae subalpinis a Hillebr. et Asken. lecta planta statura humili fruticulosa nec fruticosa foliis multo minoribus, pilis longis in *B. plumoso* cerebrimis omnino destitutis calycis ciliis brevioribus nec plumoso-dilatatis affatim diversa, ita ut antiquum Heritiherum sequi praeferam.

Cl. BOLLE in Bonpland. 45. Sept. 1860. 284 hasce species addidit:

B. odoratissimus C. Bolle.

Ex descriptione *B. organifolio* affinis, sed frutex arborescens, foliis integris vel subintegratis, puberulis.

Hab. Teneriffae vall. Tajodio.

B. Meridiani C. Bolle.

Arborescens, glaber, secus nervos foliorum subtus solummodo pilosus, calycibus intus glabris fauce setoso-clausis.

Hab. Ins. Hierro.

B. canariensis Herit.

C. Bolle duas distinguit varietates: