

*viatus, caule abbreviato, foliis pinnatifidis denticulatis, pedunculis brevibus, aggregatis, nudis, calycibus basi arachnoideo — tomentosis, ceterum glabris.* (Wohl eine unvollkommen Pflanze.) Lk.

1. *SONCHUS divaricatus* Desf.

1. *CREPIS foetens*, E. P.

*Crep. foetens*, ist von der mittel-europäischen durch mehr Raubigkeit, und grössere Blumen verschieden. So auch in Portugal. Lk.

2. *CREPIS coronopifolia*.

270 1. — *crithmifolia*.

*C. crithmifolia* scheint neu. *C. foliis inferioribus bipinnatifidis, superioribus pinnatifidis, laciniis elongatis linearibus antirrhinum crassioribus, calycibus tomentosulis.* Ausgezeichnet ist die Pflanze durch die langen und schmalen Blattlappen. Lk.

2. *TOLPIS barbata*. P.

4. — *Lagopoda* Sm.

*T. lagopoda*. Gewiss eine neue, sonderbare Art; *caule adulto basi vellere densissimo, ceterum glabro, foliis subsessilibus, oblongis, basi attenuatis, sinuato dentatis, glabris, calycis phyllis lateribus tomentosis, carino glabra.*

2. *HELMINTHIA echoides*. P.

2. *PICRIS hieracioides*. E. P.

2. *LEONTODON Taraxacum*, n.E. P.

2. *PICRIDUM tingitanum*. P.

2. *TRAGOPOGON porrifolium*. E. P.

2. *HEDYPNOIS monspeliensis*. E. P.

2. *ROTHIA cheiranthifolia*. Fl. lus.

P.

280 3. *ANDRYALA coronopifolia*. P.

1. — *pinnatifida*. M.

2. \**THRINCIA pygmaea*.

2. \**CICHORIUM divaricatum*. P.

2. \**SCOLYMUS maculatus*. P.

3. *CARTHAMUS salicifolius*. Alazor.

COMPOSITAE ACARNANAEE.

2. \**CARDUUS Marianus*. P.

2. — *parviflorus*.

1. — *clavulatus* Lk.

*C. clavulatus*, dem *C. crispus* nahe verwandt, aber verschieden. *C. foliis recurrentibus sinuatis spinosis, subtus tomentosis, anthodii aggregatis, phyllis exterioribus subreflexis spinosis, interioribus lanceolatis, pappi radiis clavatis.* Die inneren Kelchblätter haben eine glanzend, röthlich weiße Farbe; die Blumen selbst sind roth.

3. *CARLINA xeranthemoides* Mass.

290 2. *CYNARA horrida*. Aleauzil. P.

2. \**CENTAUREA calcitrapa*. E. P.

2. \**— Lippii*.

2. \**— melitensis*. E. P.

5. — *Teydis*.

*C. Teydis* Sm. *C. arguta* Nees Horae Ber. p. 116. t. 25. 26. Gehört zur Abtheilung Rhaponticum, ähnlich *phylla calycis appendice rotundata, scariosa saepe lacera*. Lk.

4. *CENTAUREA cynaroides*.

*C. cynaroides* Sm. *Caule simplici, foliis petiolatis, tomentosis, inferioribus runcinatis, superioribus pinnatifidis lobis incisis, summa integra, anthodii phyllis exterioribus scariosis, subrotundis, margine membranaceis, interioribus linearibus, appendice rotundata, intimis linearibus, appendice nulla. Pappus plumosus.* Lk.

T 2