

ANDRYALA NIGRICANS *Poiret.*

125. ANDRYALA foliis latis; pedunculis, calicibusque pilosis, pilis nigris glanduliferis.

Andryala nigricans. Flora atlant. vol. 2. pág. 236. Poiret Iter. 2. pág. 228.

Lo que caracteriza á esta especie es la multitud de pelitos negros terminados por otras tantas glándulas, que cubren al cáliz y pedúnculos. La planta es herbácea, blanquecina, cubierta en todas sus partes de una borrita muy corta, y se levanta de dos á tres pies. Su tallo es rollizo, obscuramente asurcado, algo ramoso. Las hojas son alternas, de dos pulgadas de largo (en el ramo que poseo), con ocho líneas de ancho, contando de punta á punta de las tiras ó lacinias horizontales: estas son obtusas; la terminal mucho mayor y ancha, y las de abaxo mas cortas; sigue luego la hoja estrechándose en forma de peciolo. En el pedúnculo de cada flor hay una hojuela bracteiforme, aleznada, entera. La corola es de un amarillo azafranado. En lo demas conviene con la *Andryala integrifolia* de Linneo.

Se cria en las cercanías de Mogador.

CARLINA SALICIFOLIA.

126. CARLINA fruticosa, petiolis spinosis: foliis lanceolatis integris, subtus tomentosis, apice pungentibus, ramis unifloris.

Carthamus salicifolius. Linn. supp. pág. 350. Lamarck Dict. vol. 1. pág. 640.

Arbusto de tres pies de altura, leñoso, ramoso. Los ramos son rollizos, y estan cubiertos de unas como escamas que dexáron las hojas al caer, y junto á



ellas espinitas agudas pareadas, que estuviéron en la base de dichas hojas. Estas nacen alternas, y á corta distancia unas de otras; son lanceoladas, de tres á quatro pulgadas de largo, con siete ú ocho líneas de ancho, terminadas en una espina corta, lampiñas por arriba, cubiertas por el enves de una borra fina amarillenta y sentadas; tienen á cada lado de su base dos espinitas agudas, y en los bordes algun diente espinoso, bien que por lo regular carecen de dientes. Los ramos superiores son algo borrosos, y cada uno se termina por una flor tan grande como en la *Carlina corymbosa*. El cáliz es ventruado, radiado, compuesto de hojuelas; las exteriores abiertas, mas largas, con dientes espinosos; las intermedias apoyadas, con punta aguda, y espinosas en su borde: las interiores lineares, muy estrechas, cuyo color parece entre verdoso y amarillento, y son algo mas largas que las precedentes, formando una como corona. Los flósculos son pequeños, apenas de cinco líneas, cuyo color segun Linneo es blanco. El estigma entero: el receptáculo plano, con tres pajitas para cada flor, largas y partidas en unos cinco hilitos. El vilano plumoso, blanco obscuro.

La cogió el Sr. Broussonet en el barranco de la Matanza en la isla de Tenerife.

Obs. Como acabamos de ver, y conforme á lo que dixo tambien el hijo de Linneo, las semillas de esta planta tienen el vilano plumoso, y el receptáculo pajoso, condiciones que convienen á las *Carlinas* y no á los *Cártamos*. Por esta razon la separo de este último género.

