

fol. foliolisque lanceolato-linearibus pubescentibus, fl. in racemos aut anthuros longos dispositis, legumin. repandis hirtis. In Eur. austr. Fl. albi. Spartium album Desfont. Genista alba Lam. Spartium multiflorum Ait.

2. *C. Laburnum* Linn. Goldner C. Folia ternata, foliola oblongo-lanceolata subtus pubescentia. Racemi penduli, pedicelli calycesque pilis densis adpressis. Leg. polysperma pilis adpressis. — Blätter dreifach; Blättchen länglich lanzettförmig, unten feinrauh. Blüthentrauben hängend, Blütenstielchen und Kelche mit dichten angedrückten Haaren. Hülsen vielsamig mit angedrückten Haaren. Auf Voralpen im mittl. Europa. Gelbe Blumen. — *C. alpinus* Mill. diff. foliolis oblongis ciliatis subtus glabriusculis, pilis in pedicellis calycibusque patulis, leg. oligospermis glabris. Ibid. — *C. nigricans*. Fol. ternatis, foliol. oblongis subtus adpresse pubescentibus, racemis elongatis erectis. Flores flavi. In Eur. med. et australi, praesertim vero in parte orientali. — *C. sessilifolius* diff. a praec. foliol. ovalibus glabris, racemis abbreviatis erectis, bractea triphylla sub calyce. In Europ. med. et austr.

19. *Chamaecytisus*. Zwergcytismus. Cal. tubulosus labiatus, labiis $\frac{3}{4}$ denticulatis. Stam. monodelpha. Leg. compressum polyspermum. — Kelch röhrig, lippig; Lippen $\frac{3}{4}$ gezähnelte. Staubfäden verwachsen. Hülse zusammengedrückt, vielsamig. — Frutices. Cytisus Auct. Folia ternata.

1. *C. proliferus*. Sprossendes Z. Caulis erectus. Foliola lanceolata sericea. Fl. laterales umbellato-aggregati. Leg. villosa. — Stamm aufrecht. Blättchen lanzettförmig, seidenartig. Blüten an den Seiten doldig gehäuft. Hüllen zottig. Auf Teneriffa. Weisse Blumen. — *C. leucanthus*. Caule erecto, foliolis oblongo-lanceolatis fulvescenti sericeis, floribus capitatis, calycibus leguminibusque villosis. In Eur. austr. or. Fl. albi. Cytisus leucanthus Waldst. Kit. — *C. purpureus*. Caulibus procumbentibus virgatis subsimplicibus, foliol. oblongis glabris, fl. axillaribus solitariis, calycibus leguminibusque glabris. In Eur. austr. or. Fl. purpurei. Cytisus purp. Scop. — *C. biflorus*. Caulibus diffusis, foliolis oblongo-lanceolatis subpu-

bescentibus, flor. subbinatis, cal. leguminibusque adpresse pubescentibus. In Eur. austr. or. Fl. flavi. Cytis. bifl. L'Herit. — *C. elongatus* Waldst. Kit. Ramis elongatis decumbentibus, foliolis oblongis subtus adpresse villosis, flor. lateralibus subquaternis, cal. villosis. In sylvis Banatus. Flores flavi. — *C. austriacus* Linn. Caulibus erectis, foliolis lanceolatis adpresse pubescentibus, fl. terminalibus umbellatis, cal. legum. parce villosis. In Europ. austr. or. Fl. flavi. Cytis. austr. Linn. — *C. supinus*. Caulibus decumbentibus, foliolis oblongo-lanceolatis subtus subhirtis, fl. 2—4 subterminalibus pedicellatis, cal. leg. parce villosis. In Eur. austr. Flor. flavi. Cytis. sup. Jacq. — *C. hirsutus*. Caulibus decumbentibus, foliolis obovatis subtus villosis, fl. lateralibus brevissime pedicellatis aggregatis, cal. leg. hirsutis. In Eur. austr. Fl. flavi Cytis. hirs. Linn. — *C. capitatus*. Caulibus erectis, foliol. ovali-oblongis villosis, flor. terminalibus capitatis, cal. leg. villosis-hispidis. In Eur. med. et austr. Fl. flavi, sicci nigrescentes. Cytis. capitatus Linn.

20. *Adenocarpus*. Drüsenfrucht. Cal. labiatus $\frac{3}{4}$. Stam. monodelpha. Legumen compressum polyspermum muricato-glandulosum. — Kelch lippig $\frac{3}{4}$. Staubf. verwachsen. Hülse zusammengedrückt, vielsamig, scharf drüsig. — Frutices.

1. *A. divaricatus*. Spanische Dr. Rami albentes. Folia ternata remotiuscula, foliolis obovatis. Cal. labii inferioris dentes subaequales labio superiore haud multo longiores. — Aeste weisslich. Blätter dreifach, von einander ziemlich entfernt. Blättchen eiförmig, vorn breiter. Untere Kelchlippe hat fast gleiche Zähne nicht viel länger als die obere. Im südlich. Europa. Gelbe Blumen. Variat cal. glanduloso et pubescente. *A. hispanicus* Cand. Cytisus hispanicus Lam. Cyt. anagyrius L'Herit. sec. Cand. *A. telonensis* Cand. Cyt. telonensis Loisel. — *A. complicatus* diff. ramis non ita albentibus, calycis labii inferior. laciniis inaequalibus labio superiore multo longioribus. Ibid. *A. intermedius* Cand. Cytisus complicatus Brot. Var. ramulis glabris. *A. parvifolius* Cand. Cytis. parvifol. Lam. *A. divaricatus* L'Her. Cyt. complicatus Cand. fl. gall. — *A. foliolosus* Cand. diff. fol. dense appro-