



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Flore de l'Algérie

Alger, A. Jourdan, 1888-1910

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/10917>

v.1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/42248>

Page(s): Text, Page 594, Page 595

Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Generated 3 October 2024 10:51 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1740169i00042248.pdf>

This page intentionally left blank.

18521.
FLORE DE L'ALGÉRIE

ANCIENNE FLORE D'ALGER TRANSFORMÉE

CONTENANT

LA DESCRIPTION DE TOUTES LES PLANTES
SIGNALÉES JUSQU'A CE JOUR COMME SPONTANÉES
EN ALGÉRIE

PAR

BATTANDIER ET TRABUT

Professeurs à l'École de Médecine et de Pharmacie d'Alger

DICOTYLÉDONES

PAR

J.-A. BATTANDIER

1^{er} FASCICULE

THALAMIFLORES

ALGER

TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN

IMPRIMEUR-LIBRAIRE-ÉDITEUR

PARIS, LIBRAIRIE F. SAVY

77, Boulevard Saint-Germain, 77

1888

*Send all errors
as usual. Found the
all found*

C. mauritanicus Boiss., Voy. Esp., tab. 122; Munb., cat.; *C. sabatius* Lx, cat. Kab., vix Viv.; *C. sabatius* var. *mauritanicus* Ball, spic. — Plante hispide, pubescente ou presque glabre (L'Arba), à tiges grêles, simples ou peu rameuses; feuilles ovoïdes ou elliptiques brièvement pétiolées; pédoncules uni-triflores égalant la feuille ou plus longs; bractées lancéolées assez grandes; pédicelles égalant les calices; sépales ovés-lancéolés; corolle bleue assez grande; capsule glabre. ♀ Avril-juillet. Montagnes calcaires. Chenoua, L'Arba, Djurdjura, Bougie, Constantine, etc., etc. Espagne. Le *C. sabatius* est italien.

C. sabatius, var. *atlanticus* Ball. Maroc.

b. Plantes annuelles à fleurs bleues.

C. tricolor L.; Desf., Munb., cat. Kab.; Ball, spic.; *C. cupanianus* Todaro, inéd.; fig. Reich. 137-II. — Tiges décombantes, non volubiles, simples ou peu rameuses, hispides, surtout dans le haut; feuilles inférieures atténuées en pétiole, obovées-spatulées, les supérieures sessiles, lancéolées, pubescentes; pédoncules axillaires, plus longs que les feuilles, contournés après l'anthèse; sépales cordiformes-lancéolées, longuement hispides; corolle bleue au sommet, blanche dans le milieu, jaune dans le fond; étamines dépassant peu les sépales. ① C. C. C. Mars-mai. Forme des peuplements serrés dans les marnes argileuses du Tell. Rég. médit.

β *hortensis* fig. Reich. 137-I. — Grandes fleurs larges de 4-5 cent., d'un bleu intense au bord; pédoncules ne dépassant pas les feuilles et ne se recourbant pas; sépales hispides, larges, oblongs. Cult.; rare et même douteux, à l'état sauvage.

C. undulatus Cavanilles; Munb., cat.; Lx, cat. Kab.; Ball, spic.; *C. evolvuloides* Desf., fl. atl., tab. 49. — Tiges courtes, simples ou peu rameuses, hispides, bien feuillées; feuilles oblongues, ondulées, les inférieures brièvement pétiolées; fleurs petites, subsessiles; capsule globuleuse, hispide. ① Avril-mai. C. C. C. Terres argileuses du Tell. Espagne, Sicile.

C. siculus L.; Desf., fl. atl.; Munb., cat.; Lx, cat. Kab.; Ball, spic. — Plante glabrescente; tiges décombantes ou dressées dans les broussailles, parfois volubiles; feuilles pétiolées, ovoïdes-aiguës, tronquées à la base; pédoncules uniflores ou biflores, dépassant peu les feuilles, arqués bien au-dessous des bractées; bractées lancéolées; pédicelles presque nuls; corolle très petite; capsule glabre. ① Avril-mai. C. C. C. Broussailles, Rég. médit.

C. flexuosus Pomel. — Plante élançée à grandes feuilles; pédoncules biflores, bien plus longs que les feuilles et brusquement réfractés sous les bractées; bractées grandes; pédicelles l'un très court, l'autre allongé, bibractéolé et réfracté sous la fleur. ① R. Alger, Garrouban.

C. ELONGATUS Willd.; *C. pseudosiculus* Cav.; *C. geniculatus* Munby; *C. refractus* Pomel. — Pédoncules très grêles et très longs à 1-3 fleurs; bractées petites; pédicelles inégaux tous plus longs que le calice, à la fin épaissis vers la capsule et réfractés dans les bractées et les bractéoles. ① Garrouban, Mers-el-Kebir.

C. fatmensis Kunze; Munb., cat. — Voisin des précédents; feuilles irrégulièrement dentées, lobées; pédoncules ne dépassant pas le pétiole; pédicelles réfractés; bractées très petites; sépales ovales, très obtus, scarieux aux bords. ① Sahara constantinois (n. v.)

Sous-genre IPOMŒA L.

I. sagittata Desf., fl. atl.; Munb., cat. — Plante glabre, volubile, s'élevant à 3-5 mètres; feuilles pétiolées, les inférieures cordiformes-acuminées, les supérieures sagittées-lancéolées; pédoncules ordinairement uniflores, épais, égalant les pétioles; sépales ovoïdes, glabres; corolle purpurine-rosée, plus foncée intérieurement, longue de 5-7 cent.; grosses capsules arrondies; graines noires, laineuses sur les angles. ♀ Août. R. Marais de la Réghaïa, au bord de la rivière; marais de la Rassauta, La Calle, Bône, Djidjelli, L'Habra, Sicile, Espagne, Amérique du Nord.

Sous-genre BATATAS Choisy.

B. littoralis Choisy: *Ipomœa littoralis* Boissier, fl. d'Or.; *Convolvulus littoralis* L. Munb., cat. — Plante glabre; tiges rampantes, radicales, stolonifères; feuilles pétiolées, un peu charnues, en cœur à la base, ovées-panduriformes, trilobées ou tripartites à lobes parfois bifides; pédoncules axillaires uni-biflores, plus courts que la feuille; pédicelles plus longs que le calice; sépales elliptiques, obtus; corolles jaunâtres égalant 4-5 fois le calice; capsule biloculaire; 2 graines très velues. ♀ R. R. R. Bord de la mer, de Castiglione à Fouka (Clauson). Italie, Açores, Amérique.

B. edulis Choisy. *Patate*. — Très cultivé, subsp.

CRESSA L.

5 sépales égaux; corolle infundibuliforme à limbe plan, quinquéfide; étamines saillantes; 2 styles; stigmates capités; capsule bivalve, uni ou biloculaire, a une, rarement plusieurs graines.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Text]

WJar.,
ELORE DE L'ALGÉR
ANCIENNE BIORE V'ALGER TRANSFORMER
LA DESCRIPTION DE TOUTES LES PLANTES
SIGNALÉES JUSQU'A CE JOUR COMME SPONTANÉES
EN ALGÉRIE
PAR
BATTANDIER ET TRABUT
Professeurs à l'École de Médecine et de Pharmacie d'Alger
ED 2 —
DICOTYLÉDONES
PAR
J.-A. BATTANDIER
I^{er} FASCICULE
—
THALAMIFLORES
Re
ALGER
TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN
IMPRIMEUR-LIBRAIRE-ÉDITEUR
PARIS, LIBRAIRIE F. SAVY
77, Boulevard Saint-Germain, 77
1588

[Begin Page: Page 594]

— 094 —

C. mauritanicus Boiss., Voy. Esp., tab. 122; Munb., cat.;
C. sabatius Lx, cat. Kab., vix Viv.; *C. sabatius* var. *mauritanicus* Ball, spic. — Plante hispide, pubescente ou presque glabre (L'Arba), à tiges grêles, simples ou peu rameuses; feuilles ovoides ou elliptiques brièvement pétiolées; pédoncules uni-triflores égalant la feuille ou plus longs; bractées lancéolées assez grandes; pédicelles égalant les calices; sépales ovés-lancéolés; corolle bleue assez grande; capsule glabre. % Avril-juillet. Montagnes calcaires. Chenoua, L'Arba, Djurdjura, Bougie, Constantine, etc., etc. Espagne. Le *C. sabatius* est italien.

C. sabatius, var. *atlanticus* Ball. Maroc.

b. Plantes annuelles à fleurs bleues.

«*CG. tricolor* [L.; Desf., Munb., cat. Kab.; Bail, spic.540: *cupanianus* Todaro, inéd.; fig. Reich. 137-II. — Tiges décom-
bantes, non volubiles, simples ou peu rameuses, hispides, surtout dans le haut; feuilles inférieures atténuées en pétiole, obovées-spatulées, les supérieures sessiles, lancéolées, pubescentes; pédoncules axillaires, plus longs que les feuilles, contournés après l'anthèse; sépales cordiformes-lancéolées, longuement hispides; corolle bleue au sommet, blanche dans le milieu, jaune dans le fond; étamines dépassant peu les

sépales. @C. C. C. Mars-mai. Forme des peuplements serrés dans les marnes argileuses du Tell, Rég. médit.

B hortensis fig. Reich. 137-I. — Grandes fleurs larges de 4-5 cent., d'un bleu intense au bord ; pédoncules ne dépassant pas les feuilles et ne se recourbant pas ; sépales hispides, larges, oblongs. Cult. ; rare et même douteux, à l'état sauvage.

C. undulatus Cavaniiles ; Munb., cat. ; Lx, cat. Kab. ; Ball, spic. ; *C. evolouloides* Desf., fi. at, tab. 49. — Tiges courtes, simples ou peu rameuses, hispides, bien feuillées ; feuilles oblongues, ondulées, les inférieures brièvement pétiolées ; fleurs petites, subsessiles ; capsule globuleuse, hispide. @ Avril-mai. C. C. C. Terres argileuses du Tell. Espagne, Sicile. *C. sicus* L. ; Desf., fl. atl. ; Munb., cat., Lx, cat. Kab. ; Ball, spic. — Plante glabrescente ; tiges décombantes ou dressées dans les broussailles, parfois volubiles ; feuilles pétiolées, ovoïdes-aiguës, tronquées à la base ; pédoncules "uniflores ou biflores, dépassant peu les feuilles, arqués bien au-dessous des bractées ; bractées lancéolées ; pédicelles presque nuls ; corolle très petite ; capsule glabre. © Avril mai. C. C. C. Broussailles, Rég. médit.

[Begin Page: Page 595]

— 595 —

C. fleœuosus Pomel. — Plante élancée à grandes feuilles ; pédoncules biflores, bien plus longs que les feuilles et brusquement réfractés sous les bractées ; bractées grandes ; pédicelles l'un très court, l'autre allongé, bibractéolé et réfracté sous la fleur. @ R. Alger, Garrouban.

C. econ Garus Willd. ; €, *pseudosicus* Cav. ; *C. geniculatus* Munby ; *C. refractus* Pomel. — Pédoncules très grêles et très longs à 1-3 fleurs ; bractées petites ; pédicelles inégaux tous plus longs que le calice, à la fin épaissis vers la capsule et réfractés dans les bractées et les bractéoles. @) Garrouban, Mers-el-Kebir.

C. fatmensis Kunze ; Munb., cat. — Voisin des précédents ; feuilles irrégulièrement dentées, lobées ; pédoncules ne dépassant pas le pétiole ; pédicelles réfractés ; bractées très petites ; sépales ovales, très obtus, scarieux aux bords. @ Sahara constantinois (n. v.)

Sous-genre IPOMŒA L.

I. sagittata Desf., fl. atl. ; Munb., cat. — Plante glabre, volubile, s'élevant à 3-5 mètres ; feuilles pétiolées, les inférieures cordiformes-acuminées, les supérieures sagittées-lancéolées ; pédoncules ordinairement uniflores, épais, égalant les pétioles ; sépales ovoïdes, glabres ; corolle purpurine-rosée, plus foncée intérieurement, longue de 5-7 cent. ; grosses capsules arrondies ; graines noires, laineuses sur les angles. % Août. R. Marais de la Réghaïa, au bord de la rivière ; marais de la Rassauta, La Calle, Bône, Djidjelli, L'Habra, Sicile, Espagne, Amérique du Nord.

SOUS-genre BATATAS Choisy.

B. littoralis Choisy : *Zpomæa littoralis* Boiïssier, fl. d'Or. ; *Convolvulus littoralis* L. Munb., cat. — Plante glabre ; tiges rampantes, radicales, stolonifères ; feuilles pétiolées, un peu charnues, en cœur à la base, ovées-panduriformes, trilobées ou tripartites à lobes parfois bifides ; pédoncules axillaires

uni-biflores, plus courts que la feuille; pédicelles plus longs que le calice; sépales elliptiques, obtus; corolles jaunâtres égalant 4-5 fois le calice ; capsule biloculaire; 2 graines très velues. % R. R. R. Bord de la mer, de Castiglione à Fouka (Clauson). Italie, Açores, Amérique.

B. edulis Choisy. Patate. — Très cultivé, subsp.

CRESSA L.

o sépales égaux; corolle infundibuliforme à limbe plan, quinquéfide ; étamines saillantes ; 2 styles; stigmates capités; capsule bivalve, uni ou biloculaire, à une, rarement plusieurs graines.