



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Index seminum in Horto Botanico Berolinensi...  
collectorum**

Berolini, Typis C. Feisteri ,

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/83585>

**1861 appendix, 1867, 1867 appendix 1-3, 1871 appen:**

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/158976>

Page(s): Page 9

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 23 March 2024 5:52 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1684354i00158976.pdf>

This page intentionally left blank.

barina, ventre dilute miniata, limbo saturate cinnabarrino, tuberculis minimis concoloribus setulisque pelucidis levissime pubescens, limbo glaberrimo, intus flava. Stylus rubens, pubescens, denique longe exsertus.

Corollae praesertim figura e basi gracili clavata magisque curvata atque coloris specie ab affinis evidenter diversa.

Hanc quoque cl. Gollmer in ditone Caracasana anno 1857 vel 1858 legit.

**6. GESNERA WARSZEWICZII** *Bouché et Hanst.*

Caulis subsimplex, hirtus; folia ovata, petiolata, plana, basi longe attenuata, inferiora obtusa, crenata, supra hirto-scabra, subtus villosula; pedunculi axillares, in racemum terminalem congregati, petiolo longiores et flore et folio breviores; calyx ample campanulatus, quinquecarinatus; lacinae tubo breviores, tenuiter acuminatae; corolla ample tubulosa et ventricosa, recta, saturate incarnata; labium superius erectum magnum, aequae longum ac latum.

Caulis robustus basi 4 lin. crassus, erectus, 1½-2 ped. altus, pilis patentibus aut reflexis, strictis villosulo-hirtus, laete viridis lineolisque rasis atropurpureis pictus. Folia aequae viridia, elliptica vel ovata vel obovata, superiora obtusiuscula, basi longe cuneatim in petiolum angustata, profunde crenata, crenaturis utrinque 20-30, basin versus evanidis; pubes paginae superioris e setulis patulis brevibus densis, inferioris e pilis hamatis parvis fere nervos tantum tegentibus constituta; nervi secundarii utriusque lateris 6-8, nunc di-nunc convergentes, infimi retrorsum divergentes; 2-3 poll. longa, 1-1,5 poll. lata, petiolo crasso 5-8 lin. longo. Pedunculi in axillis foliorum superiorum paulatim ad bractearum formam decrescentium singuli racemum satis densum pyramidalem formantes, villosuli, 8-12 lin. longi, bracteolis interdum foliaceis vel 6 lin. longis fulti, arrecti. Calyx 5-6 lin. amplus, amplior quam altus, nonnihil compressus, lateribus inter carinas concavis, sparse pubescens, basi rubens, in pedunculo subobliquus, corollae fere tertiam partem aequans; tubus 3,5 lin., lacinae e lata basi breviter triangulares, 1,5-2 lin. longae, marginibus replicatis apiceque fere subulato recurvatae vel patulae. Corolla multo amplior quam in praecedentibus, stricte erecta, 18-20 lin. longa; baseos tumiditas dorsalis obtusangula 3-4 lin. ampla, tubus dein valde ad 2,5 lin. (transverse 1,5 lin.) contractus, tum in ventrem 5 lin. amplum, transverse ad 3,5 lin. compressum tumescens, dorso aequae vel magis quam ventre convexus; faux nonnihil constricta, 3-4,5 lin. ampla; labium superius rotundatum vel obtusangulum, 4,5 lin. longum latumque, basi subangustatum, compressum, lobi ceteri 3,5-4,5 lin. lati, 1,5-2 lin. longi, patuli, totus limbus acutangulus valde inclinatus; color ventris pallidior, baseos lutescens, paginae interioris flavus, marginis limbi praecipue saturate puniceo-incarnatus; pubes alba e tuberculis purpureis orta ex parte glandulifera. Ovarium cum stylo pallido pubescens; stigma vix incrassatum, atropurpureum, denique exsertum.

Speciem toto habitu a plerisque congeneribus admodum diversam, alius quoque terrae incolam, cl. Warszewicz in Guatemala se invenisse refert. Anno

jam 1849 in horto nostro excolta est. Specimen siccum in herbario Monacensi asservatum a cl. Karwinski lectum huic adscribendum videtur.

(I. Hanstein.)

**CRYPTOTAENIA ELEGANS** *Webb.* in Bourgeau Plant. canar. exsicc. No. 424 (nomen sine descriptione).

Biennis erecta, radice fusiformi-fibrosa horizontaliter ramosa, caule 2-3-pedali glabro, foliis basilaribus summisque ternatis, caulinis plerisque ambitu triangularibus pinnatis vel bipinnatis, pauci-jugis segmentis irregulariter subtriangularibus majusculis (1-1½ poll. longis, 1 poll. fere latis), basi valde inaequalibus apice acutatis lobatis margine inaequaliter serratis, serraturis acutissime mucronulatis, segmento infimo lobo laterali vel binis profunde partito, segmentorum paribus superioribus et secundariis sessilibus omnibus subtus pallide viridibus reticulato-venosis pilosis, supra glabrescentibus ad nervos tantum parce pilosis margine ciliatis, petiolo folium aequante vel longiore subpiloso, vaginis ventricosus glabris ciliatis, rhachi cum petioulis valde pilosa, inflorescentia ample paniculata subnuda dichotome ramosa, umbellis numerosis axillaribus laxae positae, pedunculis filiformibus glabris umbellam aequantibus, hac pauci-radiata, radiis 4-6 capillaribus elongatis inaequalibus glabris, involucri nullo vel mono-3-phylo, phyllis lineari-subulatis ciliatis 3-nerviis (2-3 lin. longis), involucello plerumque 3-phylo brevissimo, phyllis lineari-subulatis parce ciliatis, umbellulis 3-4-floris, pedicellis inaequalibus, floribus minutis, petalis ovatis apice subtruncatis emarginatis albis, mericarpiis oblongis laevibus atris (circ. 1 lin. longis) maturis curvulis, stylopodio brevi fusco, stylis apice subincrassatis erectis denique reflexis, carpophoro libero ad basin bipartito.

Habitat in opacis lauretorum Teneriffae: las Vueltas de Taganana, nec non Palmae: retro los Sauces, in silvula quadam *Oreodaphnes foetentis*, Fajanita de los Tiles ab incolis dicta, ad aquarum ductus vallis Barranco del Agua marginem, ubi post Bourgaeum, primum inventorem, speciem hanc singularem reperimus. Floret Junio ad Augustum. Introducta in hortum a. 1856. (C. Bolle.)

**PIMPINELLA ANAGODENDRON**  
*C. Bolle.*

Suffruticosa puberulo-tomentosa, caule pauciramoso basi nudo fusco pro majore parte vaginis foliorum emortuorum tectis (digitum parvum crasso), ramulis novellis herbaceis teretibus tenuiter striatis dense puberulo-tomentosis, foliis inferioribus magnis ad basin caulis horni positae late triangularibus irregulariter et concinne decomposito-bipinnatis, segmentis numerosis profunde laciniatis serratis, summis confluentibus trifidis, omnibus minutis reticulato-venosis viridibus, petiolo folio longiore late vaginante, caule superiore parce foliato foliis conformibus sed inferioribus multo minoribus, summo subnudo vaginis tantum obsito 3-4-ramoso, involucri monophyllo lineari brevissimo, umbellis 10-12-radiatis, involucello nullo, petalis apice emarginatis velutinis albis, mericarpiis oblongis albide tomentoso-hirtis, stylis stylopodio plus duplo longioribus demum horizontaliter curvatis.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 9]