

Verbr.: Mit Sämereien nach Montevideo verschleppt (Sellow; Chamisso et Schlechtendal, Linnaea II. 1827. S. 579).

288. *Calceolaria chelidonioides* HB.

Tenerife: Unkraut in Gärten u. Anlagen von Laguna!! — Santa Cruz (Kn. 23).

293. *Campylanthus salsolooides* (L. f.) Roth.

Gran Canaria: Caldera de Bandama (Bornm. 03).

Tenerife: Zw. Santa Cruz u. San Andrés; Beo. Infierno bei Adeje. (Buch 25). — Beo. de Jerque bei Arico (WB 50a). — Santa Cruz, im Beo. Santos (Masf. 82). — Oberteil des Valle Bufadero, längs einer Gangmauer mit nach unten halsförmig verjüngtem Felskopf (Sim. 90). — Adeje bis Guia (Ktze. 91). — Güímar (Per.); Garachico, Felsen (Kn. 23). — Über der Straße von Santa Cruz nach San Andrés, besonders beim englischen Kohlendepot, an nackten, senkrechten Felsen in Spalten wurzelnd, mit starker Borke am Stammgrund u. Wurzelhals. Blätter stets sukulenta mit zentraler Wasserspeicherung wie diejenigen der Plocama pendula, 13. II. 18 b; Beo. Santos, im Kessel in Santa Cruz an unzugänglichen Felsen, 23. XI. 18 b (Masferrers Fundstelle ?); Beo. Santos oberhalb der Puente de la Zurita, bei der Einmündung des Beo. del Valle u. besonders häufig in diesem, in Felsspalten, 23. XI. 19 b u. f!! — Die Wuchsform „var. penduliflora Pit.“ findet sich häufig mit dem Typ an der gleichen Pflanze!!

Gomera: Hermigua (Kn. 23).

292. *Digitalis canariensis* L. (= Callianassa c. Webb = Isoplexis c. Lindl.).

Tenerife: Mercedeswald; Wald unter Agua Mansa; Tigaiga, über Realejo Alto (Buch 25). — Beo. de Castro, gegen Icod Alto (Masf. 82). — Wald Mercedes bei Laguna (Ktze. 91 als var. glaberrima u. var. tomentosa). — Wälder bei Las Mercedes (Bornm. 03). — Anagagebirge, Beo. zw. Draguillo u. Cruz del Draguillo (Schröt. 09). — Beo. Badajoz bei Güímar, 4—500 m; bei Palmar (Bornm. 03). — Beo. del Río u. Beo. Badajoz bei Güímar; Beo. Castro; Icod de los Vinos, Kiefernwälder über La Guancha (Bornm. 03 als var. tomentosa Ktze.). — Beo. Río bei Güímar (Bornm. 03 als var. glaberrima Ktze.). — Minas de Abajo, 18. VI. 17 b; Valle de las Núñez, Oberseite, 11. III. 19 b; Hänge des Lomo del Estercolado, 14. VI. 17 b u. f; Minas de Arriba, 12. VIII. 18 b; Quelle oberhalb Tornero, weiter zw. Tornero u. Portezuelo, 16. II. 19 b; Tornero bis Valle Cuervo sowie an der Fuente de los Alamos, 20. VI. 17 b; Beo. Mulato; Fuente del Castaño, 22. VI. 17 b u. beginn. f; Wälder von Pedro Alvarez; Wald von Agua García (Berth. 40), 19. VIII. 18 b u. f!! Palma (WB 50a).

293. — — var. *isabelliana* (Webb) Bornm. (= Callianassa i. Webb).

Gran Canaria: Beo. de Tirajana (WB 50a). — Los Tiles, Mt. Doramas (Bour.; Kn. 23). — Nordabhang des Aschenhügels bei Monte (E. 10).

Tenerife: Beo. del Río (Morr. 95).

Anm.: *D. sceptrum L.* kommt entgegen der Angabe in Siebert-Voß (Vilmorins Blumengärtnerei. 3. Aufl. Berlin 1896. S. 746) auf den Kanaren nicht vor.

289. ***Linaria cymbalaria (L.) Mill.*** (= *Cymbalaria cymb.* [L.] Wettst.).

Gran Canaria: Tafira, an Mauern (Bornm. 03).

Tenerife: Icod, in Rindenrissen des Drachenbaums (Kn. 23). — Laguna, an Mauern, Dachrinnen, Wasserspeichern u. -filtern sehr häufig, 8. II. u. 15. III. 18 b; Steinmauer zw. Portezuelo u. der Fuente del Castaño, 23. IV. 17 b; Steinmauer unterhalb der Cuesta de San Bernabé, 17. III. 19 b; an Wasserfiltern in Santa Cruz, Tegueste, Tegina, Tacoronte, Villa u. Puerto Orotava!!; mitunter wohl absichtlich gepflanzt.

Palma (subspontan, Bornm. 03): Santa Cruz, Mauern usw.!!

289. ***L. elatine (L.) Mill.***

Tenerife: Über Villa Orotava, gegen Agua Mansa (Buch 25).

289. ***L. graeca Chav.***

Tenerife: Taorotal, gemein (Masf. 82).

290. ***L. sagittata Hook. f.*** (= *L. heterophylla* Steud. non Desf.; Kn. 23).

Lanzarote (Berth. 40. Ktze. 91).

Fuerteventura (Berth. 40): Küste bei Puerto Cabras (Kn. 23).

* ***L. simplex DC.***

Tenerife (Kn. 23).

290. ***L. spartea Hoffm. et Lk.***

Tenerife: Güímar, Küste (Salter; Ban. 22).

291. ***L. spartoides Brouss.*** (= *L. scoparia* Brouss.).

Gran Canaria: Bei Las Palmas (WB 50a). — Beo. de Guiniguada (E. 10). — San José (Hus.); Agaete; Moya (Kn. 23).

Tenerife: Güímar (Berth. 40. Salter; Ban. 22.) — Punta de la Aguja (WB 50a), nicht Beo. del Agua, wie Pitard-Proust schreiben.

Gomera: Hermigua; über Valle Gran Rey, 450 m (Kn. 23).

Verbreitung: Afrika, Cabo Verde (Sauer 80).

292. ***Lyperia canariensis Webb.***

Gran Canaria: Alter Krater der Bandama (Berth. 40 als *Manulea* c.). —

Roque de Bentaiga; Fortaleza (Sim. 91).

Anm.: Obwohl *Manulea canariensis* später von WB nicht mehr erwähnt wird und auch im Index kewensis nicht aufgeführt ist, setze ich sie doch gleich *Lyperia canariensis*; zum Beweis verweise ich auf die Droge „Flores Manulae“, die Blüten von *Lyperia crocea* Eckl.

295. ***Parentucellia viscosa (L.)*** . . . (= *Bartsia* v. L. = *Eufragia* v. Benth.

= *Rhinanthus maximus* Desf.).

Tenerife: Über Villa Orotava, gegen den Wald von Agua Mansa; Cumbre über Taganana, gegen San Andrés (Buch 25). — Über Santa Ursula, am Aufstieg zum Beo. del Valle (Masf. 82). — La Jardina, auf Wiesen u. Äckern nicht selten, 20. IV. 17 b; Höhe zw. San Roque u. Mesa Gallardina, 13. VI. 17 b u. f; Mesa Gallardina, 24. IV. 17 b;