

Digitalis hispanica angustifolia, flore nigricante. *Tournef. inst.* 166.

Digitalis angustifolia hispanica. *Bocc. mus.* 2. p. 136. t. 98.
Habitat in Hispania. h.

Caulis suffruticosus, lignosus. Rami oppositi, pauci.
Folia angusto-lanceolata, basi quasi adnata, glabra,
ubi non floret conferta, alias alterna. Racemi ter-
minales. Bractea lanceolata. Calycis foliola ovata,
acutiuscula. Corollae cernuae, obtusae, obscure purpu-
rascentes ore villosa; labio superiore integro; infimo
paulo longiore; lateralibus brevioribus superiore.

canariensis. 6. *DIGITALIS calycinis foliolis lanceolatis, corollis*
bilabiatis acutis, caule fruticoso. *Mill. dict.* t. 120.

Gesneria foliis lanceolatis serratis, pedunculo terminali
laxe spicato. *Hort. cliff.* 318.

Digitalis acanthoides canariensis frutescens, flore aureo.
Comm. hort. 2. p. 105. t. 53.

Digitali affinis canariensis, solidaginis acutis foliis levi-
ter pilosis, flore aureo cucullato. *Pluk. alm.* 4. o. t.
325. f. 2.

Habitat in Canariis. h.

BIGNONIA.

Catalpa. 1. *BIGNONIA foliis simplicibus cordatis ternis, caule*
erecto, floribus diandris. *Jacq. amer.* 25.

Bignonia foliis simplicibus cordatis. *Hort. cliff.* 317.
Roy. lugdb. 289.

Bignonia arborea, foliis ovatis verticillato-ternatis, si-
liqua gracili longissima. *Brown jam.* 264.

Bignonia arbor, folio singulari undulato, siliquis lon-
gissimis & angustissimis. *Plum. spec.* 5. ic. 57.

Bignonia americana, arbor syringae caeruleae folio, flore
purpureo. *Dubam. arb.* 1. p. 104. t. 41.

Bignonia urucu foliis, flore sordide albo intus maculis
purpureis & luteis adperso, siliqua longissima & an-
gultissima. *Catesb. car.* 1. p. 49. t. 49.

Kawara Fifagi. *Kampff. jap.* 841. t. 842.

Cambulu. *Kheed. mal.* 1. p. 75. t. 41?

Habitat in Japonia, Carolina. h.

Arbor erecta. Folia ternata. Cirrhi nulli. Flores dian-
dri: staminibus duobus antheriferis; reliquis tribus
castratis. Variat foliis cordatis & ovatis.