



INDEX

COMPLECTENS

**semina in Horto Botanico regio Monspeliensi
anno 1838 collecta,**

PRO MUTUA COMMUTATIONE OBLATA,

additis characteribus specificis plantarum quarumdam, vel ex toto novarum,
vel accuratius nuper observatarum.



Monspelii, januarii 1859.

RAFFENEAU-DELILE,

Prof. Bot.

MONSPELII, TYPIS J. MARTEL NATI MAJORIS.

- DIGITALIS** purpurea L.
DOLICHOS abyssinicus,
 angustissimus,
 atrosanguineus,
 biflorus L.
 — var. microspermus albovi-
 — semine roseo. [rens.
 chinensis.
 Lablab albus.
 — var. semine virescente.
 — pictus,
 sesquipedalis L.
DORYCNIUM monspeliense W.

E

- ECHINOPHORA** spinosa L.
 tenuifolia L.
 trichophylla Smith.
ECHIUM italicum L.
 pyrenaicum Desf.
ELYMUS Caput Medusæ L.
 giganteus Vahl.
 virginicus L.
ERANTHEMUM pulchellum Andr.
ERODIUM Botrys Bertol.
 Bovei Nob.
 Undiquè pallens, cinereo-pubens;
 caule ramoso diffuso; foliis subcordatis,
 5-vel 5-lobis, dentatis; petalis subrotundis,
 carneis.
 Natum è seminibus Sinaicis Cl. Bovei.
 chium W.
 — var. grandiflorum.
 — var. flore carneo.
 ciconium W.
 geifolium Desf.
 gruinum W.
 laciniatum W.
 malachoides W.
 melanostigma Martius }
 bipinnatum Moris }
- Cum Erodio cicutario præcipuè militans,
 sed distinctum areolis baseos petalorum
 superiorum geminatis, puncticulato-atomariis,
 limitatis, æqualibus.

- var. thalictroides.
 Foliolorum segmentis brevioribus, rotundatis,
 crenatis; areolis baseos petalorum duorum
 superiorum pictis, atomariis, æqualibus.
 Ex apricis campestribus Portus Juvenalis.
 — var. grandiflorum.
 Foliis lucidulis, pinnatisectis, segmentis
 ovatis, in dentes acutos fissis; petalis
 duobus superioribus obovatis, segmenta
 foliorum magnitudine æquantibus, basi
 pictis areolis atomariis inæqualibus.
Gussoni Tenore.
gruinum W.
laciniatum W.
 — var. majus.
malachoides W.
Salzmanni Nob.

Caule prostrato ramoso; foliis daucoides,
 pinnatisectis, segmentis multipartitis,
 ovatis, in lobulos lineares abeuntibus;
 pedunculis longis, crassis, multifloris.

Lacinie foliorum dense; planta hirsuta,
 interdum viscida, undè Cl. Salzmännus
 nomen Erodii viscosi primùm imposuerat
 plantæ in Hispaniâ propè urbem Malaga.

Viventem habuimus, in horto, è Portu
 Juvenali, ubi in eam incidere, et semina
 colligere, nobis contigit.

sebaceum Nob.

Caule subnullo; foliis omnibus quasi
 radicalibus, pinnatisectis, segmentis in
 lobos acutos partitis; floribus umbellatis,
 petalis angustè obovatis, unguibus
 densius coloratis; plantâ totâ hispidulo-
 viscidulâ, sebum spirante.

Cum priore ad Portum Juvenalem.

stellatum Nob.

Caule diffuso, subhirsuto; foliis pinnatisectis,
 lobis incisis, dentatis, petalis obovatis,
 ungue atropurpureo, præsertim duobus
 superioribus, signatis.

Nova è campestribus Portus Juvenalis.

Icones Erodii sebacei et E. stellati ad
 calcem Indicis subjunxi, quibus eniteat
 florum elegantia, præsertim cum semina
 primo plantarum adventus anno distribuenda,
 non sint multa, votis nostris haud æqua,
 suffectura tamen ad plantas citius aut
 serius vulgares faciendas.

EUPHORBIA Characias L.
 variegata Colla.

EXACUM Candollii Bast.