



*Pithyusa.*

35. EUPHORBIA umbella quinquefida: bifida, involu-  
cellis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis: infimis in-  
volutis retrorsum imbricatis. *Diff. euph.* 36.

Tithymalus foliis brevibus aculeatis. *Baub. pin* 292.

Pithyusa. *Dalech. hist.* 1652.

*Habitat in arenosis Belgii, Hispaniæ, Italiæ.* 2

*portlandica.*

36. EUPHORBIA umbella quinquefida: dichotoma, in-  
volucellis cordatis, foliis lineari-lanceolatis obtusiu-  
sculis acuminatis reflexis.

Tithymalus maritimus minor. *Raj. syn.* 3. p. 313. t.  
24. f. 6.

*Habitat in Angliæ Devonshire.* 2

*Paralias.*

37. EUPHORBIA umbella subquinquefida: bifida, invo-  
lucellis cordato-reniformibus, foliis sursum imbrica-  
tis. *Diff. euph.* 53.

Euphorbia inermis, foliis setaceo-linearibus confertis,  
umbella universal multifida, partialibus ramosè bifidis.

*Hort. cliff.* 200. *Roy. lugdb.* 193. *Gort. getr.* 306.

Tithymalus maritimus. *Baub. pin.* 291. *Dod. pempt.*  
372. f. 1. 2.

Tithymalus paralias. *Cam. epit.* 962.

*Habitat in Europæ arena maritima.* 2

*aleppica.*

38. EUPHORBIA umbella quinquefida: dichotoma, in-  
volucellis ovato-lanceolatis mucronatis, foliis inferio-  
ribus setaceis. *Diff. euph.* 37.

Tithymalus foliis inferioribus capillaceis: superioribus