

# FLORA PEDEMONTANA

S I V E

ENUMERATIO METHODICA

STIRPIUM INDIGENARUM PEDEMONTII

AUCTORE

CAROLO ALLONIO

IN ARCH. TAUR. PROF. BOT. EM., HORT. PUBL., ET MUS. RER. NAT. DIR. PRIM.,  
R. SCIENT. TAUR. ACAD. SOCIO, ET THESAUR. FERP., NECNON ACADEM. BONON.,  
LUGD., ET MADRIT.; SOCIET. BASIL., BEROL. NAT. CUR., PHYSICO-BOT. FLOR., GOTT.,  
LOND., LUND., PATRIOT. MEDIOL., MONSP., R. MEDIC. PARIS., PATAV., &c. SOCIO

TOMUS PRIMUS.



AUGUSTAE TAVERNORUM

EXCUDEBAT IOANNES MICHAEL BRIOLUS

R. SCIENTIARUM ACADEMIE IMPRESSOR ET BIBLIOPOLA

MDCCLXXXV.

## 1046. EUPHORBIA Taurinensis N. tab. 83. fig. 2.

*Euphorbia umbella quinquefida bifida, caule ramoso, foliis lineari-lanceolatis, involucrio universaliter tetraphyllo dependente.*

*Loc.* Nascitur circa *Lusengo* non procul ab *Augusta Taurinorum*. *ANNUA.*

*DESCR.* EUPHORBIA *Taurinensis* ab initio aprilis ad finem junii vivit. Planta erecta. Caules glabri rotundi virides, inferius rubentes. Ad imum caulis solet minor planta nasci. Folia lineari-lanceolata vix petiolata, inferius aliquantum dependentia, glaberrima, subtus pallidiora, sine obtuse acuminato, sed in primis foliis quandoque emarginato. Folia duarum circiter unciarum intervallo distant, atque ex singulis alis foliorum ramus, sive pedunculus nudus floriger. Umbella terminalis saepius quadrifida, radiis trium, aut quatuor unciarum longitudine nudis, deinde bifidis. In horum divisione sedet flos secundi radii unciae unius circiter longitudine: hi triflori: medius flos nudus, duo laterales duobus foliolis comprehenduntur, sive involucrio diphylo. Involucrum universale tetraphyllum ex foliis caulinis similibus, sed amplioribus, & longioribus propendentibus. Involucra partialia ex foliolis duobus rhombico-triangularibus, sessilibus. Capsularum seminalium dorsum tuberculatum. Petala bicornia semilunata. Fructus de more gentis petiolatus. Accedit ad EUPHORBIAM *segetalem*, sed *Taurinensis* longe ramosior est, ramis etiam ex inferioribus foliis prodeuntibus. Folia habet pallide virentia substantiae minus firmae. Involucris universalis folia latiora, & dependentia. Totam plantam ramis, & involucris radiis divaricata. In EUPHORBIA *segetali* caules firmi erecti. Folia angustiora subglauca, & crassiora, confertiora, & reflexa, minus decidua. Umbella quinquefida, aut sex radiorum. Modo caeterum florenti, & seminibus conveniunt.

## 1047. EUPHORBIA helioscopia.

*ICON. TAUR. Vol. III. tab. 73.*

*Euphorbia umbella quinquefida trifida dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis.* LINN. spec. p. 658.

*Tithymalus foliis petiolatis subrotundis serratis, stipulis rotundis serratis.* HALL. hist. 2. n. 1050.

*Euphorbia umbella quinquefida trifida dichotoma, involucellis ovatis, petalis subrotundis, capsulis glabris.* SCOP. Fl. Carn. p. 434. n. 9.

*Tithymalus helioscopius.* TOURN. inst. 87.

*Tithymalus non acris, foliis serratis rotundo-terminatis, radiis umbellae quinque latissimis.* HALL. Gott. 37.

*Tithymalus helioscopius.* BAUH. pin. 291.

*Loc.* Secus arva, & in vineis abunde. *ANNUA.*

## 1048. EUPHORBIA carniolica. JACQ. Fl. Austr. append. tab. 14.

*Tithymalus pilosus.* SCOP. Fl. Carn. 1. p. 336. tab. 15.

*Loc.* Non infrequens in pascuis agri *Pedemontani*, & ad limites agtorum. *PERENNIS.*

## 1049. EUPHORBIA serrata

*ICON. TAUR. Vol. III. tab. 83.*

*Euphorbia umbella quinquefida, trifida dichotoma, involucellis diphyllis reniformibus, foliis amplexicaulibus cordatis serratis.* LINN. spec. p. 658.

*Tithymalus serratus.* LAM. Fl. Franc. tom. 3. p. 91.

*Tithymalus characias folio serrato.* BAUH. pin. 290.

*Tithymalus myrtilis valentinus.* CLUS. hist. 2. p. 189.

*Loc.* Ubique locis incultis agri *Nicaeensis*, & in valle *Augustae Praetoriae* circa *S. Vincent.* *PERENNIS.*

## 1050. EUPHORBIA verrucosa.

*ICON. TAUR. Vol. III. tab. 79. & Vol. XXI. tab. 61.*

*Euphorbia umbella quinquefida subtrifida, bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis*