



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Neue Denkschriften der Allgemeinen Schweizerischen
Gesellschaft für die Gesammten Naturwissenschaften**

Zurich,

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/9600>

Band 15 - Band 16: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/39695>

Page(s): Page 145

Holding Institution: Natural History Museum Library, London

Sponsored by: Natural History Museum Library, London

Generated 26 March 2024 3:14 AM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1685025i00039695.pdf>

This page intentionally left blank.

- *Datura stramonium*. L.
- .. *Hyoscyamus albus*. L.
- *Lycium afrum*. L.

Heliotropeae.

- .. *Heliotropium erosum*. Lem.
- .. — *europaeum*. L.
- .. *Messerschmidia fruticosa*.

Boragineae.

- . *Echium violaceum*. L.
- — *plantagineum*. L.
- . *Lithospermum arvense*. L.
- — *apulum*. L.
- . *Borago officinalis*. L.
- . *Anchusa italicica*. Retz.

Rubiaceae.

- .. *Rubia peregrina*. L.
- .. *Galium aparine*. L.
- — *parisiene*. L.
- — *tricorne*. Will.

Umbelliferae.

- .. *Bupleurum glaucum*. D. C.
- .. *Apium graveolens*. L.
- *Ridolphia segetum*. L. sp.
- .. *Ferula lancerotensis*. Parlat.

Ferula caule tereti, foliis supra decompositis, laciniis filiformibus, brevibus, acutis, planis, foliolo terminali haud elongato, umbella centrali subsessili, umbellis lateralibus longe pedunculatis, involucellis umbellarum lateralium persistentibus, floribus parvis (luteis), carpophoris... In insula Lanzarota prope sacellum Mariae de las Nieves, legit Cl. Hartung, species quoad folia Ferulam Barrelieri et quoad flores Ferulam communem referens, sed ab illa inflorescentiae partibus omnino diversa, ab hac praecipue foliorum laci-

niarum forma et involucellorum umbellarum lateralium persistentia distincta. — *Ferula communis*? Webb et Berthelot hist. nat. des Iles Canar. III. p. 161.

- .. *Torilis infesta*. Smith.
- . *Drusa oppositifolia*. D. C.
- . *Scandix pecten*. L.

Ranunculaceae.

- . *Ranunculus creticus*. L.
- .. *Adonis intermedius*. Webb.
- — *aestivalis*.

Papaveraceae.

- *Papaver hybridum*. L.
- .. — *dubium*. L.
- — *somniferum*. L.
var. *setigera*.
- *Glaucium corniculatum*. L. sp.

Fumariaceae.

- *Fumaria officinalis*. L.
- — *Vallantii*. Loiss.
- — *parviflora*. Lamk.

Cruciferae.

- .. *Matthiola parviflora*. Shousb.
- . — *incana*. Rob. Brown.
- . — *tristis*. R. Br.
- .. *Eruca sativa* var. Lamk.
- .. *Erucastrum canariense*. Webb.
- .. *Hirschfeldia adpressa*. Moench.
- .. *Raphanus raphanisarum*. L.
- *Rapistrum rugosum*. L.
- .. *Lobularia lybica*. Vio.
- — *intermedia*. Webb.
- .. *Notoceras canariense*. R. Brown.
- .. *Capsella bursa pastoris*. L. sp.
- . *Biscutella auriculata*. L.
- . *Sisymbrium erysimoides*. Desf.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 145]

145

Dalura stramonium. L.

Hyoscyamus albus. L,

• L\ cium afrum. L.

Beliotropeae.

Irrliotropium erosum. Lein.

— europaeum. I..

Messerschmidtia, fruticosa.

Barragineae.

Erbium violaceum. I..

— plantagineum. I..

Lithospennum arvense. L.

— apulum. L.

Rorago officinalis. L.

Anchusa italicica. Reiz.

Rubiaceae.

Rubia peregrina. F..

Galium aparine. L.

— *parisienne*. L.

— *tricorne*. Will.

Umbelliferae.

Bupleurum glaucum. I). C.

Apium graveolens. L..

Bidophia segetum. L.. sp.

Ferula lancerotensis. Faria.

Ferula caulo teroli, foliis supra decou-
posilis, lacinüs hifonnibus, brevibus, aeutis,
planis, foliolo terminali haud olongalo, um-
bclla centrali subsessili , umbellis lateralibus
longo pedunculatis , iavolucellis umbellarum
laleralium persistentibus , floribus parvis (lu-
leis), carpophoris... In insula Lancarota prope
sacelluniMariae de las Nieves, legit GI. Här-
tung, species quoad folia Ferulain Barrclieri
etquoad Hores Ferulain conimunein referens,
sed ab illa inloresccnliae partibus omnino
diversa , ab hae praecipue foliorum laci-

inai'uiii forma ei iavalueelloruni umbella-

rungi lateralium persistentia distincta. —

Ferula communis? Webb et Berthelot liisi.

nat. des Fle.s Canar. III. p. 161.

Torilis infesta. Smith.

Drusa oppositifolia. I). G.

Scandix pecten, I..

Ranunculaceae.

Kanunculus creticus. L.

Adonis intermodius. Webb.

— aestivalis.

Paphveraceae.

Papaver hybridum. L.

— dubium. L.

— somniferum. L.

var. seligera.

Glaucium corniculatum. L. sp.

Fwnariaceae.

Fumaria officinalis. L.

— *Vallanlii*. Loiss.

— *parviflora*. Lamk.

Cruciferae.

Uatthiola parviflora. Sbousb.

ineana. Rob. Broun.

— *Irislis*. R. Br.

Eruca sativa var. Lamck.

Erucastrum canariense. Webb.

Hischfeldia adpressa. Moeneb.

Raphanus raphanisarum. L.

Rapistrum rugosum. L.

Lobularia lybica. \ io.

— *intermedia*. Webb.

Notoceras canariense. R. Brown.

Capsella bursa pastoris. L., sp.

Riscuteila auriculata. L.

Sisymbrium erysiraoides. Desf.

li)