



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Observationes botanicae :sex fasciculis comprehensae**  
Lipsiae [Leipzig], Siegfried Lebrecht Crusium, 1791 [i.e., 1779-1791]  
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/11760>

**Index:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/44248>

Page(s): Page [19]

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library  
Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 26 March 2024 6:58 AM  
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1685085i00044248.pdf>

This page intentionally left blank.

49. FORSKOHLÉA *scabra* foliis ouato-lanceolatis, dentatis, scabris, subtus albidis.

*Planta* capensis, quam benevolentia optimi amici Pr. THVNBERG possideo, fruticulosa videtur.

*Caulis* albidus, basi lignosus.

*Folia* ouato-lanceolata supra punctis eleuatis scabra, subtus albo-tomentosa neruis muricatis. Margo dentibus 4-6 maioribus.

*Calycis* laciniae albidae, maiores spathulato - rotundatae corollam mentientur.

50. FORSKOHLÉA *angustifolia*, foliis lanceolatis octo-dentatis ciliato-spinulosis, subtus nudis.

*Planta* annua, vt *F. tenacissima* adhaerens.

*Caulis* ruber

*Folia* lanceolata, denticulis vtrinque 4 raro tribus spinula terminatis, ciliata; supra punctis minutissimis scabra, subtus non alba, neruis spinulosis adhaerentia.

*Calycis* laciniae lineares.

51. FORSKOHLÉA *latifolia*, foliis ouatis serratis, subtus albidis.

*Forskolea tenacissima* L.

*Planta* annua

*Caulis* albidus.

*Folia* lato-ouata, serraturis 6-8 profundis, supra imagine et neruis spinulosa, subtus imprimis juniora tomentoso-albida.

*Calycis* laciniae spathulatae, acutae vel potius lanceolatae spatio ab apice remoto dilatatae.

52. LYCHNIS *maior noctiflora Dubrensis perennis* Raii Syn. 3. p. 340, quae me iudice haud recte a Cl. HVDSON in Flor. Anglica ad *Cucubatum viscosum* L. refertur, adeo in omnibus cum *Cucubalo Italico* L. conuenit, vt illas distinguere (in horto viuas habeo) nequeo, quare eas pro varietatibus tantum habeo. *Italica* quidem tenerior est et delicatior, *Dubrensis* strictior, maior, frigoris hyberni nostri patiens est, et petala nonnihil magis fissa, nec vt in *Italica* subtus tincta; haec vero minime sufficiunt vt distinguantur.

53. SILENE *vespertina*, petalis bifidis, nectario connato, floribus alternis.

*Planta* annua, tota hirta, non viscida, semipedalis.

*Caulis* ramosus, erectus, ramis plerumque alternis.

*Folia* inferiora ouata, superiora lanceolata, integerrima, sessilia, opposita.

*Inflo.* racemus bifidus flore vnico pedicellato in dichotomia, tribus vel quatuor alternis in singulo ramulo breuiter pedicellatis, foliis duobus linearibus suffultis, carneis, vespertinis. Saepe etiam racemus simplex.

*Calyx* oblongus, subclauatus, pilosus, striis decem viridibus.

*Petala* bifida, corona coadunata.

*Stamina* quinque longiora altitudine corollae, quinque breviora.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page [19]]

49. FORSKOHLIA cabra foliis ouato-lanceolatis , dentatis, fcabris, fübtus albidis.

Planta capenfis; quam benevolentia optimi amici. Pr. rH v NsERG poffideo, fruticulofa videtur.

Caulis albidus, bafi lignofus.

Folia ouato-lanceolata füpra pun&is eleuatis fcabra, fübtus albo. tomentoia neruis muricatis.. Margo dentibus 4-6 maioribus,

Calycir laciniae albidae , maiores fpathulato - rotundatae corollam mententur. :

50. FORSKOHLIA anguifolia, foliis lanceolatis o&to - dentatis ciliato- fpi- nulofis, fübtus nudis.

Plasta annua, vt F. feuaciffima adhaerens.

Caulis ruber

Z'olia lanceolata, denticulis vtrinque 4 raro tribus fpinula terminatis , ciliata; fupra: punGis minutissimis fcabra, fubtus non alba, neruis fpinulofis ad-

haerentia. : í

Calycis laciniae lineares.

51. FORSKOHLIA Z4stifolia, foliis ouatis ferratis, fubtus albidis.

Forskoblea teuaciffema L.

Plaza annua —

Caulis albidus.

Folia lato-ouata, ferraturis 6 - 9 profundis, fupra magine et neruis fpinulofa, fubtus imprimis juniora tomentofo- albida.

Calycir laciniae fpathulatae, acutae vel potius lanceolatae fpatio ab apice remoto dilatatae.

52. LYCH NIS maior totiflova Dubrenfes perennis Roii Syn. 3. p. 340, quae me iudice haud recte a Cl nvpsox in Flor, Anglica ad Cucubahtz: vifcofum L.

refertur, adeo in omnibus cum Cucubalo Iralico V. conuenit, vt illas. diftinguere (in horto viuas habeo) nequeo, quare eas pro varietatibus tantum habeo. falica quidem tenerior eft et delicatior, Dubrezfis ftridior , maior, frigoris hyberni noflri patens eft, et perala nonnihil magis fiffa, nec vt in Jralica fübtus tin&a; haec vero minime sufficiunt vt diftinguantur.

53. SILE N E. vefperziza, petalis bifidis, ne&ario conhato, floribus alternis.

Plasta annua; tota hirta, non vifcida, femipedalis.

Caulis vamofüs, ere&us, ramis plerumque alternis.

Folia inferiora ouata, füperiora lanceolata, integerrima, feffilia, oppofita. - Juflov..racemus bifidus flore vnico pedicellato in dichotomia, tribus vel qtiatuor alternis in fingulo ramulo breuiter. pedicellatis, | foliis. duobus linearibus fuffulus, carneis, vefpertinis, Saepe etiam racemus fimplex, . Calyx oblongus, füübclauatus,. pilofus, ftriis decem. viridibus;

Petala bifida, corona coadunata.

Sramiza quinque longiora altitudine corollae, quinque, breuiora.

E 2