



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Encyclopedie methodique. Botanique. Supplement

Paris, Agasse, 1810-1817

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/826>

t.2: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/104521>

Page(s): Page 752

Holding Institution: University Library, University of Illinois Urbana
Champaign

Sponsored by: University of Illinois Urbana-Champaign

Generated 26 March 2024 10:48 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1685148i00104521.pdf>

This page intentionally left blank.

Willd. Hort. Berol. 2. pag. & tab. 77. — Enum. Plant. 2. pag. 701. *Sub pelargonio.*

Cette plante ressemble beaucoup au *geranium odoratissimum*; elle en diffère par ses tiges ligneuses, droites, beaucoup plus élevées; par ses rameaux effilés, étalés & rabattus. Les feuilles, molles, presque rondes & en cœur, sont de plus divisées en trois lobes peu profonds, à dentelures obtuses. Les pédoncules sont chargés d'un plus grand nombre de fleurs; les corolles plus grandes, & d'une couleur différente.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀ (*Willd.*)

184. GERANION inodore. *Geranium inodorum*. Willd.

Geranium umbellis multifloris, capitatis; foliis cordato ovatis, obsolete lobatis; caulibus teretibus. Willden. Hort. Berol. pag. & tab. 34. — Enum. Plant. 2. pag. 702. *Sub pelargonio.*

Rapprochée de la précédente, cette plante en diffère par son port, & en ce qu'elle n'est point odorante. Ses tiges sont d'ailleurs herbacées, glabres, cylindriques; les feuilles ovales & non arrondies, échancrées en cœur à leur base, divisées en lobes peu sensibles; les fleurs nombreuses, en ombelle, rapprochées en tête.

On soupçonne cette plante originaire du Cap de Bonne-Espérance. ♀? (*Willd.*)

185. GERANION des Canaries. *Geranium canariense*. Willd.

Geranium pedunculis subbifloris; foliis tripartitis, apice dentatis; floribus pentandris, tetrapetalis; caule suffruticoso. Willd. Hort. Berol. 1. pag. & tab. 17. — Enum. Plant. 2. pag. 702. *Sub pelargonio.*

Cette plante a des tiges droites, glabres, presque ligneuses. Ses rameaux sont garnis de feuilles pétiolées, glabres, ovales, élargies, à trois découpures, dentées vers leur sommet. Les pédoncules se terminent par une ou plus souvent deux fleurs. Ces fleurs n'ont que quatre pétales, & renferment cinq étamines fertiles.

Cette plante croît aux îles Canaries. ♂ (*Willd.*)

186. GERANION à feuilles concaves. *Geranium concavifolium*. Pers.

Geranium subcaule, umbellis simplicibus; foliis ovali-oblongis, integerrimis, glabris, margine ciliatis; floribus pentandris, petiolis retusis. Persoon, Synops. 2. pag. 226. *Sub pelargonio.*

Pelargonium radicum. Venten. Malm. pag. & tab. 65.

Geranium (ciliatum), foliis concavis, ciliatis; radice tuberosa. Andrew, Botan. Repos. pag. & tab. 247.

Ses racines sont tubéreuses; ses tiges presque nulles ou très-courtes; ses feuilles étalées, pétiolées, ovales, oblongues, obtuses, concaves, glabres à leurs deux faces, ciliées à leurs bords; les fleurs nombreuses, disposées en une ombelle simple; la corolle d'un jaune-pâle; les pétales obtus, presque tronqués, inégaux; les deux supérieurs un peu plus longs & plus larges, rayés de pourpre à leur base; les arêtes roulées en spirale, barbues intérieurement; les pédoncules & les pédicelles parsemés de poils courts & glanduleux; les folioles de l'involucre lancéolées, pubescentes, aiguës, ciliées, semblables aux stipules.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀ (*V. v.*)

187. GERANION à feuilles de dauphinelle. *Geranium delphinifolium*. Willd.

Geranium umbellis paucifloris, subcompositis; foliis scabris, quinquelobo-palmatis; lobis oblongis, serratis, intermedio trilobo. Willd. Enum. Plant. 2. pag. 708. *Sub pelargonio.*

Cette plante ressemble au *geranium balsameum*, dont elle a le port. On les distingue par le caractère de ses fleurs & par ses feuilles plus larges, rudes, palmées, à cinq lobes; les lobes allongés, dentés en scie; le lobe du milieu divisé en trois autres; les ombelles, au lieu d'être simples, sont plus ordinairement composées, peu garnies de fleurs; la corolle de couleur incarnate; les deux pétales supérieurs cunéiformes, lancéolés, obtus, marqués de deux lignes & d'une tache d'un rouge de sang; les trois inférieurs linéaires, aigus, une fois plus étroits; la portion tubulée plus longue que le pédoncule.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀ (*Willd.*)

188. GERANION à tige épaisse. *Geranium crassicaule*. Lhérit.

Geranium umbellis multifloris; foliis reniformibus, subacuminatis; caule carnosso, ramoso, lavi. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 428. — Lhérit. Ger. tab. 26. *Sub pelargonio.*

Cette plante est remarquable par ses tiges courtes, lisses, charnues, longues de trois ou quatre pouces, épaisses d'un pouce; les rameaux courts, de même grosseur, longs d'un demi-pouce & moins; les feuilles assez semblables à celles du *geranium inquinans*, réniformes, un peu acuminées; les fleurs assez nombreuses, disposées en ombelle; les pétales en ovale renversé, obtus; cinq étamines fertiles.

Certe

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 752]

GEI

palmais , petalis calice triplo longioribus. Willden.

Spec. Planr. 3. pag. 674. Sub pelargonio. — Andr.
Bot. Repof. 1. pag. & tab. 12.

754

Cette plante à des tiges ligneuses , droites, glâ-
bres, rameuses ; elle se distingue par ses fleurs
très-grandes. Ses feuilles sont pétiolées, palmées,
divisées en cinq lobes alongés , aigus, divergens,
dents, glabres à leurs deux faces, de couleur
glaucue ; les stipules oblongues , obtuses ; les pé-
doncules terminés par trois fleurs en ombelle ; la
corolle blanche; les pétales longs d'un pouce; les
trois inférieurs lancéolés, cunéiformes, obtus;
les deux supérieurs en ovale renversé, marqués ,
à leur base, de taches rougeâtres.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance.

B (PV. v.)

195. GERANION hérifon. *Geranium echinatum*.
Curtis.

Geranium umbelliflorum multifloris ; foliis ovato-cor-
datis, lobatis, crenatis ; caule crasso, carnoso ;
stipulis perfoliatis , stipulicentibus teelo. Willden.
Spec. Plant. 3. pag. 675. Sub pelargonio. — Curtis,
Magaz. 300.

Pelargonium hamatum. Jacq, Hort. Schoenbr. 2.
pag. 7. tab. 138.

Ses tiges sont charnues, rameuses, de l'épais-
seur du doigt & plus, ligneuses , garnies de
feuilles pétiolées , ovales, en cœur, presque à
trois lobes, très-molles, crénelées, obtuses, pu-
bescentes, tomenteuses & foveuses en dessous ;
les stipules persistantes, lancéolées , recourbées,
épineuses ; les ombelles composées de cinq à huit
fleurs ; la corolle d'un blanc-incarnat; les pétales
en ovale renversé ; les deux supérieurs obtus,
marqués , à leur base , de trois taches de sang.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance.

D'CFA0.)

196 GERANION auftral. *Geranium auffrale*. Willd.

Geranium umbellis multifloris, capitatis ; foliis cordatis , fublobatis , fubtus villofis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 675. Sub pelargonio.

Géranium inodorum. Desfont. Catal. Hort. Parif. Fig. 140.

Cette plante fe rapproche, par fes feuilles, du geranium althaides ; elle en ditière par fes fleurs du double plus grandes. Ses rameaux font blanchâtres , légèrement velus dans leur jeunefse ; les feuilles longuement pétiolées, en cœur, un peu lobées , légèrement pliffées, finuées , crénelées, glabres en deflus, velues en deflous ; les pétiotes blanchâtres ; les ftipules lancéolées, pubefcentés ; les ombelles compolées de douze à quinze fleurs

0 me mn

k

GER

en tête ; les calices velus; leurs découpures [ancéolées , aiguës; la corolle légèrement incarnate ; les pétales lancéolés , ovales ; les deux fupérieurs marqués, à leur bafe, d'une ligne partagée en deux portions rameufes.

Cerre plante croit à la Nouvelle-Hollande, F CP 3.)

197. GERANION tomenteuxs *Geranium tomentofum*. Jacq.

Geranium umbellis multifloris, fubpanicularis ; foliis cordatis | haflaro-quinquelobis , villofis , mollifimis. Wild. Spec. Piant. 3. pag. 677. Sus pelargonio.

Pelargonium tomentofum. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 537, & Coliect. \$. pag. 10.

Cette efpèce a des rapports, par la forme de fes feuilles, avec le geranium vifcofum ; mais elle en diffère par Les poils blancs, longs , épais , qui garniffent les rameaux , les pétiotes & les feuilles à leurs deux faces. Les ombelles fonc compoféss d'un grand nombre de fleurs prefqu'en panicule. La corolle eft blanche ; les pétales lancéolés, obtus, marqués, à leur bafe, d'une ligne très-courte, couleur de fang ; les filamens de même couleur ; les anthères d'un jaune-orangé.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance,
D (F. v.)

198. GERANION à feuilles de grofeillier. *Geranium ribifolium*. Jacq.

Geranium umbellis nudifloris, depressis ; foliis cordatis , hastato-quinquelobis , fimbriatis. Willden, Spec. Plant. 3. pag. 677. Sub pelargonio.

Pelargonium ribifolium. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 538, & Collect. 5. pag. 141.

Cette plante diffère du *geranium tomentosum* par ses feuilles plus petites , point velues , mais hérissées de quelques poils rares & courts; elles sont en cœur , hastées, presque à cinq lobes, dentées en file, très-rapprochées de celles du grofeillier rouge. Ses tiges sont charnues ; ses ombelles comprimées , composées de plusieurs fleurs blanches; les pétales lancéolés , obtus; les filaments blancs; les anthères d'un jaune-orangé; le tube de la longueur des divisions du calice. :

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

p (7.v.)

199. GERANION balsamique. *Geranium balfameum*, Jacq.

Geranium umbellis paucifloris; foliis palmatis quinquelobis , lobis cuneatis ; laciniis lanceolatis , remotè dentatis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 679. Sub pelargonio.