



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive,  
Enumeratio contracta ordinum generum specierumque  
plantarum huc usque cognitarium, juxta methodi naturalis,  
normas digesta**

Parisi, Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz, 1824-73  
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/286>

**v.6 (1837):** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/7155>

Page(s): Page 84

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library  
Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 26 March 2024 1:52 PM  
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1685246i00007155.pdf>

This page intentionally left blank.



Achænium exalatum 4-gonum conforme. Pappus coroniformis repandus. — Herba Californica facie Santolinæ tomentosæ. Caulis teres ramosus. Folia alterna petiolulata bipinnatisecta. Capitula solitaria vel corymbosa. — *ομαλοτης* æqualitas.

1. O. CAMPHORATA. — in Californiâ. *Omalanthus camphoratus* Less. syn. 260. *Tanacetum camphoratum* Less. in linnæâ 1831. p. 521.

Div. IV. ATHANASIEÆ *Less. syn. 262.* — Santolinearum gen. *Cass.*

Capitula homogama, corollis omnibus tubulosis teretibus. Recept. paleaceum. Achænia angulata aut teretia, nunquam obcompressa. Pappus nullus, minutè squamellatus, aut pilis è cellularum serie simplici donatis constans.

- CDXCII. LONAS *Adans. fam. 2. p. 118. Gærtn. fr. 2. p. 396. t. 165. Cass. dict. 27. p. 166. Less. syn. 263.* — Athanasieæ seu Achilleæ sp. *auct.*

Capitulum discoideum homogamum. Recept. conico-elongatum paleaceum. Invol. campanulati squamæ imbricatæ. Achænium angulatum exalatum hinc ad apicem glandulâ notatum. Pappus obliquè coroniformis membranaceus parvus integer. — Herba Mediterranea annua glabra. Folia alterna pinnatipartita, lobis acuminatis. Capitula ad apices ramorum nunc cymoso-umbellata nunc in ramis lateralibus subsolitaria. Flores lutei.

1. L. INODORA (Gærtn. l. c.). (I) in Mauritanie arvis (Vahl! Desf.), in Sicilia (Schouw!), ad Panormum (Guss!), Marsala et Castel Vetrano (Duby!). *Athanasia annua* Linn. sp. 1182. excl. *Triumpf. syn. Desf. atl. 2. p. 260. Achillea inodora* Linn. sp. ed. 2. p. 1265. *Lonas inodora* et *Lonas minima* Cass. dict. 27. p. 165. (var. vix distinguendæ.) — *Herm. lugd.-b. t. 227. Vidi in herb. Burm. (prod. fl. cap. 24.), specim. ex Cap. Bonæ-Spei dictum et video indic. à Lapeyr. (abr. pyr. p. 502.) in agro Ruscitonensi, sed utraque patria valde dubia! (v. v. c. et s. sp.)*

- CDXCIII. GONOSPERMUM *Less. syn. 263.* — *Tanaceti* sp. *DC. C. Sm.* — *Hymenolepidis* sp. *Cass.*

Capitulum discoideum, fl. omnibus tubulosis 5-dentatis hermaphroditis. Recept. planum paleaceum. Invol. oblongi aut ovati squamæ pauciseriales. Achænium exalatum angulis costisque 4-5 notatum. Pappus paleis minutis semilanceolatis. — Frutices Canarienses *Tanaceti* facie. Folia alterna membranacea pinnatipartita lobis dentato-incisis, juniora pubescentia aut subtomentosa, adulta glabra. Capitula in corymbos terminales disposita. Flores lutei.

1. G. ELEGANS, foliis pinnatipartitis, lobis utrinquè 12-14 linearibus acutè dentato-incisis, rachi acutè dentatâ basi petioliformi nudâ, capitulis oblongis 10-15-floris. ♂ in ins. Canariis obs. cl. Broussonet qui seminibus in hortum Monspeliensem coluit. Folia novella cana, dein subpubescentia. *Tanacetum Canariense*. DC. cat. h. monsp. p. 149. *Achillea arborea*. Horn. h. hafn. suppl. p. 102. *Hymenolepis elegans* Cass. dict. 33. p. 61. Olim sed rarissimè in hort. Monsp. vidi capitula paucissima in quibus flores marginales nonnulli ligulati et fœminei. (v. v. c.)
2. G. FRUTICOSUM (*Less. syn. 263*), foliis pinnatipartitis lobis utrinquè 8-9 oblongis obtusè dentatis, rachi hinc iudè obtusè dentatâ basi petioliformi nudâ, capitulis oblongis 10-15-floris. ♂ in ins. Palma archipel. Canariensis ubi vulgò dicitur *Faro*. *Tanacetum fruticosum* C. Smith! herb. Buch. can. p. 165. Pubes foliorum juniorum tomentosa densa et diutiùs quàm in priore remanens. (v. s. comm. à beat. C. Sm.)
3. G. MULTIFLORUM, foliis pinnatipartitis, lobis utrinquè 12-13 oblongis inciso-



[Begin Page: Page 84]

84 DICOTYL. scu EXOGEN E. OMALOTES.

Achzenium exalatum. 4-gonum conforme. Pappus coroniformis repandus. — Herba Californica facie Santolinz tomentosz. Caulis teres ramosus. Folia alterna petiolulata bipinnatisecta. Capitula solitaria vel corymbosa. — opa3o15c cqualitas.

1. O. caMPRORATA, — in Californià. Omalanthus camphoratus Less. syn. 260. Tanacetum camphoratum Less. in linnzà 1831. p. 52r.

Div.'1v. ArnanasE E Less. syn. 262. — Santolinearum gen. Cass.

Capitula homogama, corollis omnibus tubulosis teretibus. Recept. paleaceum. Achcena angulata aut teretia, nunquam obcompressa. Pappus nullus, minutè squamellatus, aut pilis é cellularum serie simplici donatis constans.

CDXCII. LONAS dans. fam. 2. p. v8. Gaertn. fr. 2. p. 396. t. 165. Cass. dict.

27. p. 166. Less. syn. 263. — Athanasia seu Achillez sp. auct.

Capitulum discoideum homogamum. Recept. conico-elongatum paleaceum. Invol. campanulaii squams imbricate. Achenium angulatum

exalatum hinc ad apicem glandulà notatum. Pappus obliquè coroniformis membranaceus parvus integer.—Herba Mediterranea annua glabra.

Folia alterna pinnatipartita, lobis acuminatis. Capitula ad apices ramorum nunc cymoso-umbellata nunc in ramis lateralibus subsolitaria.

Flores lutei.

1. L. 1onoza (Gaertn. l. c.) (T) in Mauritanie arvis (Vahl! Desf.), in Sicilia (Schouw!), ad Panormum (Guss!), Marsala et Castel Vetrano (Dubyl).

Athanasia annun Linn. sp. 1182. excl. Triumph. syn. Desf. atl. 2. p. 2560. Achillea inodora Linn. sp. ed. 2. p. 1265. Lonas inodora-et Lonas minima Cass. dict. 27. p. 165. (var. vix distinguendz..) — Herm. lugd.-b. t. 227. Vidi in herb.

Burm. (prod. fl. cap. 24.), specim. ex Cap. Bonz-Spei dictum et video indic. à Lapeyr. (abr. pyr. p. 502.) in agro Ruscinonensi, sed utraque patria valdè dubia! (v. v. c. et s. sp.)

CDXCIII. GONOSPERMUM Zess. syn. 263. — Tanaceti sp. DC. C. \$m. — Hymenolepidis sp. Cass.

Capitulum discoideum, fl. omnibus tubulosis 5-dentatis hermaphroditis. Recept. planum paleaceum. Invol. oblongi aut ovati squam: pauciserialis. Achznium exalatum angulis costisque 4-5 notatum. Pappus paleis minutis semilanceolatis. — Frutices Canarienses Tanaceti facie.

Folia alterna membranacea pinnatipartita lobis dentato-incisis, juniora pubescentia aut subtomentosa, adulta glabra. Capitula in corymbos terminales disposita. Flores lutei.

1. G. xrzcan, foliis pinnatipartitis, lobis utrinquè 12-14 linearibus acuté dentato-incisis, rachi acnté dentatà basi petioliformi nudà, capitulis oblongis 10-15-floris. 5 in ins. Canariis obs. cl. Broussonet qui seminibus in hortum Monsliensem coluit. Folia novella cana, dein subpubescentia. Tanacetum Canariense. DC. cat. b. monsp. p. 149. Achillea arborea. Horn. h. hafn. snppl.

p. 102. Hymenolepis elegans Cass. dict. 33. p. 61. Olim sed rarissimè in hort. Monsp. vidi capitula paucissima in quibus flores marginales nonnulli ligulati et fceminei. (v. v. c.)

2. G. mUTICOSUM (Less. syn. 263), foliis pinnatipartitis lobis utrinquè 8-9 oblongis obtusè dentatis, rachi hinc iudé obtusè dentatà basi petioliformi nudà, capitulis oblongis ro-r5-floris. j in ins. Palma archipel. Canariensis ubi vulgo dicitur Faro. Tanacetum fruticosum C. Smith! herb. Buch. can. p. 165. Pubes foliorum juniorum tomentosa densa ct diutiùs quàm in priore remanens. (v. ».

comm. à beat. C. \$m.)

2. G. mUTICOSUM (Less. syn. 263), foliis pinnatipartitis lobis utrinquè 8-9 oblongis obtusè dentatis, rachi hinc iudé obtusè dentatà basi petioliformi nudà, capitulis oblongis ro-r5-floris. j in ins. Palma archipel. Canariensis ubi vulgo dicitur Faro. Tanacetum fruticosum C. Smith! herb. Buch. can. p. 165. Pubes foliorum juniorum tomentosa densa ct diutiùs quàm in priore remanens. (v. ».

comm. à beat. C. \$m.)

3. G. mur TIPLORUM, foliis pinnatipartitis, lobis utrinqué 12-13 oblongis inciso-