

2. CINERARIA malvaefolia.

C. malvaefolia, hat kleine Blüthen.
Lk.

1. TANACETUM fruticosum, *T. canariense* Dec. Faro.

3. PYRETHRUM aductum Lk. M.

P. aductum, ist nicht *Chr. pinnatif.* unserer Gärten, sondern wie es scheint, eine besondere Art: *P. foliis basi dentatis, antice pinnatifidis, lacinis incisis, glabriusculis; amphispermis quadrangularibus, radii alatis, aliis binis maioribus*. Die Blätter sind über 5 Zoll lang, werden nach vorn zu breiter, die Blüthen sitzen auf astigen Stielen, sind gross und die Strahlenblüthen weiß. Lk.

2. PYRETHRUM anethifolium.

1. *foeniculaceum*.

C. foen. unterscheidet sich leicht von *P. anethif.* durch dichter zusammenstehende Blüthen. Lk.

1. PYRETHRUM crithmifolium.

1. *coronopifolium*. W.

Enum. 904.

1. *grandiflorum*.1. *frutescens*. Magarsa.

Da die Synomimie der *Pyrethra* auf den canarischen Inseln etwas dunkel ist, so werde ich die verschiedenen Arten auseinander zu setzen suchen, so wie es mir scheint, dass sie bestimmt werden müssen.

I. *P. grandiflorum* W. Dc.

P. Folii profunde pinnatifidis, lobis remotis, linearibus dentatis, dentibus mucronulatis, petiolis amplexicaulibus basi utrinque denticulatis costa intermedia ½-1 lineam lata.

II. *P. pinnatifidum*.

P. Folii profunde pinnatifidis, lobis varie remotis line-

ari lanceolatis dentatis, dentibus mucronulatis, petiolo basi inciso-auriculatis, costa intermedia elongato-cuneata ad basin usque attenuata, apice 3-4 lineas lata.

III. *P. Broussonetii*. Ch. Chr. Broussonetii Balbis.

a) *P. Folii profunde pinnatifidis, glanduloso punctatis asperis, lobis varie remotis dilatatis ovatis inciso serratis, serraturis mucronulatis, costa intermedia dilatata, pedunculis brevibus foliosis.*

b) *P. elongatum, pedunculis elongatis nudis foliis magis oblique pinnatis et serratis.*

IV. *P. foeniculaceum*. W.

a) *P. Folii carnosis pinnatisectis, lacinis filiformibus linearibus acutis integris alternis, floribus longe pedunculatis, caule fruticoso.*

b) *P. corymbosum, pedunculis brevioribus, ramulis magis approximatius.*

c) *P. pinnatifidum, foliis 3-9. non tantum 3-5 fidis.*

d) *P. bipinnatifidum. P. anethifolium* W. foliorum lacinis 1-3 dentatis aut 1-3 fidis; An species distincta?

V. *P. frutescens*.

a) *P. bipinnati sectis carnosis, lacinis brevibus tenuissime mucronatis, floribus longe pedunculatis caule fruticoso.*

b) *P. hispidum, foliis glanduloso hispidulis.* Ch.

320 2. CHRYSANTHEMUM coronarium. P.

Durch Brouss. und Courant.

1. INULA viscosa. Altadaca. E. P.

2. TUSSILAGO rubra.

Von Riedlé bei Sta. Cruz Herb.
Jard. des Plantes.