



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Synopsis generum compositarum earumque dispositionis
novae tentamen, monographis multarum Capensium
interjectis**

Berolini, sumtibus Dunckeri et Humblotii, 1832

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/51470>

Item: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/109470>

Page(s): Page 263

Holding Institution: University Library, University of Illinois Urbana
Champaign

Sponsored by: University of Illinois Urbana-Champaign

Generated 27 March 2024 6:28 AM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1685550i00109470.pdf>

This page intentionally left blank.

Hue pertinent: *A. canescens*, *filiformis*, *flexuosa*, *hirsuta*, *quinquedentata*, *parviflora* Thunb., *pubescens* L., *trifurcata* L. (hort. Cliff. 397. Ej. sp. pl. p. 1181. Comm. hort. II. t. 49! neque Thunb. neque W. hrb. *A. virgata* W. hrb. N. 15299 nec Jacq.), *A. virgata* Jacq. (hort. Schönbr. II. p. 11. t. 148 = *A. trifurcata* Thunb. cap. 635 ex parte! W. sp. pl. III. 1805. Ej. hrb. N. 15298! = *tricuspis* Poir. Enc. IX. p. 533., cuius varietas foliis fere omnibus integerrimis *A. glabra* Thunb. cap. 634! est) nec non plures aliae.

15. HYMENOLEPIS Cass. *). Achaenium exalatum, sulcatum, cylindraceum. Pappus e paleis minutis, semilanceolatis constat. — *Fruticuli Capenses*, facie praecedentium.

H. pinnata * = *Athanasia pinnata* L. suppl. Thunb.!

16. GONOSPERMUM n. g. Achaenium exalatum, 4—5-angulatum totidemque costatum. Pappus e paleis minutis, semilanceolatis constat. — *Fruticuli Canarienses* foliis alternis, membranaceis, glabris, bipinnatifidis; involucris pauciserialibus; capitulis in paniculas terminales et fastigiatas dispositis, luteis.

G. fruticosum * = *Tanacetum fruticosum* Chr. Sm., Buch. differt a *G. canariensi* * = *T. canariensi* Cand. pl. h. b. monsp. p. 149 (secundum specimina in horto Paris. culta et in herb. Kunth. asserta) = *Hymenolepis elegans* Cass. Dict. sc. nat. XXXIII. 61. foliis sessilibus, oblongo-ellipticis, laciniis ellipticis, subobtusiusculis, paucioribus, infimis cauli adproximatis; involucris campanulatis, biserialibus; denique capitulis ∞. nec circiter 10-floris.

17. LONAS Gaertn. Achaenium angulatum, exalatum. Pappus coroniformis, integer. — *Herba annua regionum mediterranearum incola*, foliis alternis, pinnatifidis; capitulis luteis, subglomeratis, multifloris; involucris imbricatis, campanulatis.

L. inodora Gaert. sem. fr. II. p. 396 tab. 165 = *Achillea inodora* et *Athanasia annua* L. — *L. minima* et *umbellata* Cass. Dict. sc. nat. XXVII. 167 sunt vix atque ne vix quidem diversae.

4. ARTEMISIEAE. Capitulis multifloris; corollis staminigeris teretibus, stylumque bifidum gerentibus; achaeniis exalatis, nunquam plano-obcompressis et orbicularibus; rhachide ebracteolata.

*) Dict. sc. nat. XXII. 315; XXVII. 167.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 263]

263

lluc perlinent: A. canescens , fdiformis, flexuosa, hirsuta,
quinquedontaia, parriflora Thunb., jmbescns L., trifurcata L. (hort-
Cliff. 397. Ej. sp. pl. p. 11S1. Comra. hort. II. t. 49! neque Thunb. ue-
que W. brb. A. virgata W. brb. N. 15299 ncc JacqJ, A. virgaia Jacq.
(bort. Scbonbr. II. p. 11. t. 148 = A. trifurcata Tliunb. cap. 635 ex
parte! W. sp. pl. III. 1S05. Ej. brb. N. 1529S! = tricusjds Poir. Enc.
IX. p. 533., cuius varietas foliis fere oranibus integerrimis A. glabra
Tbunb. cap. C34 ! est) nec non plures aliae.

15. Hymenolepis Cass. *). Aclaeonium -exalatum,
sulcatum, cylindraceum. Pappus e paleis minutis, semilan-
ceolatis constat. — Fruliculi Capenses, fcicie pracce-
dcntium.

H. jnnnata * = AtJianasia pinnata L. suppl. Tbunb. !

16. Gonospermum ii. g. Aclaeonium exalatum, 4 — 5-
angulatum totidemque costatum. Pappus e paleis minutis,
semilanceolatis constat. — Fruticuli Canarienscs foliis al-
icruisy mcmhranaceis , glabris, bipiunatifidis ; involucris
pauciserialibus ; capitulis in paniculas terminales ct fasli-
giaias disposiis, luteis.

G. fruticosum * =: Tanctcctum frulicosum Cbr. Sm., Bucb.

differt a *G. canariensi* * = *T. canariensi* Cand. pl. li. 1). monsp. p.

149 (secundum specimina in horto Paris. culta et in hcrb. Kuntb. asserta) =3 *Hymenolejns elegans* Cass. Dict. sc. nat. XXXIII. 61. foliis sessilibus, ohlongo-ellipticis, laciniis ellipticis, subobtusiusculis, paucioribus, infimis cauli adproxiraatis; involucris campanulalis, biserialibus; denique capitulis 00. ncc circiter 10-floris.

17. *Lonas* Gaertn. *Achaenium angulatum*, exalatum. *Pappus coroniformis*, integer. — Jferba annua 7'cgionum mediterranearum iucola, foliis altcmis, piunatifidis ; capitulis Jutcis, subglomeraiis , multi/loris; iuvolucris imbricatis, campanulatis.

L. inodora Gacrt. sem. fr. II. p. 396 tab. 165 — *Achilca inodora* et *Alhanasia annua* L. — *L. minima* et *umbellaia* Cass. Dict. sc. nat. XXVII. 167 sunt vix atque ne vix quitlera diversae.

4. *Artemisieae*. Capitulis multifloris; corollis staminigeris teretibus, styluinque bifidum gcentibus; achaeniis exalatis, nunquam plano-obcomplessis et orbicularibus; rhachide ebracteolata.

•) Dict. sc. nat. XXII. 315; XXVII. 167.