

Madère, Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque, Marmarique, Égypte, Europe.

SECT. II. — **Coleostephus** Cass.

C. Myconis L., *Sp.*, éd. II, 1254; *Poir.*, *Voy.*, II, 241; *Desf.*, *All.*, II, 281; *Batt. et Trab.*, *Alg.*, I, 463; *Boiss.*, *Or.*, III, 335; *Bon. et Bar.*, *Tun.*, 222. — *Coleostephus Myconis* Coss.; *Rchb.*, *Ik.*, XVI, t. 95. Pl. Canarienses, n° 575. Janvier à avril.

TÉNÉRIFE : Laguna (W. B.).

GRAN-CANARIÂ : Tafira, Santa Brigida (Bornm.); San Mateo (800^m); ARUCAS (250^m), Barrancos de Moya et de San Felipe (200^m), auprès de Guia.

FUERTEVENTURA : *Sine loc.* (Bolle).

LANZAROTE : *Sine loc.* (Bolle).

Endroits herbeux humides dans toute la zone maritime, mais surtout abondant entre 200 et 300^m d'altitude (1).

Madère, Maroc, Algérie, Tunisie, Europe.

Pyrethrum Hall., *Hist. stirp. Helv.*, I, 40.

P. Parthenium Smith, *Fl. Brit.*, II, 900; D. C., *Prodr.*, VI, 58; *Webb et Berth.*, *Phytogr. canar.* — *Chrysanthemum Parthenium* Bernh., *Verz. Pflanz. Erfurt.*, 145. — *Leucanthemum Parthenium* Schultz Bip.

TÉNÉRIFE : Agua Manza (Buch).

Introduite, d'après Webb et Berthelot, dans cette localité, nous ne l'avons pas retrouvée.

Région sylvestre.

Madère, Europe.

P. ferulaceum Webb et Berth., *Phytogr. canar.*, III, 281.

GRAN-CANARIÂ : Goyedra (Déspréaux).

Seule localité connue de cette rare espèce.

Espèce spéciale aux Canaries.

P. ptarmicæfolium Webb et Berth., *Phytogr. canar.*, III, 282.

GRAN-CANARIÂ : Tigayga (Déspréaux).

Espèce très rare, comme la précédente, que Webb n'avait pas retrouvée. Nous ne les avons pas revues.

Espèce spéciale aux Canaries.

Argyranthemum Webb et Berth., *Phytogr. canar.*

A. ochroleucum Webb, *l. c.*, III, 259. Pl. Canarienses, n° 194. Mars à avril.

LANZAROTE : San Bartolomé (W. B., Bolle) ; Haria, Coruña (300^m).

(1) Nous ne connaissons pas le *Chrysanthemum Broussonetii* Pers. indiqué par Bolle dans l'île de Fuerteventura au Pico de Zarza.