



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive,
Enumeratio contracta ordinum generum specierumque
plantarum huc usque cognitarum, juxta methodi naturalis,
normas digesta**

Parisii, Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz, 1824-73

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/286>

v.1 (1824): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/7150>

Page(s): Page 279

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 6 March 2024 12:42 PM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1677522i00007150.pdf>

This page intentionally left blank.

- floribus confertis, calycibus glaucis, sepalis ciliatis externis minutis post anthesin reflexis, internis 2-nerviis obliquis acutis. ♂ in Galliæ austr., Barbariæ, Hispaniæ, Syriæ locis siccis. C. lavaudulæfolius Lam! dict. 2. p. 25.* — Barr. ic. t. 288. Rami foliacei axillares. (v. s.)
- β. *Syriacum*, foliis subplanis suprà viridi-griseis. C. *Syriacus* Jacq. ic. rar. t. 96. (v. s.)
- γ. *Thibaudi* (Pers! enh. 2. p. 79.) racemis longis erectis. C. *racemosus* Cav. ic. 2. p. 33. t. 140.* eadem planta post anthesin. (v. s.)
76. H. *BROUSSONETII* (Dunal. ined.) caule fruticoso ramoso, ramis oppositis, foliis breviter petiolatis planis oblongo-lanceolatis obtusiusculis utrinquè tomentosis, subtùs incanis, suprà viridi-cinereis, stipulis bracteisque caducis linearibus tomentosiusculis, racemis brevibus ramosis, floribus secundis, calycibus oblongis acutis, sepalis internis 4-nerviis tomentosiusculis lutescentibus. ♂ in insulâ Tenerifæ. Stylus staminibus duplò longior, subrectus. Stipulæ subfalcatae. (v. s.)
77. H. *STÆCHADIFOLIUM* (Pers. enh. 2. p. 79.) caule erecto, ramis tomentoso-canescensibus, foliis oblongo-linearibus obtusiusculis utrinquè subtomentosis, suprà viridi-cinereis, subtùs incanis margine revolutis, stipulis subvillosis lineari-lanceolatis, racemis ante anthesin revolutis, floribus confertis, calycibus villosis, sepalis externis ciliatis viridibus, internis acuminate incanis. ♂ in Lusitanâ ex Brot. in Corsicâ ex Salzmann. C. *stæchadi-* folius Brot. fl. lusit. 2. p. 270 (v. s. ex Corsicâ.)
78. H. *CROCEUM* (Pers. enh. 2. p. 79.) caule fruticoso subprocumbente ramoso, ramis simplicibus erectis tomentoso-canescensibus, foliis tomentosiusculis subtùs canescensibus suprà glaucis margine revolutis, inferioribus suborbiculatis, mediis ellipticis obtusis, superioribus lanceolatis acutiusculis, stipulis bracteisque erectis lineari-oblongis villosis subvirescentibus, calycibus glauco-flavescentibus minutè pubescentibus. ♂ in Hispaniâ, Barbariâ. C. *croceus* Desf! fl. atl. 1. p. 422. t. 110.* Stipulæ inferiores minutæ. Petala crocea. (v. s.)
- α. stipulis petiolo longioribus.
 β. stipulis setaceis petiolo brevioribus.
 γ. ramis procumbentibus, foliis minoribus, racemis paucifloris.
79. H. *NUDICAULE* (Dunal. ined.) caule fruticoso ramoso, ramis internè glabris supernè villoso-canescensibus, foliis oblongo-lanceolatis margine revolutis utrinquè tomentosis subtùs incanis suprà viridi-flavescentibus, stipulis linearibus petiolo longioribus, calycibus profundè sulcatis vix pubescentibus, nervis elevatis pilosis. ♂ in montibus regni Valentini, Hispaniæ. ex Lagasca. Petala lutea. An H. *crocei* varietas? (v. s.)
80. H. *GLAUCUM* (Pers. enh. 2. p. 78.) caule suffruticoso ramoso, ramis adscendentibus tomentoso-incanis apice hispidis, foliis margine vix revolutis ciliatis utrinque tomentosis subtùs incanis suprà viridi-glaucoscentibus, inferioribus orbiculatis, ceteris ellipticis lanceolato-oblongis, stipulis bracteisque pubescentibus viridibus, pedicellis calycibusque hirsutis, pilis albidis. ♂ in Hispaniâ, Italiâ. C. *glaucus*. Cav. ic. 3. p. 31. t. 261.* nec Desf.
- α. *acutiusculum*, foliis superioribus oblongis subacuminatis suprà glaucescentibus, calycibus molliter hirsutis.
 β. *obtusiusculum*, foliis superioribus oblongo-ellipticis obtusiusculis suprà scabriusculis viridibus, calycibus subhispidis.
81. H. *TOMENTOSUM* (Dunal. ined.) caule suffruticoso ramoso, ramis elongatis adscendentibus subcanescensibus, foliis lanceolato oblongis margine sæpè revolutis subtùs incano-tomentosis suprà glabriusculis viridibus, calycibus sulcatis, nervis elevatis pilosis. ♂ in Hispaniâ, Galliâ, Angliâ. C. *tomentosus* Smith engl. bot. t. 2208. — Scop. carn. t. 24? Pedicelli incani piloso-tomentosi. Bracteæ glabræ. Calyx hinc indè violaceus. Petala lutea. (v. s.)
82. H. *LEPTOPHYLLUM* (Dunal. ined.) caule suffruticoso lignoso subprocumbente ramoso, ramis adscendentibus tomentosiusculis subcinereis, foliis