



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Linnaea : Ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen
Umfange**

Berlin F. Dümmler 1826-1882

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/626>

Bd.6 (1831): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/109832>

Page(s): Page 209, Page 252

Holding Institution: University Library, University of Illinois Urbana
Champaign

Sponsored by: University of Illinois Urbana-Champaign

Generated 31 March 2024 12:12 PM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1686540i00109832.pdf>

This page intentionally left blank.

DE
PLANTIS IN EXPEDITIONE SPECULA-
TORIA ROMANZOFFIANA
OBSERVATIS DISSERERE

PERGUNT

AD. DE CHAMISSO ET D. DE SCHLECHTENDAL.

SYNANTHEREAE Rich.

AUCTORE

CHR. FR. LESSING.

(Continuatio.)

Subtrib. 5. *Artemisiaeae*.

Capitula nunquam dioica; flores marginales filiformes, 1-s. pluriseriales, ♀ aut neutri. Rhachis ebracteolata. Pappus aut nullus aut coroniformis. Antherae ecaudatae.

ARTEMISIA L.

Capitulum aut homogamum aut heterogamum floribus ♀ 1-serialibus in ambitu, reliquis ♂. Corolla teres. Achae-
nium calvum. *)

*) *Lapeyrousia* Thbrg. differt tantummodo cor. obcompressa, 2-alata.

17. *SENECIO othonnoides* n. sp.

Olivier in Persia inter Teheran et Ispahan.

Fruticulus nitidus, caule inferne aphylo, crasso, tortuoso, epidermide cinerea, rugosa. Rami florigeri, apice vix minus foliati dichotome dividuntur in pedunculos subfastigiatos, folio uno alternove instructos, erecto-patentes, folia et capitula sua excedentes, 1-cepholos. Capit. rad. Involucrum campanulatum, disco parum brevius, 5-partitum, foliolis ellipticis, acutis, margine scariosis, integerrimis, planis, multinerviis, circiter semipollicaribus. Pappus longus capillaris, pluriserialis, inaequalis, albidus, conformis. Corollae flavae, glabrae, disci: 10-nerviae, nervis accessoriis mox evanidis, circiter 3^{lin} longae, pappo aequales; radii semipollicares, lingulis ellipticis, 4-nerviis, emarginatis (sed vix semper), tubo brevioribus (v. sp. 1 in hrb. Kth.).

18. *SENECIO Kleinia* * (*Cacalia Kleinia* L. sp. pl. n. 1168).

In Teneriffa cel. de Chamisso.

CRASSOCEPHALUM Mönch.

Pappus pluriserialis. Cor. ♀, si adest, 1-serialis, filiformis. Styli rami apice appendiculati.

1. *CRASSOCEPHALUM valerianaefolium* (Linn. V. p. 163. *Senecio valerianaefolius* Wolf. ind. sem. h. ber. 1825. Sprg. s, III. p. 565. Reichbch. ic. ex. I. p. 59 t. 85).

Cel. de Chamisso ad fretum St. Catharinae.

2. *CRASSOCEPHALUM sonchifolium* * (*Cacalia sonchifolia* L. sp. pl. III. p. 1169. W. sp. pl. III. p. 1730).

In Luçonia cel. de Chamisso: Macao Trentepohl; Java et Promontorio bonae spei Thbrg.; Sierra Leona Afzelius. *)

*) *Sonchus agrestis* Sw. fl. ind. occ.! est *Senecio hieracifolius*!

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 209]

DE

PLANUS IN EXPEDITIONE SPECULA-
TORIA ROMANZOFFIANA

OBSERVATIS DISSERERE

PERGÜNT

AD. DE CHAMISSO et D. de SCHLECHTENDAL.

SYNANTHEREAE Rieh.

AUCTORE

CHR. FR. LESSING.

{Continuatio.}

Subtrib. 5. Artemisieae^

Capitula nunquam dioica; flores marginales filiformes,

1-s. pluriseriales, 2 aut neutri. Rhachis ebracteolata. Pap-

pūs aut nullus aut coroniformis. Antherae ecaudatae«

ARTEMISIA L.

Capitulum aut homogamum aut heterogamum floribus

\$ 1-serialibus in ambitu, reliquis \$. Corolla teres. Achae*
nium calvum. *)

*) Lapeyrousia Thbrg. differt tantummodo cor. obcompressa, 2[^]alata
6r Bd. 2s Heft. 14

[Begin Page: Page 252]

-252

17. Senecio othonnoides n. sp.

Olivier in Persia inter Teheran et Ispahan.

Fruticulus nitidus, caule inferne aphylo, crasso, tor-
luoso, epiderride cinerea, rugosa. Rami floriferi, apice
vix minus foliali dichotome dividuntur in pedunculos sub-
fastigiatos, folio uno alternove instructos, erecto- patentes,
folia et capitula sua excedentes, 1 - cephalos. Capit. rad.
Involucrum campanulatum, disco parum brevius, 5-partitum,
foliolis ellipticis, acutis, margine scariosis, integerrimis, pla-
nis, multinerviis, circiter semipollicaribus. Pappus longus
capillaris, pluriserialis, inaequalis, albidus, conformis. Go-
rollae flavae, glabrae, disci: 10-nerviae, nervis accesso-
riis mox evanidis, circiter 3" longae, pappo aequales; ra-
dii semipollicares, linguulis ellipticis, 4-nerviis, emarginatis

(sed vix semper), tubo brevioribus (v. sp. 1 in hrb. Ktb.).

18. Senecio Kleinia * {Cacalia Kleinia L. sp. pl.

n. 1168).

In TenerifiFa cel. de Chamisso.

CRASSOCEPHALUM Mönch.

Pappus pluriserialis. Cor. 2, si adesi, 1-serialis, fili-

formis. Styli rami apice appendiculati.

1. Crassogephalum valerianaefolluTn (Linn. V. p. 163.

Senecio valerianaefolius Wolf. ind. sem. b. ber. 1825. Sprg.

s, III. p. 565. Relchbch. ic. ex. I. p. 59 t. 85).

Cel. de Chamisso ad fretum St. Catharinae.

2. Crassogephalum sonchifölium * {Cacalia sonchifo-

lia L. sp. pl. III. p. 1169. W. sp. pl. 111. p. 1730).

In Luponía cel. de Chamisso: Macao Trentepohl;

Java et Promontorio bonae spei Thbrg. ; Sierra Leona

Afzelius. *)

*) Sonchus agrestis Sw. fl. ind. occ. ! est Senecio hieracifoUus!