



CONTRIBUTIONS

À LA CONNAISSANCE DE LA

FLORE DU MAROC

II

GÉRANIACÉES—COMPOSÉES

PAR

SV. MURBECK



AVEC 7 PLANCHES ET 8 FIGURES DANS LE TEXTE

*Remise par la biblioteca del Herbario Botánico 7-II-1966*



LUND  
C. W. K. GLERUP



**L. arborescens** [BATT. in Bull. soc. bot. Fr., XXXV, p. 342 & 391 (1888), sub *Zollikoferia*] Nob. — Exs.: CHEVALLIER Pl. Sah. alg., t. 337. — Guéliz près Marrakech, un seul pied; en abondance sur les collines calcaires entre Oummenast et Iggoort, 600—800 m.

Cette espèce, nettement distincte du *L. spinosa* par les caractères indiqués par BAYTANDIER, de même que par ses ligules bien plus courtes (de moitié plus longues seulement que les écailles périclinales), se trouve aussi en Europe, à savoir dans le sud de l'Espagne, d'après un exemplaire récolté par mon ami et compatriote HJALMAR NILSSON à La Roqueta près d'Almería [N° 361, 26/4 1883 (Hb. Mus. Lund)]. — Dans le Supplément du Prodr. fl. hisp., p. 114 (1893), WILLKOMM a publié la description d'un *Sonchus Freginianus* HUT., PORTA & RIGO, récolté également aux environs d'Almería et distribué, d'après WILLKOMM, d'abord par HUTER, PORTA & RIGO dans leurs Pl. hisp. exs. 1879, n. 655, et ensuite par PORTA & RIGO dans leur Iter II. hisp., n. 195. Cette plante, qui dans les collections du Musée bot. de Lund est représentée par un exemplaire étiqueté N° 195. *Sonchus spinosus* DC. Vid. cl. FREY. Almería, in muris, ad rupes, Barranco del Caballar et Sierra Alhamilla, sol. calcar. 50—400 m. s. m. Apr. PORTA et RIGO. It. II Hispanicum 1890, diffère cependant considérablement du *L. arborescens* (BATT.) MERR. et ne me paraît guère séparable du *L. spinosa* (FOENK.) SCHULZ.

**L. nudicaulis** [L. Mant., p. 278 (1771), sub *Chondrilla*] Hook. fil. Fl. Brit. Ind., III, p. 416 (1875—98). — *Zollikoferia nudicaulis* Boiss. Fl. or., III, p. 824 (1875). — Assez répandu dans les plaines arides des env. de Marrakech.

**Sonchus asper** VILL. Hist. pl. Dauph., III, p. 158 (1789); GR. & GODR. Fl. de Fr., II, p. 324. — Terrains cultivés, à Marrakech et à Oummenast. — Sous une forme à tige très robuste, à feuilles épaisses, rigides, fortement spinuleuses et profondément pinnatifides, à fruits ovales-elliptiques, largement alés, etc. Par la forme des achaines la plante rappelle le *S. glaucescens* JORD., mais elle en est très distincte par son péricline à base plus élargie et plus tronquée, et surtout par ses ligules très courtes, ne dépassant guère le péricline.

**Reichardia orientalis** [L. Sp. pl., ed. II, p. 1113 (1763), sub *Scorzonera*] ПОСЫВУТ. in Ann. Conserv. & Jard. bot. Genève, VII—VIII, p. 238 (1903—4). — Cfr. MERR. Contrib. fl. Tun. etc., I, p. 112 (1897). — *Picridium tingitanum* BALL, p. p. (quoad loca marocana meridionalia); non *R. tingitana* (L.) ROTR., quatum *R. gaditana* (WILLK.) conjungenda esse videtur. — Pentes pierrenses, champs arides etc., assez répandu aux env. de Marrakech.

**Crepis taraxacifolia** THUILL. Fl. env. Par., ed. II, p. 409 (1799).

Subsp. **C. myriocephala** COSS. & DR. ap. BATT. & TRAB. Fl. de l'Alg., I, p. 562 (1888—90). — El Menara etc. à Marrakech.