

ovatâ dorso obtuse carinatâ obtusâ circumcirca anguste marginatâ ciliatâque, calycis tubo glabro limbo obsolete 5-angulato nervis breviter excurrentibus.

§ In insulis Lancerottâ (Bourgeau pl. exs. n. 335), Graciosâ (Webb!) — Webb phyt. canar. p. 178, tab. 191, Bot. mag. tab. 3701 et Bot. reg. tab. 1450! Formæ cultæ laxifloræ. Foliorum limbus tantum 6-9 lin. longus, 4-6 latus, Scapi 3-5 poll. Flores magnit. S. arborescentis. (v. s.)

10. S. BOURGÆI (Webb in Bourgeau pl. can. exs. n. 564!), basi suffrutescens, foliis amplis petiolatis stellato-puberulis oblongis basi attenuatâ subsinuatis vel sæpius lyratis lobo terminali ovato obtuso mucronato basi sæpe sublobato lateralibus 1-3 auriculæformibus rotundatis parvis irregularibus sæpe cum terminali confluentibus, scapo compresso adpressiuscule piloso superne corymboso-paniculato ramis ancipitibus vel angustissime alatis, ramulis angulatis, spiculis 1-2-floris ad ramulorum extremitatem 2-3-fasciculatis, bracteis inferioribus rubello-membranaceis puberulis oblongis nervo dorsali excurrente longe mucronato - aristatis, interiori subcoriaceâ rubellâ duplo longiori puberulâ ciliatâ apice truncatâ nervo carinali excurrente sæpe mucronulatâ, calycis tubo, glabro limbo eroso-truncato nervis excurrentibus 5-aristato. § In insulâ Lancerotte Canar. (Bourgeau!) Folia lobus superior 3-4 poll. longus, $2\frac{1}{2}$ -3 latus. Scapi $\frac{2}{3}$ -1-pedales. Flores illis S. puberulæ duplo majores. (v. s.)

11. S. PREAUXII (Webb phyt. can. sect. 3, p. 181), glabra, caule frutescente tereti nudo, foliis ad basin scaporum rotundato-triangularibus obtusis mucronulatis maxime coriaceis basi truncatis in petiolum longum basi vaginantem