

4. *S. FRUTICANS* (Webb in Bourg. pl. canar. exs. 1847, n. 565), caule brevi fruticoso nudo tereti, foliis ad scaporum basin coriaceis ovatis obtusis mucro-

(1) In omnibus tabulis Phyt. Canariensis corollæ usque sed faucem gamopetalæ et denticuli inter bases filamentorum in *Statice* speciebus delineati false exhibentur.

STATICE. **PLUMBAGINACEÆ** (AUCTOR E. BOISSIER). 637

natis in petiolum breviter attenuatis, scapis humilibus superne corymboso-paniculatis ramisque puberulis valde compressis, spiculis 1-2-floris paucissimis in spicas secundas brevissimas imbricatis, ramulis floralibus bialatis alis a basi angustissimâ sursum dilatatis sub spicâ in auriculas breves inæquales rotundatas reticulatas abeuntibus, bracteis inferioribus ciliolato-marginatis membranaceis ovatis æquilongis, exteriori mucronatâ interiori quadruplo majori rubellâ coriaceâ dorso parallele nervosâ obsolete carinatâ carinâ sub apice truncato ciliatulo paulo magis prominulâ, tubo calycis glabro, limbo acute eroso-dentato. ♂ In Teneriffâ (Brouss. in herb. Willd.! Bourgeau!). *S. arborea* Willd. en. h. berol. 1, p. 337 et herb.! *S. frutescens* Lemaire in fl. serr. et jard. 1848, tab. 325 A. præcedente quâcum mixtam misit Broussonetius differt foliis triplo minoribus 1½-2 poll. longis, scapis 4-6-pollic. ancipitibus nec alatis auriculis ramulorum rotundatis, bracteâ interiori apice ciliatâ, carinâ dorso minus dilatatâ (—).