

I/662

F. J.
(169)
HOF

FLORE PORTUGAISE

OU
DESCRIPTION
DE
TOUTES LES PLANTES
QUI CROISSENT NATURELLEMENT
EN PORTUGAL

AVEC FIGURES COLORIÉES, CINQ PLANCHES DE TERMINOLOGIE ET UNE CARTE

PAR
J. C. COMTE DE HOFFMANSEGG

ANCIEN OFFICIER AUX GARDES DU CORPS DE SA MAJESTÉ LE ROI DE SAXE

ET
H. F. LINK

PROFESSEUR DE BOTANIQUE ET DE CHIMIE A L'UNIVERSITÉ DE ROSTOCK.

TOME I.



A BERLIN

DE L'IMPRIMERIE DE CHARLES FRÉDÉRIC AMELANG

ET SE TROUVE

CHEZ LES AUTEURS, KRONENSTRASSE No. 58.

1809.

62

4. PERSONNÉES.

V. LINAIRE; G.

4. PERSONATAE.

V. LINARIA; G.

Explication de la Planche 49.

- Fig. 1. *Le fleur.*
 Fig. 2. *Le calyce;*
 Fig. 3. *La corolle;*
 Fig. 4. *Idem, fendue, pour faire voir les étamines;* } *grossis.*
 Fig. 5. *La capsule;*
 Fig. 6. *Des semences.*
 Fig. 7. *Une semence, grossie.*

DESCRIPTIO.

A congeneribus sit distincta Species. *Caulis* infero parum lignosus. *Folia* superiora sub exorta ramorum 6 lin. longa, lineam lata; inferiora et superiora minora. *Corolla* galea bifida, reflexa, coerulea; palatum aurantiacum, parum pubescens; labium tripartitum, breve, coeruleum; calcar magis incurvum quam in reliquis, coeruleum. *Capulae* parvae, glabrae.

24.

LINAIRE A FLEUR NAINE.

Caractère.

Tiges assez dressées, presque simples.
 Feuilles inférieures à 4; supérieures alternes; toutes lancéolées-linéaires, glabres. Corolle extrêmement petite, bleuâtre.

Diagnose.

Tige rameuse à la base; tiges secondaires simples, supérieurement à poils courts, qui séparent une petite goutte gluante. Feuilles sessiles, aiguës, très-entières, planes, vertes. Épi à fleurs enfin éloignées; pédicelles longs d'une à 2 lign., pubescents comme la tige. Calyce à lanières lancéolées, aiguës, presque égales, pubescentes comme la tige. Corolle plus petite que le calyce, bleue, marquée de stries plus foncées; éperon plus court, conique, aigu, fléchi en avant. Annuelle.

LINARIA MICRANTHA.

Character.

Caulibus erectiusculis subsimplicibus, foliis inferioribus quaternis, superioribus alternis, omnibus lanceolato-linearibus glabris, corollâ minutâ coerulea.

Diagnosis.

Caulis basi ramosus, cauliculis simplicibus, superne pilis brevibus guttulam viscosam excrementibus. Folia sessilia, acuta, integerrima, plana, viridia. Spica floribus tandem distantibus; pedicellis 1 — 2 lin. longis, pubescentibus ut caulis. Calyx laciniis lanceolatis, acutis, subaequalibus, pubescentibus ut caulis. Corolla calyce minor, coerulea, striis obscurioribus picta; calcar brevius, conicum, acutum, antrorsum flexum. Annua.

Antirrhinum micranthum. CAVANILL. *Ic. I. p. 51. Tab. 69.*

Fig. 3. — LINN. Sp. Ed. WILLD. III. p. 246.



4. PERSONATAE.

V. LINARIA; C. VI. ANTIRRHINUM.

4. PERSONNÉES.

V. LINAIRE; C. VI. MUFLIER.

NOM PORTUGAIS systématique: LINARIA MICRANTHA.

LIEU NATAL. Dans les champs entre *Serpa* et la *Guadiane*.

FLORAISON. Mars.

VI.

ANTIRRHINUM.

MUFLIER.

Character.

Caractère.

Calyx quinquepartitus. Corolla labiata, palato prominulo, ecalcarata. Stamina 4. Capsula obliqua posita, bilocularis, poris dehiscens.

Calyce à 5 divisions. Corolle labiée, à palais assez saillant; éperon nul. Quatre étamines. Capsule posée obliquement, biloculaire, déhiscent par des pores.

OBSERVATIO.

Caulis teres aut subangulatus synedrus. Folia opposita aut alterna, saepe in eadem stirpe mixta. Inflorescentia racemosa aut axillaris; florentibus basilifera. Semina oviformia, scrobiculata.

I.

ANTIRRHINUM LATI-FOLIUM.

MUFLIER A LARGES FEUILLES.

Tabula 50.

Planche 50.

Character.

Caractère.

Caulis frutescens, foliis petiolatis oppositis ovali-oblongis glabris, calyce pubescente, laciniis obtusis, corolla magna purpurea.

Tige frutescente. Feuilles pétiolées, opposées, ovales - oblongues, glabres. Calyce pubescent, à lanières obtuses. Corolle grande, pourpre.

Diagnosis.

Diagnose.

Caulis erectiusculus, ramosus, superne pilis sparsis, guttulam viscosam excrementibus. Folia unciam longa, breviter acuta, integerrima. Racemus pedicellis distantibus, erectis,

Tige assez dressée, rameuse, supérieurement à poils épars, qui séparent une petite goutte gluante. Feuilles longues d'un pouce, courtement aigues, très-entières. Grappe à