

Hab. frequens ex Webb. in Phyt. Can. Habui e Telde Gr. Canar. l. Hillebr.

»L. libycae diagnosis in syn. ined. haec est:

»herbacea annua (sic) virescens foliis lineari-lanceolatis, pe-
»talis calyce tertia parte longioribus laminis ovatis in unguiculam at-
»tenuatis stylo brevi siliculis oblongo-ovatis basi rotundatis apice nunc-
»paullulum angustatis nunc rotundatis immarginatis.»

L. palmensis Webb in Sched. Bourg. It. 1, 249.

fruticulus tenellus, diffusus, ramis filiformibus, pendentibus, foliis elongato-linearibus, acutis, junioribus sericeo-nitidis, floribus candidis violaceo-subfusus, subapertis, racemis etiam maturis abbreviatis saepe corymbiformibus, pedicellis filiformibus, siliculae loculis 1—3 spermis.

Hab. Planta Palmensis. La Caldera leg. Bolle.

Barranco Carmen in antris ego Mart. 1884. Barranco del Rio l. Hillebr.

L. palmensem in syn. ined. auctor ita depingit:

»caule fruticoso foliis linearibus incanis, petalis calyce 3 plo-
»longioribus, ovario ovato, stylo brevissimo, silicula ovato-elliptica»
»glabra loculis 2—4 spermis. Flores odorati candidi filamentis violaceis.»

B. pedicellis siliculis brevioribus seu aequilongis.

L. marginata Webb in Sched. Bourg. It. 1, 344.

plerumque pumila, foliis cuneato-linearibus obtusis griseo-pubescentibus racemis brevissimis confertis, corolla clausa, petalis candidis, pedicellis siliculis vix aequilongis, parietis margine incrassata, loculis 3—4 spermis.

Habitus Alyssi cujusdam annui.

Hab. Handia Ins. Fuerteventurae in rupestribus Ap. 1852 l. Bolle La Isleta in Ins. Canar. magn. 1882. l. Hillebr. et Asken.

»L. marginata in syn. ined. ita ab autore definita:

»caule diffuso basi lignescente, foliis lanceolato-linearibus albido-»
»strigosis vel virescentibus, petalis calyce duplo longioribus lamina»
»ovata in unguiculam decurrente, siliculis ovato vel suborbiculato-ellipticis»
»pilosulis lucidis apice in stylum conicum protracto-ascendentibus, mem-»
»branaceo-marginatis, loculis 3—4 spermis. Fl. albi oculo violaceo.»

β. Bollei Webb, syn. ined.

»petalis calyce subtriplo longioribus laciniis amplis rotundatis, sili-»
»culis orbiculatis.»

»Hab. In penins. Handia ins. Fuerteventurae.»

Webb in synops. ined. de Lobulariis Gorgadensibus haec addit quae hic refero, ne oblivioni tradantur.

»Koniga Vogeliana Webb, syn. ined. *K. intermedia* Webb, spic.»
»Gorg. 400 non Phyt. Can. procumbens cinereo-pilosa foliis brevibus»
»spathulatis acutiusculis, siliculis anguste ellipticis versus basin valde»
»attenuatis.»