

En touffes épaisses, à rameaux flexibles, peu ligneux ; feuilles de 5 à 8 millimètres, vertes, peu pubescentes ; fleurs groupées par 1-3 ; fruits courts de 1 à 2 centimètres.

TÉNÉRIFE : La Mina (800<sup>m</sup>), Las Mercédès (800<sup>m</sup>), Cruz de Taganana (800 à 900<sup>m</sup>).

Lisière des forêts dans les endroits ensoleillés.

Var.  $\delta$  *suffruticosus* Pitard. Pl. Canarienses, n° 134.

Très ligneuses en fortes touffes à souche épaisse ; feuilles courtes, revêtues d'un tomentum court, soyeux ; fleurs groupées 1-3 ; fruits allongés (4 cm.).

TÉNÉRIFE : Région méridionale de Ténérife ; entre Guña et la mer (400<sup>m</sup>) ; Palmar, au-dessus de Buenavista (400 à 500<sup>m</sup>).

Même habitat que la var.  $\beta$ .

Var.  $\epsilon$  *villosissimus* Pitard. Pl. Canarienses, n°s 135 et 536.

Plante très basse (10-20 cm.) ; feuilles courtes, couvertes de poils longs et abondants, blancs ; fleurs groupées par 3-5 ; fruits allongés (3 à 5 cm.).

HIERRO : Puerto del Estaca, El Pozo de Sabinosa, rochers des Casitas.

Rochers arides et chauds de la région maritime.

Var.  $\zeta$  *sessilifolius* Pitard. — *L. sessilifolius* D C., *Cat., Hort. Monsp.*, 122 ; *Prodr.*, II, 210. — *L. dorycnoides* Poir. — *L. pentaphyllos* Link.

TÉNÉRIFE : Toute la côte orientale et méridionale, depuis Anaga aux Christianos : San Andrés, Bufadero, Candelaria, Fasnía, Las Gallietas, etc.

Très polymorphe, plus ou moins velu, feuilles variant de 5 à 15 millimètres de longueur.

Terrains incultes et falaises de la zone exclusivement maritime.

Madère.

**L. peliorhynchus** Webb.

TÉNÉRIFE : Orotava (Hillebr.) ; Tamadaya, au-dessus de Arico (Peraud.).

Région sylvestre. Nous ne le connaissons pas, de même que l'espèce suivante, sur lequel l'*Index Kewensis* reste muet.

Espèce spéciale aux Canaries.

**L. erythrorhizus** Bolle. Fl., avril (Bolle).

FUERTEVENTURA : Handia.

Sables maritimes.

Espèce spéciale aux Canaries.

**L. angustissimus** L., *Sp.*, 1090 ; G. et G., *Fl. Fr.*, I, 530 ; Bert., *Fl. Ital.*, 8, 228. Février à mai.

Var. *medius* Rouy, *Fl. Fr.*, V, 154. — *L. palustris* Willd., *Sp. pl.*, III, 1394. — *L. gracilis* Waldst. et Kit., *Pl. rar. Hung.*, III, 254. — *L. ciliatus* Ten., *Sylloge Nap.*, 379.