



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Encyclopedie methodique. Botanique. Supplement

Paris, Agasse, 1810-1817

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/826>

t.3: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/15277>

Page(s): Page 532

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 2 April 2024 10:16 PM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1687205i00015277.pdf>

This page intentionally left blank.

grande que nous connaissons. Les capsules sont mucronées & de la longueur des folioles du calice. (Voyez JONC de montagne, n°. 29.)

12. LUZULE des Canaries. *Luzula canariensis.*

Luzula foliis maximis, longis; vaginis ore sub-pilosis; corymbo glomerato, albido; caule alto, subcompresso, striato. (N.)

Cette belle espèce ressemble, par ses racines & par son port, au *luzula pediformis*, & par son corymbe au *luzula nivea*. Ses tiges sont longues de deux pieds & plus, droites, glabres, un peu comprimées, striées; les feuilles presque longues d'un pied, planes, larges de six à huit lignes, lancéolées, longuement acuminées, glabres, munies seulement de quelques poils blanchâtres sur leur gaine, principalement à son orifice. Les feuilles radicales ont leur gaine libre, rétrécie en forme d'un long pétiole; les corymbes agglomérés, d'un blanc-luisant; les fleurs petites; les folioles calicinales étroites, aiguës, presque égales.

Cette plante croît aux îles Canaries, sur le bord des ruisseaux, où elle a été découverte par M. Broussonnet. ¼ (V. s. in herb. Desfont.)

13. LUZULE blanchâtre. *Luzula albida.* Dec.

Luzula foliis pilosis, angustis; corymbo paniculato, patulo; pedunculis subquadrifloris; foliolis calicinis mucronatis, interioribus paulò longioribus; capsulis nigrescentibus, inclusis. (N.) — Decand. Flor. fr. 3. pag. 159. — Desv. Journ. bot. 1. pag. 149.

Juncus albidus. Hoffm. Germ. 126, & 3. pag. 168. tab. 4. — Host. Gram. 3. pag. 63. tab. 95.

Gramen. Parkins. Theatr. fig. sin. infr.

Juncus angustifolius. Wulf. in Jacq. Collect. 3. pag. 56.

Juncus leucophobus. Ehrh. Beitr. 6. pag. 141.

Juncus niveus. Leers, Herb. n°. 269. tab. 13. fig. 6.

Juncus pilosus, var. 1. Linn. Spec. Plant. pag. 468.

Cyperella altissima. Rupp. Flor. jen. pag. 144.

Gramen hirsutum, angustifolium, majus. Moris. Hist. 3. §. 8. tab. 9. fig. 3.

Juncus luzuloides. Lam. Encycl. 3. pag. 272.

Dans cette espèce, qui a beaucoup de rapport avec la précédente, la feuille qui tient lieu de bractée est beaucoup plus longue que la panicule. (Voyez JONC luzuloïde, n°. 27.)

14. LUZULE blanc de neige. *Luzula nivea.*

Luzula foliis angustis, longissimis; corymbo pani-

culato, coarctato; pedunculis subquinquefloris; foliolis calicinis acutis, interioribus duplò longioribus; capsula inclusa. (N.) — Decand. Flor. franç. 3. pag. 158. — Desv. Journ. bot. 1. pag. 151. — Moris. Hist. 3. §. 8. tab. 9. fig. 39. (Excl. synon.)

Cyperella serotina. Rupp. Flor. jen. pag. 144.

Juncus niveus. Linn. & Lam. Encycl. 3. p. 272.

β. *Luzula* (*nivea livida*), *floribus albidis.* Desv. l. c.

Distinguée du *luzula albida* par la blancheur remarquable de ses fleurs, elle l'est encore par les trois folioles intérieures du calice, au moins une fois plus longues que les extérieures: quelquefois leur couleur est presque d'un blanc-safran, var. β; mais elles conservent toujours le caractère de l'espèce. (Voyez JONC à fleurs blanches, n°. 26.)

15. LUZULE à courtes feuilles. *Luzula brevifolia.* Desv.

Luzula foliis canaliculatis, pilosis; corymbo glomerato, glomerulis subdecemfloris, foliolis calicinis obtusifusculis. Desv. Journ. bot. 1. pag. 152.

Juncus brevifolius. Hoffm. Flor. lusit. — Rostk. Monogr. Junc. pag. 35.

Juncus lacteus. Link. in Schrad. Journ. botan. 1799. vol. 2. pag. 316.

Juncus niveus, brevifolius. Pers. Synops. 1. pag. 386.

Cette espèce paraît se rapprocher beaucoup du *luzula nivea*: peut-être n'en est-elle qu'une variété: elle s'en distingue par ses feuilles beaucoup plus courtes, pileuses, canaliculées. Les fleurs, disposées en corymbe, sont rapprochées au nombre de huit ou dix par paquet; les folioles calicinales un peu obtuses, de couleur blanche; les intérieures une fois plus longues que les extérieures.

Cette plante croît en Portugal, sur les montagnes. (Desv.)

16. LUZULE jaune. *Luzula lutea.* Decand.

Luzula foliis glabris; corymbo paniculato, conferto; glomerulis multifloris; foliolis calicinis splendentibus, acutiusculis; interioribus longioribus. (N.)

— Decand. Flor. franç. 3. pag. 159. — Desv. Journ. bot. 1. pag. 153.

Juncus luteus. All. Pedem. — Vill. Dauph. 2. pag. 235. tab. 6. — Lam. Encycl. 3. pag. 271. — Rostk. Monogr. Junc. pag. 31. tab. 2. fig. 1.

Luzula campestris, var. 1. Linn. Spec. 469.

Aux caractères qui distinguent cette espèce du *luzula campestris*, on peut y ajouter que ses fo-

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 532]

53 L'UZ

grande que nous connoiffions. Les capfules font mucronées & de la longueur des folioles du ça-lice. (Voyez Junc de montagne, n°. 29.)

12. LuZULE des Canaries. Zuzula canarienfis.
Luzula foliis maximis , longis ; vaginis ore [ub-
Pilofis ; corymbo glomerato , albido ; caule alto,
fubcompreffo, friato. (N.)

Cette belle efpèce refflembre , par fes racines &
par fon port, au lugula pediformis, & par fon
corymbe au /uyula nivea. Ses tiges font longues
de deux pieds & plus, droites, glabres, un peu
comprimees , ftriées ; les feuilles prefque longues
d'un pied, planes , larges de fix à huit lignes,
lancéolées , longuement acuminées , glabres ,
munies feulement de quelques poils blanchâtres
fur leur gaine, principalement à fon orifice. Les
feuilles radicales ont leur gaine libre, rétrécie
en forme d'un long pétiole ; les corymbes agglo-
mérés , d'un blanc-luifant ; les fleurs petites ; les
us calicinales étroites , aiguës , prefque
es.

_ Cette plante croît aux îles Canaries, fur le
bord des ruiffleaux, où elle a été découvert: par
M. Brouflonnet. % (W. f. in hers. Desfont.)

13. LuzuLE blanchâtre, Luyula albida. Dec.

- Lugula foliis pilofis, anguffis ; corymbo paniculato,
patulo ; pedunculis Jubquedrifloris ; foliolis calicinis
mucronatis , interioribus paul longioribus ; capfulis
nigrefcentibus ; inclusis. (N.) — Decand. Fior. fr.

3: pag. 159. — Defv. Journ. bot, 1. pag. 149.

Juncus albidus. Hoffm. Germ. 126 s GC 3. pag.

168, tab. 4. — Hoft. Gram. 3. pag. 63. tab.95.

Gramen. Parkinf. Theatr. fig. fin. infr.

Juncus angulifolius. Wulf. in Jacq. Colleë. 3

pag. 56.

Juncus leucophobus. Ehrh. Beitr, 6. PaB. 141.

- niveus. Leers, Herb. n°. 269. tab. 13.

g. 6.

Jmaces pilofus, var. . Linn. Spec. Plant.pag, 468.

_Cyperella altifima. Rupp. Flor. jen. pag. 144.

Gramen hirfutum, ifoliunr maïus:Métîl:

HS ORNE > majus. Mor

Juncus luzuloides. Lam. Encycl. 3- pag. 272.

Dans cette efpèce, qui a beaucoup de rapport
avec la précédente, la feuille qui tient lieu de
braétée eft beaucoup plus longue que la panicule.

€ Voyez Junc luzuloide , n°. 23.)

14. LuzuLE blanc de neige. Luyula nivea.

Luula foliis angulifis | longifimis ; corymbo pani- |
"

E U 2

culato, coaréato; pedunculis fubquinquefloris ; foliolis calicinis acutis, interioribus dupl longioribus ; capfulà inclufä. (N.) — Decand. Flor. franç. 3. pag. 158.

— Defv. Journ. bot. 1. pag. 151. — Morif, Hit.

3e \$. 8. tab. 9. fig. 39. (Excl. fynon.)

> Cyperella ferotina. Rupp. Flor. jen. pag. 144.

Juncus niveus. Linn. & Lam. Encycl. 3. p. 272.

8. Luqla (nivea livida}, foribus albidis. Def.

L:c.

Diftinguée du luyula albida par Ja blancheur remarquable de fes fleurs, elle eft encore par les trois folioies intérieures du calice , au moins une fois plus longues que les extérieures : quelquefois leur couleur eft prefque d'un blanc-fale , var. 8; mais elles confervent toujours le caraëtère de lefpèce. (Voyez Jonc à fleurs blanches,

1: 20)

15. LUZULE à courtes feuilles. Lugula brevi-folia. Defv.

Luzula foliis canaliculatis, pilofis ; corymbo glo-
merato , glomerulis fubdecemfloris , foliolis calicinis obtuifculis. Defv. Journ. bot. 1. pag. 152.

Juncus brevifolius. Hoffm. Flor. Iufit. — Roftk.

Monogr. Junc. pag. 35.

Juncus laëteus. Link. in Schrad. Journ. botan.

1799. vol. 2. pag. 316.

SE niveus , brevifolius. Perf, Synopf. 1. pag.

306.

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup du /uqla nivea : peut-être n'en eft-elle qu'une variété : elle s'en diltingue par fes feuilles beaucoup plus courtes, pileufes, canaliculées. Les fleurs, difpofées en corymbe , font rapprochées au nombre de huit ou dix par paquer ; les folioles calicinales un peu obtufes , de couleur blanche ; les intérieures une fois plus longues que les extérieures.

Cetre plante croît en Portugal , fur les montagnes, (Defv.) "A

16. LUZULE jaune. Luyula lutea, Decand.

Luyula foliis glabris ; corymbo paniculato , con-
ferto ; glomerulis mulrifloris ; foliolis calicinis fp-
lendentibus , acutiufculis ; interioribus longioribus. (N.)

— Décand. Flor. franç. 3. pag. 159. — Défv.

Journ. bot. 1. pag. 153.

Juncus luteus, All. Pedem. — Vill. Dauph. 2.

pag. 235. rab. 6. — Lam. Encycl. 3. pag: 271+-

— Roftk. Monogr. Junc. pag. 31. tab. 2. fig. 1-

Luzula campefris, war. «. Linn. Spec. 469.

Aux caractères qui diftinguenr cette efpèce du luqla campefris, on peut y ajouter que fes fo-