



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas
rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis,
nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus,
secundum systema sexuale digestas...**

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Title Page, Page 480, Page 481

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 31 May 2024 3:32 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1704032i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIAE ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD
GENERALATAS,
CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE
DIGESTAS.

TOMUS I.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciae & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.

HOLMIAE,
IMPENSIS LAURENTII SALVII.
1753.

- Epirotica. 2. *Poma orbiculata*. *Ruell. stirp.*
Habitat in Europa. ♂
- coronaria. 3. *PYRUS* foliis ferrato-angulosis.
Malus sylvestris, floribus odoratis. *Gron. virg.* 55.
Habitat in Virginia. ♂
- Cydonia. 4. *PYRUS* foliis integerimis. *Hort. cliff.* 160. *Mat.*
med. 238. *Roy. lugdb.* 267.
Malus cotonea sylvestris. *Bauh. pin.* 435.
 3. *Malus cotonea major*. *Bauh. pin.* 434.
 2. *Malus Cotonea minor*. *Bauh. pin.* 434.
Cotonea & Cydonia. *Lob. hist.* 580.
Habitat ad ripas petrosas Danubii. ♂

TETRAGONIA.

- fruticosa. 1. *TETRAGONIA* foliis linearibus. *Roy. lugdb.* 250.
Tetragonia. *Hort. cliff.* 188. *Hort. upf.* 126.
Tetragonocarpus africana rutilans, foliis longis & angustis. *Comm. hort.* 2. p. 205. t. 103.
Evonymo affinis africana, portulacæ folio. *Seb. thes.* 2.
 p. 13. t. II. f. 8.
Habitat in Æthiopia. ♀
- herbacea. 2. *TETRAGONIA* foliis ovatis. *Roy. lugdb.* 450
Tetragonocarpos africana, radice magna crassa & carnosæ. *Comm. hort.* 2. p. 203. t. 102.
Habitat in Æthiopia. ♂

MESEMBRYANTHEMUM.

* *Albis corollis.*

- nodiflorum. 1. *MESEMBRYANTHEMUM* foliis alternis teretiusculis obtusis ciliatis. *Hort. upf.* 129.
Kali crassulæ minoris foliis. *Bauh. pin.* 289. *Moris. hist.* 2. p. 610. s. 5. t. 33. f. 7.
Kali neapolitanum aizoides repens. *Col. ecphr.* 2. p. 72. t. 73.
Kali II. Alp. ægypt. 125. t. 127.
Habitat in Ægypto, Neapoli. ☽

- crystallinum 2. *MESEMBRYANTHEMUM* foliis alternis ovatis obtusis undulatis. *Hort. cliff.* 216. *Hort. upf.* 127.
Roy. lugdb. 281.
Mesembryanthemum crystallinum, plantaginis folio undulato. *Dill. elth.* 231. t. 180. f. 211.

Ficoides africana, folio plantaginis undulato micis argenteis adsperso. T. Bradl. succ. 5. t. 15. f. 48.

Habitat in Africa? ○

3. MESEMBRYANTHEMUM foliis semiteretibus, *geniculiflorum* floribus tellibus axillaribus.

Mesembr. ramis undique papillosis folio crassioribus.

Hort. cliff. 218. *Roy. lugdb.* 285.

Mesemb. capense *geniculiflorum* neapolitanum creditum.

Dill. elth. 271. t. 205. f. 261.

Ficoides neapolitana, flore candido. H. Bradl. succ. 5. t. 17. f. 34.

Ficoides capense, folio tereti, flore albido. Pet. gaz. t. 78. f. 3.

Habitat ad Cap. b. Spei. 5

4. MESEMBRYANTHEMUM foliis semicylindrica-*noctiflorum* ceis, floribus quadifidis.

Mesembr. foliis subuiatis semicylindricis laevibus vix connatis apice recurvis. *Hort. cliff.* 220. *Roy. lugdb.* 286.

Mesembr. noctiflorum, flore intus candido extus phœniceo odoratissimo. *Dill. elth.* 273. t. 206. f. 262.

5. Mesemb. noctiflorum, flore intus candido extus stramineo odotatissimo. *Dill. elth.* 274. t. 206. f. 263.

Habitat in Africa. 5

Calyx huic quadrifidus, styli 4, fructus quadrilocularis.

5. MESEMBRYANTHEMUM foliis subtrigonis sub-*umbellatum* bulatis, caule erecto, corymbo trichotomo.

Mesembr. frutescens, floribus albis umbellatis. *Dill. elth.* 277. t. 208. f. 266.

Ficoides africana erecta teretifolia, floribus albis umbellatis. *Herm. par.* 166. t. 166. *Bradl. succ.* 4. p. 12. t. 44.

Habitat ad Caput b. Spei. 5

6. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis subterete-*calamiforme* tibus connatis, floribus octagynis.

Mesembr. calamiforme. *Dill. elth.* 239. t. 186. f. 228.

Ficoides capensis humilis, cepææ folio, flore stamineo: *Bradl. succ.* 2. p. 10. f. 19.

Habitat ad Cap. b. Spei. 2

7. MESEMBRYANTHEMUM foliis lanceolatis platis crenulatis. *Hort. cliff.* 217. *Hort. upf.* 128. *Roy. lugdb.* 283.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

CAROLI LINNZEI

S: R:crg. M:ris Sveciæ AncuiaTRI; Mzapic.: & BorAx,
Paorrss. UPsAr; EQUITIS AUR. DE STELLA Porani;
nec non AcaD. IMPER. MowsprEr. BERor. Toros.
U»rsar. STOCKH.: Soc. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD
GENERA RELATAS,
CUM
DirrFRENTIIS SPrcIFICIS,
NowiNIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Locis NaraLIBUs,
SECUNDUM

„SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.
Towus I

Cum Privilégio S. R. Mtis Suecie 3? S. R. Mtis. Polonice ac Eletloris. Saxon,
«TON SN MT S NANASI — DIT ININ m ^

HOLMIÆ,
lureNSiS LAURENTII SALVII.

[Begin Page: Page 480]

480 ICOSANDRIA PENTAGYNIA.

Epirotica, . Poma orbiculata. Ruell. flirp.
i Habitat ia Europa. b —
coronaria, 3. PYRUS foliis ferrato-angulofis.

Maius fylvefris, floribus odoratis. Groz. virg. s5..
Habitat im Virginia. b

Cydonia, 4. PYRUS foliis integerrimis. Hort. cliff. 160. Mat.

med. 238. Roy. lugdb. 267.

Malus cotonea fylvetris. Bauh. pia. 435.

B- Malus cotónea major. Bag. piz. 434.

Y. Malus Cotonea minor. Bauh. pin. 434.

"Cotonca & Cydonia. Lob: biff. \$90.

Haéitat ad ripas petrofas. Danubii. b

es TE'TRAGONIA.

fiif. 3, TETRAGONIA foliis linearibus. Roy, lugdb. 20.

. Tetragonia. Hort, cliff. 188. Hort. wpj. 1202:

"Tetragonocarpus africana rutilans, foliis longis & anguis. Comm. bort. 2..p. 20\$. £. 102. :

. ~.

- Evonymo afúnis africana, portulace folio. Seb. thef 2

. I3. É IT. f. 5. AES T

Hliitas in ihoa. P

berbacea, 2. TETRAGONIA foliis ovatis. Roy. lugdb. 450

Tetragonocarpos africana, radice magna craíla earna"

fa. Comm. Port. 2.. p+ 203. 4. 102.

Habitat in [Ethiopia. b

MESEMBRY ANTHEMUM. .-.

T NN | .. bis corollis, - eg

nodiforum 1: MESEMBRYANTHEMUM. foliis alternis terétt.

ufculis obtufis ciliatis. Hort. apf. 129.

Kali craffle minoris foliis. Bazh. ps. 299. AMorif.

bift..2. p. 610. f. \$. 1. 33. F. 7-

Kali neapolitanum aizoides repens. Col ecpér. 2. p

92.359 JR i

Kali II. Alpiægypt: 125. f. 127.

Habitat in Aigypo, Neapol. © | AIEE

eryhallinum 2. MESEMBRYANTHEMUM foliis alternis ovatis

obtufis undulatiss: Horts chf. 416. Hort. upf- ATT

Roy. lugáb. 281. PE

Mefembryanthemum cryptallinum; plantagiñis folio un*

dulato.- Dilli elib. 331. t. 180, f; 21r 5 Jh

sia

!

*

[Begin Page: Page 481]

ICOS ANDRIA PENTAGYNIA:: 481.

Ficoides africana, folio. plantaginis undulato . mícis.ar«
genteis adíperfo. T T. Bradl Eo d t: i zs 48.

Habitat -in Atrica?. G "
(3 MESEMBRYANTHEMUM foliis détisodois geniculifioe
floribus fetntibus axillaribus: rum.

Meíembr. ramis dide upne folio eráffioribus.
Hort. chif. 218: Roy: dugdo. a8yi
«< Melem poaae geniculitorum neapolitanum creditum; ssi
Dill eth. 231.2. 20\$. f. 161. i
FPES neapolitana , fore candido. - H: Bradl. nec. f.
£2 g£ \$- 3 tt
F coi Sisi, i EA tereti, lore. albido, Pet: gaz:
nail dd ib. pin 8317. Ado Ho
4: MESEMBRYANTHEMUM f foliis Timid iiri- mechiflsrum,
| C€eis „, floribus gh uadifidisz.
Magni foliis übuidtis fcinicylindeicis Igvibys vix
is apatis- apice recurvis. SU a à20; idi figab.

vu nv &
et sd ^ AJ gi rn

E nó

| -. fmneo dee d "Di. RU 334: £.106.5363.—
"Habita ia Africa. 5. : s
Calyx bz quadrifidus, fl å; Fiuttas quad'ilcnloris

r\$: MEREMBR TONE HEMYM foliis- fubtrigonis fas, nibela
ulatis, càule 'erecto, corymbo trichotomo.
Mek mbr. fratefogas foribus albis urribellaris; Dil.
; 5 aA £, 208. f. 266;
"Ficoidór africana- rcgi terétfólia, Horibus álbis im-
in {lerm par. 166. t, 166; 6; Bradl, fec. A. p: Yà;

445 EIJA
y ad Caput Bi Spe: b

6 MESEMPRYANTHEMUM ácadle; foliis (übterd- calamiformé
tibus connatis, flotibus octagynis.
"Mefembr. caiamiforme. Dill. eith. 130. f. 186. f. 238,
F icoides capenfis humiliis, cepz« folio; dete. fiseinco:

Brad. frec: í. z: ro. f. 49.

Habitat ad Cap. b. Spei. z

7 MÉSEMBRYANTHEMUM foliis lanceolatis ela- Tripolis:

. " 'mis erenulatis; « Horzel E 217. Han spp 128, toy: :

xin 83. à