

Acopl. 03473.500601

F  
L168  
AMO

FLORA FANEROGAMICA

DE LA PENINSULA IBERICA

Ó DESCRIPCION DE LAS PLANTAS COTYLEDÓNEAS

QUE CRECEN EN

ESPAÑA Y PORTUGAL

TOMO VI

CORRESPONDIENTE Á LA SUBCLASE 4.ª DE LAS DICOTYLEDÓNEAS

POLIPETALAS TALAMIFLORAS

DISTRIBUIDAS SEGUN EL MÉTODO DE FAMILIAS

POR EL

Dr. D. MARIANO DEL AMO Y MORA

DECANO DE LA FACULTAD DE FARMACIA

DE LA

UNIVERSIDAD DE GRANADA



GRANADA

IMP. DE D. INDALECIO VENTURA

1878

Rº 10025

*ribusve, pedicello brevioribus, compresso-ancipitibus; foliis inferioribus lyratis, superioribus pinnatifidis, laciniis integris aut dentatis, petiolo sæpè basi auriculato. 2<sup>o</sup>. In paludosis, locis humidis fossisque. Fl. æstate.*

Especie muy parecida á la anterior de la que difiere por su mayor talla y su vegetacion mas lozana; las flores mas grandes; las hojas adornadas generalmente de dos orejuelas abrazadoras del tallo, situadas en la base del peciolo: en fin, las silicuas son mas cortas que el pedicelo, lineares-oblongas, comprimidas y como de dos filos por lo aguzado de los bordes.

Hab. en las mismas localidades de la especie anterior, mezclada con ella.

NOTOCERAS. (R. BROWN. H. KEW. ED. 2. V. 4, P. 117.)

*N. BICORNE. (miki) Siliquis bicornibus; foliis integris, pilis strigosis centro adfixis bipartitis adpressis sparsis. ☉. In ruderalis arenosisque calcareis. Fl. per totum annum.*

<sup>a</sup>. CANARIENSE. *Notoc. canariensis. R. Br. l. c. Jacq. fil. eclog. tab. 111 optima. Erysimum bicorne. Ait. h. kew. ed. 1. v. 2, p. 594. Petalis æqualibus, caulibus à basi ramosis, erectiusculis aut subdiffusis.*

<sup>b</sup>. HISPANICUM. *DC. syst. 2, pag. 204. Diceratium prostratum. Lag. elench. h. matrit. 1816, p. 20. Petalis inæqualibus, caulibus prostratis.*

Raíz anual, delgada, casi sencilla, apenas fibrilosa, de la que salen tallos mas ó menos difusos ó postrados, ramosos desde su base, cubiertos de pelos ásperos, bipartidos y apretados, como tambien las hojas, los cálices y las silicuas. Ramas axilares divergentes. Hojas lanceolado-oblongas ó casi lineares, adelgazadas por su base, enteras. Flores pequeñas, amarillas, dispuestas en racimos cortos al principio, pero al fin largos y derechos, opuestos á las hojas; los inferiores casi radicales. Cáliz cerrado y los sépalos ovales, obtusos. Pétalos iguales entre sí y un poco mas cortos que el cáliz ó los dos pétalos exteriores mayores que los otros dos y mas largos que los sépalos. Pedicelos fructiferos, cortos, gruesos y en forma de peonza. Silicuas derechas, perpen-

diculares, comprimido-tetrágonas, bicornes en su ápice, terminadas por el estilo corto, filiforme, situado entre los dos cornuzuelos, derecho y tan largo como ellos. Semillas 4 en cada celda, comprimidas, casi orbiculares.

Hab. la var. *α*. en la parte oriental del reino de Granada (Rox. Clem.)

La var. *β*. en los reinos de Valencia Murcia y Granada (Lag.), en la provincia de Lorca (Cánovas ex herb. meo.)

ARABIS. (L. GEN. 818.)

Secc. 1.<sup>a</sup> *Turritella*. C. A. Mey. in *Ledeb. fl. alt.* 5, pag. 15. Limbo de los pétalos derecho, linear-oblongo. Semillas sin ala ó circuidas por los lados de una márgen angosta.

1.º Silicuas desviadas del eje floral.

A. BRASSICÆFORMIS. *Wallr. sched.* 559. *Brassica alpina*. L. *mant.* 95, et *Vill. delph.* 5, p. 550, tab. 56. *Rehb. l. c. fig.* 4555. *Erysimum alpinum*. *Duby bot. gall.* p. 46. *Foliis glabris integerrimis, radicalibus oblongis subrotundisve in petiolum protractis, caulinis oblongo-lanceolatis basi profundè cordato-sagittatâ amplexicaulibus; siliquis in pedicello patente erectiusculis, valvulis convexiusculis nervo valido notatis, seminibus apteris.* 2½. *In montosis lapidosis præcipuè calcareo-jurassicis, inter virgulta. Fl. Majo, Junio.*

Planta lampiña de 5-10 decím. de altura y los tallos sencillos, rígidos, derechos. Hojas coriáceas, lisas; las radicales persistentes, oblongas ó casi redondas, adelgazadas en forma de peciolo; las del tallo oblongo-lanceoladas, enterísimas, profundamente acorazonado-aflechadas y abrazadoras del tallo por su base. Flores blancas, su cáliz lampiño tan largo como el pedúnculo. Racimo fructífero alargado, derecho; los pedicelos extendidos, mas delgados que las silicuas. Estas son comprimido-tetrágonas y se hallan enderezadas sobre el pedicelo. Semillas ovales, gruesas, no aladas, dispuestas en una sola fila en cada celda.

Hab. en los Pirineos.

A. SAXATILIS. *All. péd.* 1, pag. 268. *Rehb. l. c. fig.* 4555. *A. nova*. *Vill. delph.* 5, p. 519, tab. 57. *Foliis cauleque pube ramo-*