



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Encyclopédie méthodique. Botanique**

Paris, Liège, Panckoucke; Plomteux, 1783-1808

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/824>

**t.1 (1783):** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/15259>

Page(s): Text, Title Page, Page 508

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 4 April 2024 3:18 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1687576i00015259.pdf>

This page intentionally left blank.

ENCYCLOPÉDIE  
MÉTODIQUE.

---

---

BOTANIQUE.

*Par M. le Chevalier DE LAMARCK, ancien Officier au Régiment  
de Beaujolois, de l'Académie Royale des Sciences.*

---

---

TOME PREMIER.

---

---



A PARIS,

Chez PANCKOUCKE, Libraire, Hôtel de Thou, rue des Poitevins.

A LIÈGE,

Chez PLOKTEUX, Imprimeur des Etats.

---

---

M. DCC. LXXIII.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILÈGE DU ROI.

MISSOURI  
BOTANICAL  
GARDEN.

5-11741-2

Ref  
Q157  
K36  
1783-85  
V.1

glabres, cendrées ou blanchâtres, feuillées dans toute leur longueur, & disposées en touffe. Ses feuilles sont composées de trois folioles lancéolées, un peu étroites, vertes, glabres, dentées en scie, & presque sessiles. Les pétioles, longs à peine d'une ou deux lignes, sont enfermés chacun dans une stipule vaginale, sèche & aride. Les fleurs sont purpurines, assez grandes, & disposées deux ou trois ensemble sur chaque pédoncule, forment au sommet des tiges de belles grappes droites & terminales. Cette plante croît naturellement dans les montagnes du Dauphiné : on la cultive au Jardin du Roi. *H.* (v. v.) Elle commence à fleurir vers la fin de Mai, dure fort long-tems en fleur, & mérite d'être cultivée dans les bosquets & les parterres.

13. BUGRANE à trois dents, *Ononis tridentata*. Lin. *Ononis fruticosa foliis ternatis carnosis sublinearibus tridentatis, pedunculis bifloris*. Lin. Mill. Dict. n°. 4. *Anonis Hispanica frutescens, folio tridentato carnosio*. Tournef. 408. Magn. Hort. 16. *Cum Icone*. Raj. Suppl. 466. Plantes du Roi, fig. 8. *Eadem? foliis cuneiformibus quinquedentatis, pedunculis unifloris*. Flor. Aragon. p. 95. n°. 671. var. 2. *Cicer montanum fruticans, incanum, angustifolium, serratum minus*. Barrel. Ic. 419.

Ses tiges sont ligneuses, rameuses, hautes d'un pied & demi, couvertes d'un duvet court un peu cotonneux, & garnies de feuilles peu écartées les unes des autres. Ces feuilles sont ternées, & ont leurs folioles un peu étroites, presque linéaires, charnues, verdâtres, & la plupart terminées par trois dents. Les fleurs sont purpurines, portées sur des pédoncules plus longs que les feuilles, viennent au sommet des tiges & des rameaux, & ont leur calice velu plus court que la corolle. Elles sont le plus souvent au nombre de deux sur chaque pédoncule.

La plante se forme pareillement un sous-arbrisseau très-rameux & haut d'un pied ou d'un pied & demi; mais elle en diffère par plusieurs caractères assez remarquables. Ses tiges sont blanches & beaucoup plus cotonneuses; les feuilles sont plus courtes, cunéiformes, blanchâtres, & la plupart à cinq petites dents à leur sommet. Les pédoncules sont courts, latéraux, plus souvent uniflores, & soutiennent des fleurs purpurines dont le calice est moins velu. Ces plantes croissent en Espagne, & nous ont été communiquées par M. l'Abbé Pourret. *H.* (v. f.)

14. BUGRANE à feuilles étroites, *Ononis angustissima*. *Ononis viscoso-pubescentis, foliis ternatis simplicibusque, foliolis linearibus angustissimis serratis; floribus lateralibus; pedunculis longis aristatis unifloris*. N. *An cicer sylvestre fruticans incanum angustifolium serratum, flore purpureo, Hispanicum*. Barrel. Ic. 299. *Folia nimis obtusa*.

Cette espèce a un aspect tout-à-fait particulier, à cause de ses folioles longues, linéaires & très-

étroites, & par l'effet des pétioles fort courts qui font paroître les folioles fasciculées comme des feuilles de Mélèze; la fig. 300 de Barrelier conviendrait mieux à notre plante, que celle que nous citons, si les feuilles étoient dentées. Ses tiges sont rameuses & hautes d'un pied & demi; les stipules sont vaginales, pubescentes, bifides, & dentées, au moins les inférieures. Les fleurs sont latérales, axillaires, solitaires, portées sur des pédoncules plus longs que les feuilles, & munies d'un filet. Les gouffes sont velues, plus longues que le calice, & pendantes. Cette plante croît en Espagne. (v. f.)

\* \* Fleurs jaunes, & plus ou moins rayées de pourpre.

15. BUGRANE gluante, *Ononis pinguis*. *Ononis viscosa, pedunculis unifloris aristatis, foliis ternatis, caule fruticoso*. N. *Anonis viscosa spinis carens lutea major*. Bauh. Pin. 389. Tournef. 409. *Anonis*, Hall. Helv. n°. 358. Mill. Dict. n°. 6. & Ic. Tab. 33. *Natrix Plinii herbariorum*. Lob. Ic. 2. p. 28. *Ononis natrix*. Lin.

β. *Anonis non spinosa, flore luteo variegato*. Bauh. Pin. 389. Tournef. 409. *Anonis lutea non spinosa, natrix Plinii herbariorum*. Dalech. Hist. 449. *Ononis pinguis*. Lin. *Anonis*. Pluk. t. 135. f. 5.

γ. *Anonis non spinosa, flore luteo variegato, angustifolia maritima*. Tournef. 409.

Cette Bugrane est gluante ou visqueuse d'une manière très-remarquable; elle porte d'assez jolies fleurs; mais toutes les parties exhalent une odeur désagréable. Ses tiges sont dures, ligneuses, rameuses, hautes presque d'un pied & demi, & chargées d'un duvet visqueux. Ses feuilles sont pétiolées, composées de trois folioles ovales-oblongues, souvent un peu étroites, & dentées seulement à leur sommet. Les feuilles florales sont simples. Les pédoncules portent chacun une fleur jaune assez grande, striée de pourpre en son pavillon, & sont chargées d'un filet particulier un peu au-dessous de la fleur qu'ils soutiennent. On trouve cette plante sur le bord des champs, dans les lieux incultes, en France & dans d'autres régions de l'Europe australe. *H.* (v. v.)

16. BUGRANE visqueuse, *Ononis viscosa*. Lin. *Ononis pedunculis unifloris, aristatis, foliis simplicibus, infimis ternatis*. Lin. Mill. Dict. n°. 7. *Anonis viscosa, spinis carens, lutea, latifolia, annua*. Magn. Hort. 18. Tournef. 409. *Anonis lutea, viscosa, latifolia, minor, flore pallido*. Barrel. n°. 840. Ic. 1239.

β. *Anonis annua erectior, latifolia glutinosa Lusitanica*. Tournef. 409.

Ses tiges sont longues de huit à neuf pouces, plus ou moins droites, herbacées, rameuses, & chargées de poils glutineux. Elles sont chargées de feuilles la plupart simples, & qui le sont même toutes sur certains individus. Ces feuilles sont

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Text, Title Page]

ENCYCLOPÉDIE :  
MÉTHODIQUE.

se  
sang A

...—

BOTANIQUE.

Par M. le Chevalier DE LAMARCK, ancien Officier au Régiment  
de Beaujolois, de l'Académie Royale des Sciences.

— SE —

+ r : : \_ rues Le ee ag

TOME PREMIER

Æ PAL. S —.

Chez PANCKOUCKE, Ébfitte, Hôtel de Thou, rue des Poitevins. : .

À... L T É@4

Chez Pros se ux, Imprimeur des Etats.

+ \_ — vtt LD. Fe

M DCC. EÉXXIIL |

Avec APPROBATION, ET PRIVILÉGE DU Res %

| au 70

DE. À

Le,

Lo

Fa 3-rS

û.

[Begin Page: Page 508]

.

+

108 BUG

glabres, cendrées ou blanchâtres, feuillées dans  
feuilles font compofées de trois folioles lancéo-  
Kes, un peu étroites, vertes, glabres, dentées  
en fcie, £ prefque feffiles. Les périoies, longs à  
ine d'une ou deux lignes, font enfermés chacun  
'dans une ftipule vaginale, sèche & aride. Les  
fleurs font purpurines, afféz grandes, & difpofées  
deux ou trois enfemble fur chaque pédoncûle,  
forment au fommet des tiges de belles grappes  
droites & terminales. Cette plante croît natu-  
rellement dans les montagnes du Dauphiné : on  
Ja cultive au Jardin du Roi. B. ( v. v.) Elle com-  
mence à fleurir vers la fin de Mai, dure fort  
long-tems en fleur, & mérite d'être cultivée dans  
ré we & les parterres.

13. BUGRANE à trois dents, *Ononis tridentata*.

Lin. *Ononis fruticofa foliis ternatis carnofis publi-  
nearibustridentatis ; pedunculis bifloris*. Lin. Mi,  
Di&. n°. 4. *Anonis Hijparica frutefoens ; foho*

tridentato carnofo. Tournef. 408. Magn. Hort. 16.  
Cum Icone. Raj. Suppl. 466. Plantes du Roi ; fig:  
8. Eadem? foliis euneiformibus quinquedenta-  
is, pedunculis unifloris: Flor. Aragon. p. 95..  
n°. 671. var. 2: Cicer montanum fruticans , inica-  
num, angufhifolium , ferratum minus. Barrel.  
SLT ob ES ALT Pi .\$.

ped & demi, couvertes d'un duvet court un pet  
cotoneux , & garnies de feuilles pen écartées les  
unes des autres. Ces feuilles font ternées, & ont  
\_ leurs folioles un peu étroites ; prefque linéaires ;  
a. mes, verdâtres, & la plupart terminées pat  
E

a. Beÿ fleurs font purpurines ; portées

"plus long

viennent y ns

ont leur calice vehi plus court que la corolle.

Elles font ie plus' fotivent au nombre de deux fur  
chaque pédoncule, sr

La plante 8 forme pareillement un fous-arbrif  
feau très-rameux & laut d'un pied ou d'un pied  
& demi; mais elle en diffère par plufieurs carac-  
tères affez remarquables. Sés tiges font blanches  
& beaucoup plus cotonneufes ; es feuilles font  
courtes , cunéiformes , blanchâtres, & la  
- plupart à cinq petites dents à leur fommet. Les  
. pédoncules font courts, latéraux ; plus fouvent  
uniflores, & fottiennent des fleurs purpurines  
dont le calice eft moins velu. Ces plantes croiffent  
en Efpagne, & nous ont été communiquées par  
M. PAbbé Pourret, F. (ft) -

14. BUGRANE à feuilles étroites, Ononis an-  
guiffima. Ononis vifcofo-pubefcens , folirs terna-  
tis fimplicibusque , foliolis linearibus anguiffimis  
ferratis ; floribus lateralibus ; pendunculis longis  
ariflatis unifloris. N. An eicer fylveffre fruticans  
incanum angufhifolium ferratum., flore purpuréo ,  
Hifpanicum. Barrel. Ic. 299. Folia nimis obtufa.  
Cetre efpece a un'apeët tout-à-fait particulier ,  
à caufe de fes folioles longues: -linéaires.& très-  
| à

: font ligneufes , rameufes ; hautes dun

au fommet des tiges & des rameaux; &

+ Toute leur longueur, & difpofées en touffe. Ses |

BU G

font paroître les folioles fafciculées comme des  
feuilles de Méléze, la fig. 300 de Barrelier con-  
viendroit mieux à notre plante , que celle que  
nous citons , fi les feuilles étoient dentées. Ses  
tiges font rameufes & hautes d'un pied & demi;  
les ftipules font vaginales, pubefcentes , bifides ;  
& dentées, au moins les inférieures. Les fleurs  
font atérales , axillaires ; folitaires, portées fur  
des pédoncules plus longs que les feuilles, &  
munies d'un filet. Les gouffes font velues, plus  
croît en Efpagne. (v.f.)

\*\* Fleurs jaunes , & plus ou moins rayées de

pourpre. livrés aan

14. BucraAwr gluante ; Ononis pinguis. Ononis vifcofa , pedunculis wnifloris ariffaus , folis ternatis caule fruticofo. N. Anonis sifcofa fpinis carens lutea major. Baub. Pin. 389. Tournef. 409. Anonis, Hall. Helv. n°. 358. Mill. Diét. n°. 6.

lc. 2:p: 28. Ononis natrix. Lin, ,

8. Anonis non fpinofa , flore 'luteo variegato.

Bauh. Pin: 389. Tournef, 409. Anonts lutea non

| fpinofa, natrix Plinii herbariorum. Dalech. Hift.

: 449, Ononis pinguis. Lin. Anonis. Pluk.t. #35:

per SE EE DC 39 :

7. Anonis non fpinofa , flore luteo variegato ;

angufhfoliæ maritima. Fournef. 409. ee

Certe Bugrane eft gluante ou vifqueufe d'une manière très-remarquable ; elle porte d'aflez jolies fleurs; mais toutes {es parties exhalent ure odeur défagréeable, Ses tiges font dures, ligneufes , ramufes, hautes prefque d'un pied & demi, pétiolées , -compofées de trois folioles ovales-feulement à. leur fommet. Les feuilles florales pavillon, & font chargées d'un filet particulier un peu au-deffous de la fleur qu'ils foutiennent On trouve cette plante fur le bord des champs, tres régions de l'Europe auftrale, F3. (v..)

Ononis pedunculis unifloris ; ariflatis , folits fimplicibus ; infimis ternatis. Lin. Müll.

Anonis vifcofa, fpinis carens, lutea, latifolia s annua. Magn. Hort. 18. Tournef. 409. Anonis lutea, vifcofa; latifolia, minor , flore pallido-Barrel. n°. 840. lc, 1239.

&. Anonis annua erediior,

Lufftanica, Tournef, 409.

-\$es tiges font longues

plus ou moins: droites, herbacées, rameufes ; & de feuillés la plupañt fimples , & qui le font même. toutes fur certains individus, . Ces feuilles font étroites . &: var l'effet des pétiotes fofit courts qni s ©P P qe

à

lorigues que le calice , & pendantes. Cette plante

& lc; Tab: 33. Natrix Plinii herbariorum. Lob:

chargées d'un duvet vifqueux: Ses feuilles font .

oblongues , fouvent un peu étroites , & dentées

font fimples. Les pédoncules portent chacun une

fleur jaune aflez grande , ftriée de pourpre en fon

dans les lieux incultes, en France & dans d'au-

16. BUGRANE vifqueufe , Ononis viftofa. Lin.

in": 73;

latifolia glutinofa À.

de huit à neuf pouces; .

chargée: de poils glutineux. Elles font chargées