



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Flora atlantica :sive historia plantarum quae in Atlante,
agro tunetano et algeriensi crescunt**

Parisiis, L.G. Desgranges, [1798-1799?]

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/323>

v. 2: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/7542>

Page(s): Text, Title Page, Page 146, Page 147

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 29 September 2024 5:46 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1738949i00007542.pdf>

This page intentionally left blank.

FLORA ATLANTICA,

S I V E

HISTORIA PLANTARUM,

QUÆ IN ATLANTE, AGRO TUNETANO

ET ALGERIENSI CRESCUNT.

AUCTORE RENATO DESFONTAINES, Instituti
nationalis Scientiarum Galliæ socio, necnon in Museo
Historiæ naturalis Parisiensi Botanices professore.

TOMUS SECUNDUS.

acc. to Soc Biol
Nat. Hist. Soc. 1: 148,
dates of fascicles of Vol
2 as follows:

-
- Livr. 5 - pp. 1-80, pls. 121-150, Oct. 1798.
6 - 81 - "Diadelphica Decandra" pls. 151-180, Nov. 1798.
7 - "Diadelphica Decandra" - "Polyadelphica Decandra", pls. 181-210, Feb. 1799.
8 - "Polyadelphica Decandra" - p. ? pls. 211-240, June 1799.
9 - pages ? - 458, pls. 241-261, July 1799.

PARISIIS,

Apud editorem L. G. DESGRANGES, in vico Haute-Feuille, N^o 14.

Typis C. PANCKOUCKE.

ANNO SEXTO REIPUBLICÆ GALLICÆ.

ONONIS ALOPECUROIDES.

ONONIS foliis simplicibus, apice rotundatis; stipulis maximis; spicis foliosis, villosis; calycibus corolla longioribus.

Ononis spicis foliosis; foliis simplicibus, ovatis, obtusis, dilatatis. *Lin. Spec.* 1008.

Anonis sicula alopecuroides. *T. Inst.* 408.

Anonis spicata seu alopecuroides lusitanica non spinosa. *Rai. Suppl.* 468.

CAULIS ramosus, erectus, villosus, sæpe 3 decimetr. et ultra. Folia simplicia, magna, elliptica, nervosa, denticulata, apice rotundata. Stipulæ maximæ, foliaceæ, dentatæ, quandoque integerrimæ, bilobæ, ovatæ, in petiolum utrinque decurrentes. Flores terminales, racemosi, subsessiles. Racemus teres, crassus, erectus, 5—7 centimetr. Bracteæ oblongæ, dentatæ, petiolatæ, villosæ. Calyx quinquepartitus; laciniis flore multo longioribus, lanceolato-subulatis, ciliatis. Corolla fere Trifolii pratensis *Lin.*, violacea. Legumen ovatum, parvum, calyce duplo triplove brevius, apice villosum, subcompressum, di aut trispermum.

HABITAT in arvis Algeriæ. ☉

ONONIS HISPIDA. Tab. 189.

ONONIS foliolis ternis, obovatis, serratis; floribus solitariis, subsessilibus, racemosis; calycibus pilosis; laciniis calycinis lanceolatis, corollam æquantibus.

CAULIS herbaceus, ramosus, erectus, 3 decimetr. et ultra, paniculatus, pilosus; pilis patentibus. Folia ternata, petiolata; foliolis subvillosis, serratis, obovatis aut ellipticis, apice rotundatis. Stipulæ parvæ, ovatæ, bifidæ, acutæ, denticulatæ. Flores racemosi, subsessiles, solitarii. Racemus 5—10 centimetr. Calyx profunde quinquepartitus, magnus, pilosus; pilis longis, patentibus. Lacinie angusto-lanceolatæ, acutæ, striatæ, corollam adæquantes. Corolla rosea, magnitudine *O. arvensis* *Lin.* Legumen compressum, læve, ovatum, calyce dimidio brevius.

HABITAT in arvis.

ONONIS LAXIFLORA. Tab. 190.

ONONIS foliis ternatis; pedicellis folio longioribus; calycibus corollam æquantibus; leguminibus elongatis, exsertis, nutantibus.

CAULIS erectus, ramosus, villosus, 2 — 3 decimetr. Folia petiolata, ternata, vix pubescentia; foliolis obovatis, denticulatis, 7—9 millimetr. latis, 9—11 longis. Stipulae suborbiculatae, dentatae, parvae, petiolo breviores. Flores laxi, axillares, solitarii, pedicellati; pedicellis filiformibus, folio longioribus, pubescentibus, 2 centimetr. longis. Calyx profunde quinquepartitus; laciniis lanceolato-subulatis, ciliatis. Corolla caerulea, longitudine calycis. Legumen nutans, exsertum, lineare, inflatum, villosum, 9—11 millimetr. longum, polyspermum.

HABITAT in collibus incultis Algeriae. ☉

ONONIS PENDULA. Tab. 191.

ONONIS foliolis ternis, obovatis, apice rotundatis; floribus racemosis, cernuis; pedicellis strictis; leguminibus villosis, calyce longioribus.

CAULIS villosus, erectus, 3 decimetr., ramosus. Folia petiolata, ternata; foliolis obovatis, glabris, superne dentatis, apice rotundatis, 9 millimetr. latis, 11 — 13 longis. Stipulae parvae, adpressae, ovatae, obtusae, denticulatae. Flores racemosi, pedicellati. Racemus 5 — 7 centimetr. Bractea foliacea, oblonga, simplices, apice dentatae. Pedicelli mutici, stricti, apice deflexi, bractea triplo breviores. Calyx quinquepartitus, villosus; laciniis lanceolato-subulatis, corolla paululum brevioribus. Corolla pallide caerulea. Flores absolutam fructificationem penduli. Legumen oblongum, lineare, acuminatum, inflatum, villosum, calyce paulo longius, polyspermum.

HABITAT prope Mascar in arvis. ☉

ONONIS VILLOSISSIMA. Tab. 192.

ONONIS villosissima, viscosa; foliis ternatis; floribus racemosis, confertis, sessilibus; corollis leguminibusque calyce brevioribus.

PLANTA villosissima et viscosa. Caulis herbaceus, ramosus, diffusus, 2—3 decimetr. Folia ternata, petiolata; foliolis obovatis aut ovato-rotundatis, denticulatis. Stipulae parvae, rotundatae, dentatae. Flores axillares, racemosi, conferti, solitarii, sessiles aut subsessiles. Calyx quinquepartitus; laciniis lanceolatis. Corolla parva, rosea, calyce brevior. Legumen ovatum, obtusum, compressum, villosum, calyce tectum, subdispermum.

HABITAT in arvis Algeriae.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Text, Title Page]

|
|
|

FLORA ATLANTICA;
Sirvr

HISTORIA. PLANTARUM,

QUA IN ATLA

TE, AGRO TUNETANO

ET ALGERIENSI :CRESCUNT

AuctORE RENATO DESFONTAINES , Instituti
nationalis Scientiarum Galliz: socio, necnon in Musco
Historic naturalis Parisiensi Botanices professore.

T.OMUS SECUNDUS, «^

Typs C. PANCKOUCK E.

ANNO SEXTO REIPUBLIGE GALLIQA.

[Begin Page: Page 146]

146 DIADELPHIA DECANDRIA

ONONIS ALOPECUROIDES.

3 süpulis maximis ; spicis

Oxosis foliis simplicibus , apice rotund
foliosis , villosis ; calycibus corolla longioribus.

Ononis. spicis foliosis ; foliis simplicibus , ovatis , obtusis , dilatadis. Lin. Spec. 1008.

Anonis sicula alopecuroides. T. Init. 408.

Anonis spicata seu alopecuroides lusitanica non spinosa. Rai.

CAULIS ramosus , erectus , villosus , sepe 3 decimetr. et ulira. Folia simplicia , magna , elliptica , nervosa , denticulata , apice rotundata. Stipulae maximas , foliaceae , dentatae , quandoque integerrima , bilobae , ovatae , in petiolum utrinque decurrentes. Flores terminales , racemosi , subsessiles. Racemus teres , crassus , erectus , 5—7 centimetris. Bracteae oblongae , dentatae , petiolatae , villosae. Calyx quinquepartitus ; laciniis flore multo longioribus , lanceolato-subulatis cilia Lin., violacea. Legumen ovatum , parvum , calyce duplo triplo brevius apice villosum , subcompressum , di aut trispermum. HABITAT in arvis Algerie. ()

ONONIS HISPIDA. Tab. 189.

Oonis foliolis ternis , obovatis , serratis. floribus solitariis , subsessilibus , racemosis ; calycibus pilosis ; laciniis calycinis lanceolatis , corollam irquantibus.

is. Corolla fere Trifolii pratensis

CAULIS herbaceus , ramosus , erectus , 3 decimetr. et ultra , paniculatus pilosus ; pilis patentibus. Folia ternata , petiolata ; foliolis subvillosis , serratis , obovatis aut ellipticis , apice rotundatis. Stipulae: parvae , ovatae

, acute , denticulatae. Flores racemosi , subsessiles ; solitarii , Racemus 10 centimetris. Calyx profunde quinquepartitus , magnus , pilosus ; pilis longis , patentibus. Lacinae: angustolanceolatae , acutae , striatae , corollam aequantes. Corolla rosea , magnitudine O. arvensis Lin. Legumen compressum , leve , ovatum , calyce dimidio brevius.

HARBUAT in arvis.

ONONIS LAXIFLORA. Tab. 199.

Oxonis foliis ternatis ; pedicellis folio longioribus ; calycibus corollam irquantibus ; leguminibus elongatis , exsertis , nutantibus.

[Begin Page: Page 147]

S.
imis 5g
dai, i.

,
pnis

g.
b

DIADELPHIA DECANDRIA. 147

CAULIS erectus, ramosus, villosus, 2 — 3 decimetr. Folia petiolata, ternata, vix pubescentia; foliolis obovatis, denticulatis, 7—9 millimetr. latis, 9—11 longis. Stipule: suborbiculate, dentate, parve, petiolo breviores. Flores laxi, axillares, solitarii, pedicellati; pedicellis filiformibus, folio longioribus, pubescentibus, 2 centimetr. longis. Calyx profunde quinquepartitus; laciniis lanceolato-subulatis, ciliatis. Corolla cocculea, longitudine calycis. Legumen nutans, exsertum, lineare, inflatum, villosum, 9—11 millimetr. longum, polyspermum.

HABITAT in collibus incultis Algeriz. C)

ONONIS PENDULA. Tab. 1g.

floribus racemosis,
us villosis, calyce longioribus.

Oxors foliolis teris, obovatis, ap
cernuis; pedicellis stictis; legu

CAULIS villosus, erectus, 3 decimetr., ramosus. Folia petiolata, ternata foliolis obovatis, glabris, superne dentatis, apice rotundatis, 9 millimetr. latis, 11 — 13 longis. Stipule parva, adpresse, ova, obtuse, denticulata. Flores racemosi, pedicellati. Racemus 5— 7 centimetr. Bractea foliacea: oblonga, simplices, apice dentatae. Pedicelli muco, stricti, apice deflexi, bractea breviores. Calyx quinquepartitus, villosus; laciniis lanceolato-subulatis, corollae paululum brevioribus. Corolla pallide cocculea. Flores absolute fructificatione penduli. Legumen oblongum, lineare, acuminatum, inflatum, villosum, . calyce paulo longius, polyspermum.

HABITAT prope Mascar in arvis.
ONONIS VILLOSISIMA. Tab. 192.

Oxosis villosissima, viscosa ; foliis ternatis ; floribus racemosis, confertis, sessilibus; corollis leguminibusque calyce brevioribus.

PLANTA. villosissima et viscosa. Caulis herbaceus , ramosus , diffusus , 2— decimetr. Folia ternata , petiolata ; foliolis obovatis aut ovato-rotundatis, denticulatis. Stipula: parve , rotundata , dentata. Flores axillares , sacemosi, conferti , solitarii, sessiles aut subsessiles. Calyx quinquepartitus; laciniis lanceolatis: Corolla parva , rosea, calyce brevior. Legumen ovatum, obtusum, compressum, villosum , calyce tectum, subdispermum.

HABITAT in arvis Algeria.