



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Compendio della flora italiana; ossia, Manuale per la determinazione delle piante che trovansi selvatiche od inselvaticite nell'Italia e nelle isole adiacenti**

Torino, E. Loescher, 1882

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/9995>

**Item:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/40236>

Page(s): Text, Page 157

Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Generated 29 September 2024 7:06 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1738964i00040236.pdf>

This page intentionally left blank.

581.94  
Arc 2015

COMPENDIO

DELLA

FLORA ITALIANA

OSSIA

MANUALE

PER LA DETERMINAZIONE DELLE PIANTE  
CHE TROVANSI SELVATICHE OD INSELVATICHITE NELL'ITALIA  
E NELLE ISOLE ADIACENTI

per

GIOVANNI ARCANGELI

Prof. ordinario di Botanica nella R. Università di Pisa.



TORINO

ERMANN LOESCHER

1882

—  
Roma e Firenze presso la stessa Casa.

956. **O. reclináta** L., sp. 1011. P. peloso-viscosa (10-15 c.): f. gracili, eretti od ascendenti: fg. trifogliate, con ff. piccole obovato-cuneate o lineari ottusissime acutamente seghettate: fi. piccoli, ascellari, rosei: corolle = *al calice o più corte*, volte in basso: legumi *pendenti*: sm. tuberoso-scabri. ①. *Arene e colli della reg. mar., nella Penisola e nelle isole. Apr. Giu.*

β. *mínor* Moris: fg. più strette, cuneiformi: fi. più corti delle fg. fiorali: corolla più corta del calice: legume più corto. O. mollis Savi. *Con la specie.*

§§§ Fiori rosei o bianchi, sessili o brevemente pedunculati.

957. **O. spinósa** L., sp. 716. F. prostrato od eretto, vellutato da un lato, *spinoso* (2-6 d.): fg. ovali-bislunghe, ottuse, dentate, le inf. ternate: fi. ascellari a coppie o solitari, rosei: lacinie del calice lanceolato-lineari, acuminate: legume ovale, eretto, *uguale al calice o più lungo*: sm. tuberoso-scabri. 2. *Comunissima in tutta la Penisola, dal mare fino alla reg. subm., e nelle isole. Giu. Sett. Volg. Bonaga, Bulimacola, Bulinaca, Stancabue, Brugnecola.*

β. *antiquórum* (L.): p. glandolosa, vellutata o glabrescente: fi. più piccoli. A S. Lucia presso Bastia in Corsica.

958. **O. procúrrens** Wallr., sched. 381. F. prostrato, spesso *radicante alla base*, stolonifero, con rami spinosi nell'apice od inermi: fg. inf. ternate, con ff. quasi tonde od ellittiche, glandolose: fi. *solitari, ascellari*, radi: legumi eretti, ovati, più corti del calice. 2. *Luoghi arenosi, campi, ecc., nell'Italia sup. e media. Lug.*

959. **O. hircína** Jacq. h. vind. I, 40. F. eretti od ascendenti, inermi, pelosi (2-6 d.): fg. trifogliate, con ff. ovali o bislunghe seghettate peloso-glandolose: fi. rosei, *a coppie* ascellari, in *dense spighe* nell'apice dei rami: legumi glandoloso-pelosi, eretti, ovati, più corti del calice. 2. *Nei prati, ecc., nella Penisola. O. arvensis L.*

960. **O. Masquilliéri** Bert., hort. bon. pl. nov., fasc. II, 11. F. ascendente, peloso: fg. ternate, bislunghe, seghettate, le sup. acute: fi. rosei, in *racemo terminale pedunculato* pubescente-glandoloso: brattee ovate, più brevi del calice: calici più lunghi del legume, con lacinie lanceolato-lineari. 2. *Presso Bologna nel M. Sabbione ed al Sasso di Simone. Lug.*

961 **O. mitíssima** L., sp. 717. F. eretti, pelosi (2-5 d.): fg. sup. semplici, le altre ternate, a ff. piccole ellittiche od obovate acutamente seghettate: fi. rosei, in racemo terminale denso a forma di spiga: brattee stipolari *ovate, ventricose, scariose*, le sup. afile: lacinie del calice ovate, acuminate: legumi quasi uguali al calice. ①. *Nelle arene e nei campi argillosi presso al mare, nella Penisola, in Sicilia ed in Corsica. Apr. Mag.*

962. **O. serráta** Forsk, fl. aeg.-ar., 130. F. erbacei, eretti, ascendenti o diffusi (1-2 d.): fg. picciolate, trifogliate, con ff. obovate acutamente ed inegualmente seghettate: fi. rosei, in racemi terminali a forma di spiga, con le fg. fiorali sup. *ridotte a brattee*: segmenti del calice lineari-acuminati: corolla e legume quasi tondo uguali al calice: sm. lisci. ①. *Nelle arene marittime della costa occ., da Ostia in giù e nelle isole. Apr. Giu. O. diffusa Ten.*

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Text]

Di  
5 fans!

DE di  
è

fe . Università di Pisa.

ani

“ERMANN LOESCHER\_

[Begin Page: Page 157]

Oxownis.] XXIX. LEGUMINOSAE. 157

956. *O. reclinata* L., sp. 1011. P. peloso-viscosa (10-15 c.): f. gracili, eretti od ascendenti: fe. trifogliate, con ff. piccole obovato-cuneate o lineari ottusissime acutamente seghettate: fi. piccoli, ascellari, rosei: corolle = al calice 0 più corte, volte in basso: legumi pendenti: sm. tuberoso-scabri. ®. Arene e colli della reg. mar., nella Penisola e nelle isole. Apr. Giu.

*B. minor* Moris: fg. più strette, cuneiformi: fi. più corti delle fe. fiorali: corolla più corta del calice: legume più corto. *O. mollis* Sav. Con la specie.

SSS Fiori rosei o bianchi, sessili o brevemente pedunculati.

957. *O. spinosa* L., sp. 716. F. prostrato od eretto, vellutato da un lato, spinoso (2-6 d.): fg. ovali-bislunghe, ottuse, dentate, le inf. ternate: fi. ascellari a coppie o solitari, rosei: lacinie del calice lanceolato-lineari, acuminate: legume ovale, eretto, uguale al calice 0 più lungo: sm. tuberoso-scabri. 2. Comummissima in tutta la Penisola, dal mare fino alla reg. subm., e nelle isole. Giu. Sett. Volg. Bonaga, Bulimacola, Bulinaca, Stancabue, Brugnecola.

*B. antiquorum* (L.): p. glandolosa, vellutata o glabrescente: fi. più piccoli. A S. Lucia presso Bastia in Corsica.

958. *O. procurrans* Wallr., sched. 381. F. prostrato, spesso radicante alla base, stolonifero, con rami spinosi nell'apice od inerme: fg. inf. ternate, con ff. quasi tonde od ellittiche, glandolose: fi. solitari, ascellari, radi: legumi eretti, ovati, più corti del calice. 2. Luoghi arenosi, campi, ecc., nell'Italia sup. e media. Lug.

959. *O. hircina* Jacq. h. vind. I, 40. F. eretti od ascendenti, inerme, pelosi (2-6 d.): fe. trifogliate, con ff. ovali o bislunghe seghettate peloso-

glandolose: fi. rosei, a coppie ascellari, in dense spighe nell'apice dei rami: legumi glandoloso-pelosi, eretti, ovati, più corti del calice. 2. Neè prati, ecc., nella Penisola. *O. arvensis* L.

960. *O. Masquilliéri* Bert., hort. bon. pl. nov., fase. II, 11. F. ascendente, peloso: fg. ternate, bislunghe, seghettate, le sup. acute: fi. rosei, in racemo terminale peduncolato pubescente-glandoloso: brattee ovate, più brevi del calice: calici più lunghi del legume, con lacinie lanceolato-lineari. 2. Presso Bologna nel M. Sabbione ed al Sasso di Simone. Lug.

961 *O. mitissima* L., sp. 717. F. eretti, pelosi (2-5 d.): fo. sup. semplici, le altre ternate, a ff. piccole ellittiche od obovate acutamente seghettate: fi. rosei, in racemo terminale denso a forma di spiga: brattee stipolari ovate, ventricose, scariose, le sup. afille: lacinie del calice ovate, acuminate: legumi quasi uguali al calice. ©©. Nelle arene e nei campi argillosi presso al mare, nella Penisola, in Sicilia ed in Corsica. Apr. Mag.

962. *O. serrata* Forsk, fl. aeg.-ar., 130. F. erbacei, eretti, ascendenti o diffusi (1-2 d.): fe. picciolate, trifogliate, con ff. obovate acutamente ed inegualmente seghettate: fi. rosei, in racemi terminali a forma di spiga, con le fg. florali sup. ridotte a brattee: segmenti del calice lineari-acuminati: corolla e legume quasi tondo uguali al calice: sm. lisci. ©. Nelle arene marittime della costa occ., da Ostia in giù e nelle isole. Apr. Giu. *O. diffusa* Ten.