

NOTES  
SUR QUELQUES PLANTES

CRITIQUES, RARES OU NOUVELLES,

ET

ADDITIONS A LA FLORE DES ENVIRONS DE PARIS.

PAR

**E. COSSON,**

D. M. P.



PARIS.

LIBRAIRIE DE VICTOR MASSON

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 1;

Même maison, chez C. Michelsen, à Leipzig.

R<sup>o</sup> 12336

se rapproche de l'*O. rosea* (Durieu ap. Duchart. rev. bot. II. 437.); mais elle en diffère par les stipules membraneuses égalant environ le pétiole avec lequel elles sont longuement soudées, et non pas foliacées n'en égalant environ que la moitié de la longueur, par le calice à divisions linéaires-sétacées dépassant la corolle et non pas lancéolées acuminées plus courtes que la corolle.

**ONONIS TOURNEFORTII**, Nob. ann. sc. nat. — *Anonis maritima*, *Gadensis*, non *spinosa*, floribus in foliorum alis, Tournef. ! inst. rei herb. 408. in herb. mus. Par.

*Planta annua*, pallide luteo-virens, pubescenti-glandulosa. Caules sæpius plures, decumbentes, 3-5 decimetr. longi, valde fistulosi, ramosi. *Folia petiolata, pleraque trifoliolata*, foliolis obovato-cuneatis superne argute inæqualiterque dentatis nervosis; suprema unifoliolata vel petiolo efoliolato inter stipulas in aristam producto; stipulæ ovatæ vel ovato-lanceolatæ acutæ subfoliaceæ, petiolo breviores eique basi adnatæ, dentatæ vel subintegræ. *Flores minuti, ochroleuci, axillares, solitarii*, in spicas terminales densas basi foliatis dispositi, *breviter pedicellati, pedicello in axilla folii floralis sessile* tubo calycis paulo brevior. *Calyx campanulatus, laciniis lanceolatis, sub-5-nerviis, corollam subæquantibus*. Legumen ovatum, calycem paulo superans, 4-6-spermum. *Semina ovato-subrotunda ad hilum emarginata, sub lente punctato-scabra*. — Florentem fructiferamque legit 17<sup>a</sup> die Maii E. Bourgeau.

In arenosis maritimis agri Gaditani, loco dicto *Santa Cathalina* prope *Puerto Santa Maria* (E. Bourgeau, pl. Esp. 1849, n. 193); olim juxta *Cadix*, a cl. Tournefort inventa (herb. Tournef. ap. herb. Mus. Par.), et a cl. Dufour reperta (herb. Mus. Par. sub. n. 1045). Circa *Tanger* (herb. Desf. ap. herb. Webb, sub nomine *O. variegata*, L.).

Cette espèce est très distincte de l'*O. variegata*, L. (avec lequel elle a été confondue) par les feuilles la plupart trifoliolées pétiolées, et non pas la plupart unifoliolées sessiles, par les fleurs en épis plus compactes, par le calice environ de la longueur de la corolle et non pas environ une fois plus court, par le légume ovale dépassant peu le calice, par les graines ponctuées-scabres et non pas lisses.

**ONONIS LEUCOTRICHA**, Nob. ann. sc. nat.

*Planta annua* vel biennis, *radice fusiformi*, in omnibus partibus corolla excepta *longe molliterque villosa-hirsuta*, pube canescente parce glandulosa. Caules sæpius plures, erecti vel ascendentes, 2-4 decimetr. longi, à basi ramosi. *Folia petiolata, unifoliolata*, foliolo obovato superne argute dentato apice sæpe retuso; *stipulæ foliaceæ, ovatæ, amplæ, dentatæ, petiolo inferne adnatæ*; petiolis foliorum emarcidorum persistentibus. *Flores majusculi, roseo-purpurascens, axillares solitarii in spicas terminales densas abbreviatis sub anthesi elongatis congesti, pedicellati, pedicello in axilla folii floralis sessile* tubo calycis longior. *Calyx tubulosus, laciniis linearibus angustis tubo multoties longioribus, corollam subæquantibus*. Legumen oblongum, *calyce brevius, 4-6-spermum*. *Semina subglobosa, lævia* — Florebat 18<sup>a</sup> die Julii.