



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive,
Enumeratio contracta ordinum generum specierumque
plantarum huc usque cognitarum, juxta methodi naturalis,
normas digesta**

Parisii, Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz, 1824-73

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/286>

v.3 (1828): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/7152>

Page(s): Text, Title Page, Page 371

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 5 April 2024 11:36 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1688005i00007152.pdf>

This page intentionally left blank.

**PRODROMUS
SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS.**

PARS III.

PRODROMUS
SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS,
SIVE
ENUMERATIO CONTRACTA
ORDINUM, GENERUM, SPECIERUMQUE PLANTARUM
HUC USQUE COGNITARUM, JUXTA METHODI NATURALIS NORMAS
DIGESTA;

AUCTORE AUG. PYRAMO DE CANDOLLE.

PARS TERTIA
Sistens Calyciflorarum Ordines XXVI.

PARISIIS,

Sumptibus Sociorum TREUTTEL ET WÜRTZ,
rue de Bourbon, n° 17.

VENITQUE IN EORUMDEM BIBLIOPOLIIS
ARGENTORATI ET LONDINI.

~~~~~

M. DCCC. XXVIII.

- tis, calycis lobis longè aristato-mucronatis. (1) in Arabiâ, Ægypto. Corrigiola albella Forsk. descr. 207. Illecebrum Arabicum Lin. mant. 51. Pers. enh. 1. p. 261. Bracteæ argenteæ apice aristato-mucronatae. (v. s.)
6. P. POLYGONIFOLIA (DC. fl. fr. ed. 3. v. 3. p. 403.) caule humifuso ramoso, foliis oblongo-linearibus glabriusculis acutis non mucronatis, floribus axillaribus subcongestis, calycibus brevissime mucronatis. 2/4 in Delphinatu, Hispaniâ, ins. Balearicis etc. Illecebrum polygonifolium Vill. in Schrad. journ. 1801. p. 410. t. 4. Ill. verticillatum & Willd. sp. 1. p. 1205. Illecebrum alpinum Vill. dauph. 1. p. 296. Vix à sequente differt nisi foliis angustioribus. (v. s.)
7. P. ARGENTEA (Lam. fl. fr. 3. p. 230.) caule humifuso ramoso, foliis ovatis glabriusculis subacutis, floribus axillaribus et terminalibus congestis, calycibus breviter mucronatis. 2/4 in Europæ australis siccis apricis. DC. fl. fr. ed. 3. v. 3. p. 404. Illecebrum Paronychia Linn. spec. 299. — Barr. ic. 726. P. argentea et P. Hispanica dict. enc. 5. p. 24. Variat foliis rotundioribus glabris. Bracteæ albæ nitidæ acuminatae. An Illecebrum italicum et narbonense Vill. in Schrad. journ. 1801. p. 411? (v. s. et v.)
- P. mauritanica*, foliis latioribus, capitulis magis distantibus. 2/4 in Mani-  
taniâ (Broussonet), in archipelago. Illecebrum Mauritanicum Willd. rel.  
ex Schult. syst. 5. p. 516. (v. s. comm. à cl. Broussonet.)
8. P. CAPITATA (Lam. l. c. p. 229.) caulis suberectis, foliis carinato-oblon-  
gis apice ciliatis pubescentibus, bracteis acuminatis, florum capitulis termina-  
libus, cal. lobis oblongis muticis. 2/4 in aridis Europæ australis. DC. fl. fr.  
ed. 3. v. 3. p. 404. P. rigida Mœnch meth. 315. Illecebrum capitatum Lin.  
sp. 1. p. 299. An I. Lugdunense Vill. in Schrad. journ. 1801. t. 4? (v. v. et s.)
9. P. SERPYLLIFOLIA (DC. dict. enc. 5. p. 24. fl. fr. ed. 3. v. 3. p. 404.) caulis prostrato-repentibus nodosis ramosis, foliis obovatis planis subcarnosis mar-  
gine-ciliatis, floribus terminalibus, bracteis acuminatis occultatis, calycibus  
muticis. 2/4 in aridis Europæ australis et orientalis. Illecebrum serpyllifolium  
Vill. in Schrad. journ. 1801. t. 4. (v. v. et s.)
- P. herniarioides* (Pourr. chl. narb. 321.) foliis subcordatis. Huc relata ex  
Vill.
10. P. NIVEA (DC. dict. enc. 5. p. 25.) caulis suberectis ramosissimis, foliis oblongis acutis planiusculis pubescenti-villosis, bracteis maximis brevè acu-  
minatis, capitulis terminalibus, calycibus muticis.—In aridis Hispaniæ, Occi-  
taniæ?, Italiæ, Orientis. Barr. icon. t. 687 et 725.? Illecebrum nivem Pers.  
ench. 1. p. 261. Illecebrum cephalotes Bieb. fl. taur. suppl. 169. An Illece-  
brum maritimum Vill. l. c.? An P. Arragonica Schult. syst. 5. p. 520? (v. s.)
11. P. ARETIODAES, caulis fructiculosus adscendentibus ramosissimis, ramu-  
lis hirsutis, foliis sericeo-pubescentibus ovali-oblongis obtusis stipulas non  
superantibus, bracteis obtusis, capitulis terminalibus. 3/4 2/4 in agro Valentino  
Hispaniæ. Illecebrum aretioides Pourr. ined. ex L. Duf! in litt. (v. s. comm. à  
cl. L. Dufour.)
12. P. CANARIENSIS (Juss. mem. mus. 1. p. 389.) caule fruticoso erecto apice  
ramoso, ramulis hirsutie brevi subincanis, foliis ovatis acutis pubescenti-  
subhirsutis, cymâ paniculatâ ramosissimâ laxâ, bracteis flores non occultan-  
tibus apice aristato-mucronatis. 3/4 in ins. Teneriffæ. Habitus Polycarpærarum  
Canariensium, sed ovarium 1-spermum. Illecebrum Canariense Linn suppl.  
161. An Polycarpæa?
13. P. SMITHII (Choisy! mss. in herb. DC.) caule fruticoso erecto ramoso, foliis  
lineari-oblongis acuminatis enerviis ramulisque glabriusculis, cymis pauciflo-  
ris laxiusculis, calycibus aristato-mucronatis. 3/4 in ins. Canariis Christ.  
Smith. Ovarium videtur 1-spermum sed ex minutie partium floris et absentia  
fructûs observatio dubia; interea differre videtur à Polycarpæa carnosâ et  
P. Smithii Link, ob folia opposita, inferiora non spathulata ut in P. car-  
nosâ, nec apice obtusa ut in P. Smithii. (v. s.)
14. P. HERNIARIOIDES (Nutt. gen. am. 1. p. 159.) herbacea humifusa conferta

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Text]

PRODROMUS  
SYSTEMATIS NATURALIS  
REGNI VEGETABILIS.  
PARS I<sup>II</sup>I.

[Begin Page: Title Page]

PRODROMUS.  
SYSTEMATIS NATURALIS  
REGNI VEGETABILIS,  
SIVE  
ENUMERATIO CONTRACTA  
ORDINUM, GENERUM, SPECIERUMQUE PLANTARUM  
HUC USQUE COGNITARUM, JUXTA METHODI NATURALIS NORMAS  
DIGESTA ;  
Aucronz AUG. PYRAMO DE CANDOLLE.  
PARS TERTIA  
Sistens Calyciflorarum Ordines XXVI.  
PARISIIS,  
Sumptibus Sociorum TREUTTEL zv WÜRTZ,  
rue de Bourbon, n° 17.  
VENITQUE IN EO AUMDEM BIBLIOPOLIIS  
ARGENTORATI zz» LONDINI.  
AV SALA AZAR  
M. DCCC. XXVII.  
' L

[Begin Page: Page 371]

PARONYCHIA. PAR ONYCHIEJX. 37 I  
tis , calycis lobis longé aristato-mucronatis. (T) in Arabiá, JEgypto. Corrigiola  
albella Forsk. deser. 207. Illecebrum Arabicum Lin. mant. 51. Pers. enh. rz.  
p. 261r. Bractecw argentea apice aristato-mucronatze. (v. s.)  
6. P. rorycowirorra (DC. fl. fr. ed. 3. v. 3. p. 403.) caule humifuso ramoso ,  
foliis oblongo-linearib: s glabriusculis acutis non mucronatis, floribus axilla-  
ribus subcongestis, caly ibus brevissime mucronatis. 2f, in Delphinatu , His-  
panià, ins. Balearicis etc. Illecebrum polygonifolium Vill. in Schrad. journ.  
1801. p. 410. t. 4. III. verticillatum £. Willd. sp. 1. p. 1205. Illecebrum alpinam  
Vill. dauph. i. p. 296. Vix à sequente differt nisi foliis angustioribus. (v. s.)  
7. P. AncENTEA (Lam. fl. fr. 3. p. 230.) caule humifuso ramoso, foliis ovatis  
glabriusculis subacutis, floribus axillaris et terminalibus congestis , caly-  
cibus breviter mucronatis. 2 in Europzs australis siccis apricis. DC. fl. fr.  
ed. 3. v. 3. p. 404. Illecebrum: Paronychia Linn. spec. 299. — Darr. ic. 726.  
P. argentea et P. Hispanica dict. enc. 5. p. 24. Variat foliis rotundioribus  
glabris. Bractec albz nitide acuminata. An Illecebrum italicum et narbonense  
Vill. in Schrad. journ. x80r. p. 411? (v. s. et v.)  
É. mauritanica , foliis latioribus, capitulis magis distantibus. 2L in Mauri-

taniá (Broussonet) , in archipelago. Illecebrum Mauritanicum Willd, vel.  
ex Schult. syst. 5. p. 516. (v. s. comm. à cl. Broussonet.)  
S. P. carrrATA (Lam. I. c. p. 229.) caulibus suberectis, foliis carinato-oblone-  
gis apice ciliatis pubescentibus. bracteis acuminatis, florum capitulis termina-  
libus, cal. loBis oblongis muticis. 2f in aridis Europz australis. DC, fl. fr.  
ed. 3. v. 3. p. 404. P. rigida Moench meth. 315. Illecebrum capitatum Lin.  
sp. 1. p. 299. Àn I. Lugdunense Vill. in Schrad. jouru. 180r. t. 4? (v. v, et s.)  
9. P. seurvrLirForia (DC. dict. enc. 5. p. 24. fl. fr. ed. 3. v. 3. p- 404.) caulibus  
prostrato-repentibus nodosis ramosis, foliis obovatis planis subcarnosis mar-  
gine-ciliatis , floribus terminalibus, bracteis acuminatis occultatis, calycibus  
muticis. 2 in aridis Europ: australis et orientalis. Illecebrum serpyllifolium  
Vill. in Schrad. journ. 180r. t. 4. (v. v. ets.)  
A. herniarioides (Pourr. chl. narb. 321.) foliis subcordatis. Huc relata ex  
Vill.  
10. P. miveA (DC. dict. enc. ^ p. 25.) caulibus suberectis ramosissimis, foliis  
oblongis acutis planiusculis pubesceni-villosis ] bracteis maximis brevé acu-  
minatis, capitulis terminalibus, calycibus muticis.—In aridis Hispanize, Occi-  
tania? , Italie, Orientis. Darr. icon. t. 687 et 725.? Illecebrum nivem Pers,  
ench. 1. p. 361. Illecebrum cephalotes Bieb. fl. taur. suppl. 169. An Illece-  
brum maritimum Vill. I. c.? An P. Arragonica Schult. syst. 5. p. 520? (v. s.)  
11. P. AnxTIOIDES, caulibus fructiculosis adscendentibus ramosissimis, ramu-  
lis hirsutis, folijs sericeo-pubescentibus ovali-oblongis obtusis stipulas non  
superantibus, bracteis obtusis, capitulis terminalibus. 7j p in agro Valentino  
Hispaniz. Illecebrum aretioides Pourr. ined. ex L. Duf' in litt. (v. s. comm. à  
cl. L. Dufour.)  
12. P. CaxanrENsis (Juss. mem. mus. x. p. 389.) caule fruticoso erecto àpice  
ramoso, ramulis hirsutie brevi subincauis, foliis ovatis aentis pubescenti-  
subhirsutis, cymá paniculatà ramosissimá laxá, bracteis flores non occultan-  
tibus apice aristato-rucronatis, jj in ins. Teneriffz. Habitus Polycarpearum  
Canariensium , sed ovarium r-spermum. Illecebrum Canariense Liun suppl.  
161. An Polycarpa?  
13. P. Sura (Choisy! mss. in herb. DC.) caule fruticoso erecto ramoso , foliis  
lineari-oblongis acaminatis enerviis ramulisque glabriusculis, cymis pauciflo-  
ris laxiuscnlis, calycibus aristato-mucronatis. j in ins, Canariis Christ.  
Smith. Ovariam videtur r-spermum sed ex minuue partium floris et absentia  
fructus observatio dubia; interea differre videtur à Polycarpz carnosá et  
P. Smithii Link, ob folia opposita, inferiora non spathulata ut in P. car-  
nosá, nec apice obtusa ut in P. Smithii. (v. s.)  
z4. P. HEANIABIOIDES (Nutt, gen. am. i. p. 159.) herbacea humifusa conferta