

*Forskålea angustifolia* Retz. Die gemeinste der Canarischen Endemen der untersten Region, verwandt mit mehreren ebenfalls endemischen Arten der Cap Verden und mit *F. tenacissima* des afrik.-arab. Wüstengebiets.

*Traganum Moquinii* Webb. Östl. Can. Verw. mit *T. nudatum* N.-Afrikas.

*Chenolea canariensis* Moq. Östl. Canaren und Mogador.

*Beta Webbiana* Moq. Can. *patellaris* Moq. Can. Madeira und bei Mogador und *procumbens* Chr. Sm. Can. C. Verd. Verw. mit *B. vulgaris*.

*Plantago Webbii* Barn. Alpenpflanze von Tenerife und Palma. Verw. mit *P. Cynops*.

*Statice pectinata* Ait. Can. und in zwei ganz ähnlichen Species (*St. Braunii* Bolle und *Brunneri* Webb) auf den C. Verden. *St. Humboldtii* Bolle Palma. *St. papillata* Ait. Graciosa, Alegranza und Fuertaventura.

Alle verwandt mit den kleinern europäischen Arten.

*Jasminum Barrelieri* Webb Can. Gelbblühende Art.

*Orobanche Berthelotii* Webb Can.

*Phelipaea gratiosa* Webb Can.

*Linaria sagittata* Poir. Can. und Mogador.

6 Spec. *Scrophularia*, alle an den westeuropäischen (asturischen) Typus der *S. Scorodonia* L. sich annähernd, der auch auf Madeira und den Bergen der Can. vorkommt.

*Nepeta Teydeana* Webb des Teydegebirgs.

*Sideritis Gomeraea* Bolle, eine nach dem Autor zur Sect. *Empedoclea* der