

C I N E R A R I A.

1. CINERARIA *humifusa*.

C. pedunculis unifloris, foliis reniformibus subangulatis, petiolis apice auriculatis nudisve.

Aster flore luteo, foliis cymbalariae. *Rai. hist.* 3. 158.

Aster africanus minimus monanthos luteus, foliolis angulosis minimis aceris formâ vel cymbalariae. *Rai. hist.* 3. 161.

HABITAT ad Promontorium bonæ spei. *Masson.* 5

Affinis C. cymbalarifoliæ, sed flores lutei calycesque villoso-scabriuscui, dum flores purpurei calycesque glabri in C. cymbararifoliâ.

2. CINERARIA *viscosa*.

C. pedunculis unifloris, foliis pinnatifido-lobatis acutis viscidis carnulosis.

HABITAT ad Promontorium bonæ spei.

Forte varietas tantum C. humifusæ.

3. CINERARIA *scapiflora*.

C. pedunculis longissimis unifloris, foliis ovatis glabris duplicato-dentatis.

HABITAT ad Promontorium bonæ spei. *Masson.*

Folia duplicato-dentata vel sublobata.

4. CINERARIA *mitellafolia*.

C. pedunculis subbisfloris, foliis cordatis glabris laxe dentatis, petiolis simplicibus.

Senecio cordifolius corollis radiantibus, foliis cordatis dentatis, calycibus simplicissimis. *Linn. suppl.* 372.

HABITAT ad Promontorium bonæ spei.

5. CINERARIA *lanata*. Tab. 30.

C. pedunculis unifloris, foliis cordato-subrotundis septangulis subtus lanuginosis.

HABITAT in Nivariâ. *Masson.* 5

Flores purpurei.

6. CINERARIA *populifolia*.

C. floribus corymbosis, foliis cordatis subangulatis subtus tomentosis, petiolis apice multijugo-appendiculatis.

Cacalia appendiculata fruticosa tomentosa, foliis cordatis ovatis acutis angulatis subtus tomentosis, petiolis appendiculate foliosis. *Linn. suppl.* 352.

