

409. *S. ECHINATUS*, caule herbaceo erecto, foliis petiolo longo supra medium lobulis foliaceis 4-6 appendiculato rariu nudo, limbo basi cordato-reniformi aut ovato angulato dentato subtus cano-tomentoso supra glabro, corymbo composite polycephalo, pedicellis subnudis, invol. squamis 10-12 dorso praesertim ad basin squamulis piliformibus hirto, ligulis 10-12. ♀ in Teneriffæ præcipitiis maritimis (Mass. Brouss.! Webb et Berth.!). *Cacalia echinata* Linn. f. suppl. 353. *Cineraria ramentosa* L'Hér. sert. angl. 26. Vent. malm. p. et t. 101. Variat caule glabro aut plus minus hispido imo hispidissimo, petiolis appendiculatis aut nudis, sed semper involucro ramentaceo facile distinctus. Discus flavus, ligulae purpurascentes aut albidæ. (v. s.)

§. 2. BETHENCOURTHII. — *Bethencourtia Choisy* in *Buch. can. non St.-Hil.* (1)

Invol. 5-phylum oblongum. Flores 7-8, ligulati 2-3, tubulosi 4-5. — Caules fruticosi. Folia longe cuneata apice incisa glabra.

410. *S. PALMENSIS*, fruticosus glaber, foliis oblongo-cuneiformibus apice grossè inciso-serratis, corymbis compositis polycephalibus, pedicellis bracteolas paucas subulatas sub capitulo gerentibus, invol. cylindraceo! 5-phyllo paucifloro, ligulis 2-3, tubulis 4-5. ♂ in regione occid. insulae Palmæ archipel. Canar. inter rupes vulgo dicitur *Turgaite*. *Cineraria Palmensis* Nees hor. phys. ber. p. 115. t. 22. *Senecio Palmensis* Link in *Buch. can.* 148. *Bethencourtia Palmensis* Choisy! herb. DC. et in *Buch. l. c.* Flores flavi. *Stigma Senecionis*. Habitat proprius. (v. s.)

Ser. X. CARIBÆI (2).

Nempè in insulis Caribæis spontanei.

411. *S. LUCIDUS*, glaber basi fruticosus, ramis striato-suleatis, foliis ovali-lanceolatis acuminatis calloso-serratis pinnatinerviis, infer. petiolatis, super. sessilibus, corymbo subpaniculato, pedicellis striato-angulatis, ultimis bracteolatis, invol. cylindrico 6-phyllo, flor. disci 6-7, ligulis 3-4. ♂ in Caribæis insulis (Plum.) Martinicâ (Fahlb.), Guadalupâ (Badier!), ins. Trinitatis (Sieb.! n. 179). *Cineraria lucida* Swartz fl. ind. occ. 1360. *Gynoxis lucida* Less. syn. 390 — Plum. ed Burm. t. 154. — Folia 6 poll. longa, 2 poll. lata. Pappus sor-dide albidus. Styli rami cono brevi vix acuto terminati. Certè differt à *Sen. Swartzii* quocunq; conjunxit cl. Sprengel. (v. s.)

412. *S. SWARTZII*, glaber fruticosus, ramis teretibus, foliis petiolatis oblongis utrinque acutis subdenticulatis vix nervosis, corymbo subpaniculato composite, pedunculis striatis compressiusculis, bracteolis subulatis secùs pedicellos, invol. 8-10-phyllo cylindrico subcalyculato, cor. disci 6-8, ligulis 3-4. ♂ in montibus excelsis Jamaicæ. *Cineraria glabra* Swartz! prod. p. 111. *Cineraria glabrata* Swartz fl. ind. occ. 3. p. 1354 non Ledeb. *Gynoxys glabrata* Less. syn. 390. Styli rami revoluti apice terminati cono brevi *Cynoxybus veris* multò brevior et minus acutus. (v. s.)

413. *S. LACINIATUS*, fruticosus glaber, ramis striatis, foliis petiolatis oblongis acutis basi attenuatis subruncinato-laciñati, lobis acutis denticulatis, corymbris pedunculatis compositis compressis, invol. 12-14-phyllo calyculato, fl. disci 20-24, ligulis 6 ovatis, recept. alveolato. ♂ in montibus Jamaicæ. Cine-

(1) Genus *Choisyanum* fortè admittendum, sed tunc ad hoc referendi sunt *Seneciones* Madagascarienses 2 (*longiscapus* et *riparius*), Orientales 2 (*Othonnae* et *Belangerianus*), Indicæ 11 (*graciliflorus*, *tetranthus*, *alatus*, *rufinervis*, *araneosus*,