

404. *S. CRUENTUS*, caule herbaceo erecto pilosiusculo, foliis petiolo alato basi auriculato limbo cordato angulato denticulato utrinque pilosiusculo subtus purpureo, capitulis corymbosis, pedicellis subbracteolatis, invol. squamis 15-16, lignis 10-12. ♂ in Teneriffæ sylvaticis. *Cineraria cruenta* Masson in L'Hér. sert. angl. 26. Vent. malm. p. et t. 99. *Cineraria aurita* Andr. bot. reg. t. 24 non L'Hér. *Tussilago rubra* Riedl.! herb. mus. Par. et ideo Link in Buch. can. 149. Flores purpurei corymbi subnebulosi. Folia petiolis alatis et paginâ infer. sanguineâ distinctissima, radicalia aptera vix ad basin petioli subdilatata. (v. s. sp. et v. c.)

*S. lacteus*, petiolis apice lobulis foliaceis appendiculatis aut nudis basi alato-subdilatatis, limbis fol. cordatis angulatis dentatis subtus cano-tomentosis pubescentibusve membranaceis, corymbo composito paniculato, invol. squamis glaberrimis apice recurvis. Patr. ign. Fortè hortensis et hybrida progenies *S. cruenti* et *populifolii*! *Cineraria lactea* Jacq. f. eclog. t. 105. *Ciner. hybrida* Willd. enum. 893? non Spreng. *Cin. cruenta* var. *alba* hort. Par. 1818. Flores albi, antheris flavis. (v. v. c.)

405. *S. MULTIFLORUS*, caule herbaceo erecto glabro, petiolis longis basi dilatato-auriculatis apice lobulis parcis et minutis appendiculatis, limbis fol. cordato-reniformibus subangulatis vix dentatis supra glabriusculis subtus araneoso-tomentosis, summis cordatis petiolo brevi alato, corymbo composito paniculato, pedicellis nudis, invol. squamis 12-15 glabris, ligulis 9-10. ♂ in ins. Canarien-sium collibus (Mass. Webb et Berth.! fl. can. ic.). *Cineraria multiflora* L'Hér. sert. angl. 26. Affinis hinc *S. malvæfolio*, illinc cruento. Flores purpurei. Petioli 3 pollic., limbi fol. diam. 3 pollic. An fortè C. elatior Bouché in Link enum. h. ber. z. p. 333. huc referenda? (v. s. in h. Webb et Berth.!)

406. *S. PAPYRACEUS*, caule herbaceo erecto, foliis infer. petiolo longo hispido exappendiculato, limbo cordato suborbiculato multiangulato dentato membranaceo utrinque glabro, summis ovali-ant linear-i-oblongis denticulatis vix sub-petiolatis, corymbo composito polycephalo umbellato, pedicellis nudiusculis, invol. squamis circ. 12 glabris, ligulis 7-8. ♂ in ins. Canariis leg. cl. Webb et Berthelot (fl. can. ic.). *Discus atro-purpureus*, ligulæ pallidè purpurascentes. Petioli fol. radic. 3-4-pollic., limbi diam. 2-3-pollic. (v. s.)

407. *S. MALVÆFOLIUS*, caule herbaceo erecto glabro, petiolis longis nudis glabris, foliis subcordatis suborbiculatis, superioribus sublobulatis caloso-dentatis supra glabriusculis subtus canesceni-subtomentosis, capitulis corymbosis glabris, pedicellis minutè bracteolatis, invol. 1-serialibus 12-15-phyllis. ♂ in insulâ Azoricâ Sancti-Michaelis legit Masson et fortè ex auct. in Canariis, sed nunquam ex his insulis authenticè allatam vidi. *Cineraria malvæfolia* L'Hér. sert. angl. 26. *Cin. bracteata* C. Smith ex Link in Buch. can. 148? ex Sprengel. Capitula purpurea minora quam omnium affinim. Petioli 3 poll. Limbi fol. diam. ferè 3 pollic. (v. s.)

408. *S. TUSSILAGINIS* (Lindl. bot. reg. t. 1550), caule herbaceo, petiolis basi cordato-auriculatis cæterùm nudis, foliis reniformi-cordatis multangulis dentatis supra pilosiusculis subtus cano-tomentosis, capitulis laxè corymboso-paniculatis, pedicellis parce bracteolatis, invol. squamis circ. 12 glaberrimis striatis, ligulis circ. 12 oblongo-linearibus. (1) in insulâ Teneriffâ (Mass. Brouss.! Webb et Berth.!). *Cineraria Tussilaginis* L'Hér. sert. angl. 26. Variat caule petiolisque glabris aut piloso-hirtellis, fol. paginâ supra pilis raris parvis aut numerosis hirtellâ. Fol. radicalia longius petiolata, petiolo basi vix dilatato. Flores purpurei. Ligulæ 6-9 lin. longæ. (v. s.)