



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Caroli Linnæi ... Systema vegetabilium

Gottingae, sumtibus Librariae Dieterichianae, 1825-1828

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/822>

v.2 (1825): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/15253>

Page(s): Illustration, Title Page, Text, Page 265, Page 266, Page 267, Page 268, Page 269

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library
Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 7 April 2024 9:28 AM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1688369i00015253.pdf>

This page intentionally left blank.

Karl A. Geyer.

CAROLI LINNÆI,

EQUITIS STELLAE POLARIS, ARCHIATRI REGII, PROF. MED. ET
REI HERB. IN UNIVERS. UPSAL.

SYSTEMA

VEGETABILIIUM.

EDITIO DECIMA SEXTA,

CURANTE

CURTIO SPRENGEL,

EQUITE STELLAE POLARIS ET AQUILAE RUBRAE, PROF. MED.
ET REI HERB. IN UNIVERS. HAL.

VOLUMEN II.

CLASSIS 6—15.

GOTTINGAE,

SUMTIBUS LIBRARIAE DIETERICHIANAE.

1825.

*Linnaean
Q1491
C616
1825
v.2*

S Y S T E M A
V E G E T A B I L I U M.

V O L U M E N . S E C U N D U M.

CLASSIS IX.

E N N E A N D R I A.

MONOGYNIA.

1521. LAURUS.

* *Foliis perennantibus.*

nobilis

1. L. foliis oblongo-lanceolatis subundulatis venosis, floribus axillaribus umbellato-racemosis folio brevioribus, calycibus 4fidis. *Europ. austr.*

Culilaban

2. L. foliis oppositis ovato-acuminatis 3plinerviis subtus glaucescentibus, floribus corymbosis, calycibus 6partitis. *Inf. Molucc. Cochinchina.* (L. Caryophyllus Lour.)

Beilgota
Hamilt.

3. L. foliis oblongis utrinque attenuatis 3plinerviis subtus glaucis venoso-reticulatis, ramis 4gonis, panicula trichotoma, floribus ternis. *Ind. orient.* (L. Malabathrica Roxb.?)

coriacea Sw.

4. L. foliis ovato-oblongis acuminatis subcoriaceis reticulato-venosis nitidis, racemis axillaribus compositis folio brevioribus. *Jamaica, Hispaniola.*

salicifolia Sw.

5. L. foliis alternis lato-lanceolatis acutis nervoso-venosis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Ind. occid.*

Catesbiana Mx.

6. L. foliis ovato-lanceolatis nitidis, panicula terminali, fructu ovato. *Georgia, Florida.*

carolinensis
Gatesb.

7. L. foliis ovali-lanceolatis subtus glaucescentibus subpubescentibus, glomerulis florum pedunculatis axillaribus. *Carolina, Louisiana.* (L. axillaris Lam.)

thyrsiflora Poir.

8. L. foliis ovato-oblongis acuminatis nervoso-venosis, panicula elongata terminali, pedicellis 1floris. *Madagascar.*

punctata *

9. L. foliis alternis oblongis utrinque attenuatis nitidis venosis margine pellucido-punctatis, paniculis axillaribus folia aequantibus. *Brazil. Sello.*

** *Foliis annuis.*

Benzoin

10. L. foliis oblongis utrinque attenuatis venosis 3nerviis, pedunculis aggregatis 1floris. *Amer. bor.*

- pendula* Sw. 11. L. foliis oblongis utrinque attenuatis nervoso-venosis subtus glaucescentibus, paniculis axillaribus folia aequantibus, fructibus pendulis. *Jamaica.*
- divaricata* Poir. 12. L. foliis oblongis acuminatis nervosis subtus reticulatis, panicula laxa terminali, pedunculis divaricatis. *Cayenn.*
- *** *Dubiae.*
- Chloroxylon* 13. L. foliis subellipticis utrinque attenuatis rigidis 3nerviis, pedunculis solitariis 1floris, calycibus 5fidis 5andris 3gynis. *Jamaica.*
- martinicensis* Jacq. 14. L. foliis oblongis acuminatis coriaceis, racemis paniculatis, pedunculis calycibusque tomentosis. *Martinic.*
- glauca* Thunb. 15. L. foliis lanceolatis acuminatis nervosis subtus glaucis, ramis tuberculatis, pedunculis brevissimis sub-1floris. *Japon.*
- pedunculata* Thunb. 16. L. foliis oppositis oblongis acutis nervosis, pedunculis sparsis solitariis 1floris. *Japon.*
- lucida* Thunb. 17. L. foliis ovato-oblongis acutis obsolete ferratis lucidis, floribus solitariis subsessilibus. *Japon.*
- umbellata* Thb. 18. L. foliis ovatis obtusis ferratis nervosis, ramulis umbellatis, floribus racemosis. *Japon.*
- polyadelpa* Lour. 19. L. foliis lanceolatis integerrimis coriaceis sub-3nerviis, floribus corymbosis, staminibus 3adelpis. *Cochinchina.*
- Soncaurium* Hamilt. 20. L. foliis oblongis utrinque attenuatis subtriplynerviis subtus venosis. *Emodi montes.*
- Tazia* Hamilt. 21. L. foliis lanceolatis acuminatis 3plinerviis, ramis 4angulis. *Ind. or.*
- sailiana* Hamilt. 22. L. foliis oblongis utrinque attenuatis quintuplynerviis subtus glaucis. *Emodi montes.*
- floribunda* Sw. 23. L. foliis annuis ovato-lanceolatis venosis, floribus racemoso-paniculatis. *Jamaica.*

1522. TETRANTHERA Jacq.

* *Foliis perennantibus.*

- laurifolia* Jacq. 1. T. foliis obovato-oblongis integerrimis, floribus involucreatis subumbellatis, pedicellis filamentisque pilosis. *Japon.* (Tomex tetranthera W. Litsea chinensis Lam. Sebifera glutinosa Lour.)
- japonica* * 2. T. foliis oblongis obtusis venosis subtus tomentosis, floribus glomeratis pedunculatis villosis. *Japon.* (Tomex japonica Thunb. Litsea Pers.)
- citrifolia* * 3. T. foliis ovatis obtusis venosis nitidis, floribus involucreatis subumbellatis indivisis. *Ora Coronandel. Nov. Holl.* (T. apetala Roxb. Litsea citrifolia Juss.)
- trinervia* * 4. T. foliis oblongis acuminatis 3plinerviis subtus glaucis, floribus involucreatis congestis brevissime

- pedunculatis. *Ind. or. China. Cochinchina.* (Laurus Myrrha Lour. Litsea zeylanica Nees.)
- sebifera* * 5. T. foliis oblongis obtusis enerviis subtus pubescentibus, floribus ♂ capitatis involucretis, ♀ paniculatis, pedunculis lanatis divaricatis 1floris. *Ind. or.* (Tomex W. Laurus involucreta Retz.)
- ferruginea* R. Br. 6. T. foliis oblongis acutis 1nerviis subtus ramisque ferrugineo - tomentosis, floribus umbellatis involucretis. *Cochinchina. Nov. Holl.* (Hexanthus umbellatus Lour.)
- dealbata* R. Br. 7. T. foliis oblongis acuminatis 3plinerviis subtus albidis, petiolis ramisque tomentosis, floribus glomeratis involucretis sessilibus. *Nov. Holl.*
- terfa* * 8. T. foliis lanceolatis attenuatis venosis supra nitidis subtus subtomentosis, floribus ♂ capitatis (staminibus polyadelphis), ♀ solitariis axillaribus brevissime pedunculatis. *Inf. Molucc.* (Glabraria terfa L.)
- glaucescens* * 9. T. foliis oblongo - lanceolatis acuminatis reticulato - venosis subtus glaucis, floribus involucretis ♂ corymbosis, ♀ paucis. *Mexico.* (Litsea glaucescens ♀ et Cervantesii ♂ Kunth.)
- † *Berterii* * 10. T. foliis oblongo - lanceolatis elongatis utrinque attenuatis venosis opacis glaberrimis, floribus subcymoso - glomeratis brevissime pedunculatis axillaribus polygamis. *Amer. austr. Bertero.*
- ** *Foliis annuis.*
- aestivalis* * 11. T. foliis lanceolatis obtusiusculis glabris basi subtus barbatis, ramis divaricatis, floribus umbellatis polygamis. *Carolina.* (Laurus aestivalis L., geniculata Walt. Mx.)
- Diospyros* * 12. T. foliis oblongis subtus venosis pubescentibus, ramis virgatis, gemmis pedunculisque villosis, floribus glomerato - umbellatis. *Carolina.* (Laurus Diospyroides Mx. Diospyrus Pers., melissae-folia Walt.)
- pilosa* * 13. T. foliis oblongis pilosis enerviis, floribus racemosis polygamis. *Cochinchina.* (Laurus pilosa Lour.)
- albida* * 14. T. foliis integris sub - 3lobisque glaberrimis venosis, floribus dioecis. *Carolina.* (Evosmus albida Nutt.)

1523. PERSEA Gärtn.

* *Foliis perennantibus,*

† *nervosis.*

- Cinnamomum* * 1. P. foliis elliptico - oblongis obtusiusculis 3plinerviis ramulisque glaberrimis, floribus paniculato - corymbosis axillaribus folia superantibus. *Ceylon. Cochinchina.* (Laurus L.)
- Cassia* * 2. P. foliis oblongo - lanceolatis obtusiusculis 3plinerviis, petiolis ramulisque sericeo - tomentosis,

- floribus racemoso-paniculatis folia aequantibus.
Ind. or. Cochinchina. (Laurus L.)
- dulcis* * 3. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis triplinerviis, petiolis ramulisque glabris, corymbis 3fidis panicifloris. *Java. Ind. orient.* (Laurus dulcis Roxb. L. Burmanni Nees excl. syn. Burm.)
- Tamala* * 4. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis triplinerviis, panicula terminali. *Emodi montes.* (Laurus Hamilt.)
- Camfora* * 5. P. foliis ovato-oblongis acuminatis triplinerviis, paniculis axillaribus multifloris folio brevioribus. *Japon. China.* (Laurus L.)
- montana* * 6. P. foliis ovato-acuminatis triplinerviis rigidis nitidis, floribus paniculatis pubescentibus. *Ind. occid.* (Laurus montana Sw., paniculata Poir.)
- curvifolia* * 7. P. foliis oblongis acuminatis incurvis reflexis obsolete 3nerviis, floribus racemosis. *Cochinchina.* (Laurus Lour.)
- †† venosis.
- indica* * 8. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis glaberrimis opacis coriaceis, corymbis pedunculatis axillaribus, calycibus incanis. *Ins. Canar. Japon.* (Laurus L.)
- foetens* * 9. P. foliis oblongis acutis glabris, axillis venarum subtus villosis, paniculis axillaribus elongatis. *Ins. Canar.* (Laurus Ait. L. maderensis Lam., Till Poir.)
- canariensis* * 10. P. foliis oblongis utrinque attenuatis nitidis, pedunculis axillaribus elongatis 3-4floris. *Ins. Canar.* (Laurus W. L. reticulata et Teneriffae Poir.)
- gratissima*
Gärtn. 11. P. foliis elliptico-oblongis obtusiusculis subtus pubescentibus glaucescentibus, corymbis axillaribus, calycibus tomentosis, fructu pyriformi. *Amer. aequinoct.* (Laurus Persea L.)
- exaltata* * 12. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis nitidis, racemis corymbosis axillaribus, fructu ovali. *Jamaica. Amer. austr.* (Laurus exaltata Sw. Ocotea turbacensis Kunth.)
- alpigena* * 13. P. foliis oblongis obtusis subrevolutis coriaceis subtus venosis glaucescentibus, racemis erectis folio longioribus. *Jamaica. Amer. austr.* (Laurus Sw. Ocotea obtusifolia Kunth.)
- Leucoxydon* * 14. P. foliis oblongo-lanceolatis elongatis acuminatis glaberrimis supra nitidis, pedunculis axillaribus abbreviatis subracemosis fructiferis cum calyce incrassatis verrucosis. *Ind. occid.* (Laurus Sw. Persea cinnamomifolia et macropoda Kunth. varr.?)
- Borbonia* * 15. P. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis nitidis, racemis axillaribus abbreviatis, calycibus fructiferis subbaccatis. *Amer. bor. et austr.* (Laurus L. Ocotea Cymbarum Kunth.)
- sanguinea* * 16. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis subtus venoso-reticulatis, racemis erectis folio brevioribus.

ribus, calycibus turbinatis. *Surinam*. (Nectandra sanguinea Rottb.)

- Surinamensis* * 17. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis utrinque glaberrimis, ramis patentissimis, paniculis filiformibus elongatis, floribus glomeratis. *Surinam. Brasil*. (Laurus Sw., Nectandra bijuga Rottb.)
- cupularis* * 18. P. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis supra nitidis, paniculis sessilibus terminalibus, calycibus turbinatis. *Ins. Mascaren.* (Laurus cupularis Lam.)
- globosa* * 19. P. foliis ovatis glabris subtus glaucescentibus, cymis pedunculatis axillaribus, fructibus globosis. *Ind. occid.* (Laurus Lam.)
- caustica* * 20. P. foliis oblongis utrinque attenuatis subtus reticulato-rugosis, pedunculis 1floris, fructibus subreniformibus. *Chili*. (Laurus caustica Molin.)
- Cubeba* * 21. P. foliis oblongo-lanceolatis subeveniis nitidis, floribus congestis pedunculatis, fructibus globosis minimis. *Cochinchina*. (Laurus Lour.)
- crassifolia* * 22. P. foliis ovato-oblongis supra nitidis subtus canescentibus, fructibus ovatis pubescentibus. *Cayenn.* Richard. (Laurus Poir.)
- retroflexa* * 23. P. foliis lanceolatis nitidis glabris, floribus racemosis axillaribus, calycibus fructiferis durefcentibus reflexis. *Hispaniol.* Poiteau. (Laurus Poir.)
- laevigata*
Kunth. 24. P. foliis ovalibus utrinque glabris subtus reticulatis, paniculis axillaribus folio brevioribus, calycibus incano-pubescentibus. *Nov. Granat.*
- Mutisi* Humb. 25. P. foliis ellipticis coriaceis subtus glauco-pruinosis, corymbis axillaribus, calycibus patentissimis ferrugineis, fructibus globosis. *Nov. Granat.*
- sericea* Kunth. 26. P. foliis ellipticis subtus ferrugineo-sericeis, pedunculis axillaribus sub-6floris, calycibus sericeis, fructibus ovatis. *Peru*.
- ferruginea*
Kunth. 27. P. foliis ovatis acutis supra nitidis subtus ferrugineo-tomentosis, corymbis axillaribus dichotomis. *Peru*.
- Pichurim* * 28. P. foliis oblongis utrinque acuminatis coriaceis supra nitidis subtus reticulatis pilosiusculis, paniculis axillaribus folio brevioribus, fructibus oblongis. *Amer. austr.* (Ocotea Kunth.)
- Boso* * 29. P. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris subtus reticulato-venosis, floribus paniculatis axillaribus pubescentibus, calycibus acutis. *Ad fl. Amazonum.* (Ocotea Kunth.)
- umbrosa* * 30. P. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris subtus reticulato-venosis, floribus paniculatis axillaribus pubescentibus, calycibus obtusis. *Ad fl. Amazonum.* (Ocotea Kunth.)
- psychotrioides* * 31. P. foliis lanceolatis acuminatis subtus incano-pubescentibus, paniculis folio brevioribus, calyce pubescente. *Mexico*. (Ocotea Kunth.)
- argentea* * 32. P. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis subtus argenteo-sericeis, paniculis folio brevioribus, calyce pubescente. *Nov. Granat.* (Ocotea sericea Kunth.)

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Illustration, Title Page]

CAROLI LINNAEI, .
sunt STELLATA ROLANDI, datura REGII, PROF. oro. n ET
RED HERB. IN UNIVERS, UPSAL.
sid
tri tir en
p AQUILAE p

[Begin Page: Text]

SYSTEMA
VEGETABILIU M MPMÉM.
" Dc: aber
VOLUMEN SECUNDUM,
Linn. Syft. Veg. Fol. II. : A

[Begin Page: Page 265]

j Puntigta iloris. JMadaascar.

XC

Uc ep apa rs 1X.

EGONAEANDRIA .

L)

*

MONOGYNIA.

1521. Launvs.

* Folüs perennantibus.

1. L. foliis oblongo - lanceolatis fubundulatis veno-
e floribus axillaribus pre apii racemolis fo-
io brevioribus, calycibus is. Europ. aufir, :

Culilaban 2. L. foliis oppofitis eMe esum natis Solierviis "

fubtus glaucescentibus, floribus corymbosis, caly-
cibus Opartitis. .Jnf. Molucc. Cochinchina, —(L.
Bei Caryophyllus Lour.) x

"e 3. L. foliis oblongis utrinque attenuatis Splinerviis
fubtus glaucis venofó - reticulatis, ramis 4gonis,
panicula trichotoma, floribus ternis. Jnd. orient.

* (L. Malabathrica Roxb.?) ;

"t0 Sw, — 4, p, foliis ovato - oblongis acuminatis fubcoria-
ceis reticulato - venosis nitidis, racemis axillari-
s compofitis folio brevioribus. Jarznaia, Hi-
falicifal, fpaniola.,

Sw. 5; L. foliis alternis lato lanceolatis acutis nervo-
lo-venolis, racemis axillaribus folio brevioribus.
Cates); Ind, occid.

Mx. 6. L, TI 69M Jameeriatitis nitidis, panicula ter- ,
minali, fructu ovato. eorgia, Florida. pu

aes 7. L. foliis ovali-lanceolatis fubtus glaucescenti- .

bus fibpube[centibus, glomerulis florum pedunculatis axillaribus. Carolina. Louifiana. (L.' axil-yr fg. Po; laris Lam.) :

: 9ir.8. L. foliis ovato - oblongis acuminatis nervofo - .Venofis, panicula elongata terminali, pedicellis

. 9. L. foliis alternis oblongis utrinque attenuatis ni- (... , fidis venofis margine pellucido - punctatis, pani- — culis axillaribus folia aequantibus. Zra/i. Sello.

X** Foliis annuis. :

10. L. foliis oblongis utrinque attenuatis venofis ener- Vilis, pedunculis aggregatis 1floris. mer. bor,

[Begin Page: Page 266]

266. ENNEANDRIA. "Moxoovsta. Laurus. | pendula Sw. — 11. L. foliie oblongis itrindus atisbuii) nervolo- A : venofis fubtus glaucefcentibus, paniculis ribus folia seguantibus fructu pe

- Jamaica. :

divaricata Poir. 12. L.,. foliis oblangis aeuminatis vervile fubtus reticulatis, panicula laxa terminali, pedum & divaricatis. |Cayenn..

-

*** Dubrae.

Chloroxylon |. 18. Li folis [ubellipticis utrinque attenuatis ii - dis Bnerviis, pedunculis folitariis 1floris,.

bus 5fidis Sandris S8gynis. Jamaica. — martinicenfis — 15. L. foliis oblongis acuminatis coriaceis, raten .» Jacq. paniculatis , pedunculis calycibusque tom Mar tinic, 4

aec 15. L; foliis lanceolatis acuminatis nervofis ibt de

At glaucis, ramis tuberculatis, pedunculis b

Reo mis fub-ffloris. Japon.

- pedunculata — 16. L. foliis oppolitibus oblongis acutis nervolis, I*

"Thunb. »dunculis fparfis folitariis 1floris. Japon. [2

duca beocung 17. L. foliis ovato- oblongis acutis 'obfolete

POETE dea lucidis, floribus folitariis fubfeffilibus. *

umbeliata/Thb. 4d. 6Ü foliis ovatis obtufis ferratis nervolis, 49^

lis umbellatis, floribus racemofis. Japones :

- polyadelphe 19. L. ioliis lanceolatis integerrimis eria de

i agens , .Snerviis, floribus corymbolis, ftaminibus

phis. Cochinchia. ' ; de d

ium ^90. L. foliis oblongis utrinque attennatis m |

. Hamilt. — . nerviis fubtus venofis. Jnodi montes. :

Tazia MUND. 21. L. foliis lanceolatis acuminatis Splinerviiti "**

rue mon oc c amid d'angel iw. CP, of. tapli

amilt.22. L. foliis oblongis utrinque attennatis qui:

ui ox ES nerviis fubtus glaucis. Ernodi montes. — [

299. E foliis annuis ovato-]anceolatis ven

acemofo - - paniculatis. Jamaica.

idi 1 T. foliis obovato - ohlo: is inre errimis\$ for"

à; sei bus involucratibus foeni sb. 6 rricells fe

v e pilofis. Japon. (Tomex tetrant

SUM A 5; Vue chinenfis Lam. Sebifera glutin

japonica* ^ \$T. TUE oblongis obtufis venofis fubtus '- x
OEEOPS t£ofis, floribus glomeratis pedunculatis. yi 7:0 P
Vier RS Japon. . (Tomex japonica Thunb. Litfea Pe di
Ee \$. T. foliis ovatis obtulis venofis EY :
eei AR fubumbellatis iidiivi ir
man ove. Hol. ^ o
- p Juff) OA E :
"s oblongis acuminatis Splinetvi "T
c—— j gioribus involucratis 'congeltis in diii
* mat e 5,
"e

[Begin Page: Page 267]

"e
x ja
,
ENNEANDRIA. MoNocYNIA. 'etranthera. 267
4 x
peduneulatis. Znd. or. €hína. Cochínthina. (Law-
rus Myrrha Lour. Litfea zeylanica Nees,) -
fdifera * 5. T. foliis oblongis obtufis enerviis fubtus pubel-
centibus, floribus ;? capitatis involucratis, O pa» |
niculatis, pedunculis lanatis divaricatis lfloris,
Ind.or. (Tomex W. Laurus involucrata Retz.)
ferruginea 6. T. foliis oblongis acutis 1nerviis fubtus ramisque
K. Br. ferrugineo - tomentofis, floribus umbellatis in-
volucratis. Cochinchina. Noe, Holl. (Hexanthus ——
umbellatus Lour.) .
drallataR, Br. 7. T. foliis oblongis acuminatis Splinerviis fubtus
: albidis, petiolis ramisque tomentofis, floribus
glomeratis involucratis feffilibus. Noo. Hol.
terfa * 8. T. foliis lanceolatis attenuatis venofis fupra niti-
—— dis fubtus fubtomentofis, floribüs g capitatis
. (taminibus polyadelphis), 9 folitariis axillaribus
breviffime pedunculatis. Znf. Molucc. (Glabraria
i terfa L.) per
Sawefcens* — 9, 7T. foliis oblongo -lanceolatis acuminatis reticu-
.. lato- venolis fubtus glaucis, floribus involucratis
; d" corymbofis, O paucis. Jexico. (Lit[æa glau-
"S CAN cefcens 9 et Cervantefii gj? Kunth.) ESO
()leri* — 10.'T foliis oblongo lanceolatis elongatis utrinque
attenuatis venolis opacis glabermimis, floribus
[ubcymofo - glomeratis breviffime pedunculatis
axillaribus polygamis. 4er. aufir. Bertero, ^
pu
4i. T. foliis lanceolatis obtufiusculis glabris bafi
fubtus barbatis, ramis divaricatis, floribus um-
bellatis polygamis, Carolina. (Laurus aeftivalis
aeflivalis
** Folis annuis. — ! *
X7
Diospyros * L., geniculata Walt. Mx.) SRI
12. T. foliis oblongis fubtus venolis pubefcentibus,
ramis virgatis, gemmis pedunculisque villofis,

. "floribus glomerato- umbellatis. Carolina. (Laurus Diospyroides Mx. Diospyrus Perl. , melilfae- E Ps (ijo. — —. folia Walt.) vid. Lu

; 13..T. foliis oblongis pilofis enerviis, floribus rate. polygamis. Cochinchina. (Laurus pilafa -- Gbida * - : : wrrd MERE

Mol 14. T. foliis integris fub -3lohisque glaberrimis ve- - ies nofis, floribus dioecis. Carolina. (Evofmus al« bida Nutt.) t * e e :

dem : : t PR

\$c9:9-4425- PrensgA Górin..-

* Faliis perennantibus, 5

t nereofís, ides ve s ER

liis elliptico - oblongis obtufiusculis Spliner- ——

mulisque glaberrimis; foribus pesieu ge.

nbofis axillaribus folia fuperantibus, Ce. "s

Inchina. (Laurus L.) T .

Uc. o meris, petiolis ramulisque fericeo - tomentólis,

E e is ; E E - ^

2. P. foliis oblongo-lanceolatis obiufiusculis Spli-

[Begin Page: Page 268]

'
EL " "

.\$68 ENNEANDHIA. MowocyvsNiA. Perfea.

: floribus racemofo - paniculatis folia aequantie

IM Ind. or... Cochiehine. | (Laurus L.) BUSCA

"dulis* |. 8. P. foliis oblongo - lanceolatis acutis triplinems

E petiolis ramulisque glabris, corymbis Stidis p

cifloris. .Jaea. 14 orient, (Laurus dulcis A

. Lh. Burmanni Nees excl fyn. Buxm.) |...

Zamala * 4. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis iriplint* |

EN ; viis, panicula terminali. Zmodi montes.

. rus Hamilt.) cn ONES

Camfora * 5. P. foliis ovato - oblongis acuminatis triplintr?

aut . panieulis axillaribus multifloris folio brevi?

"

nost Japon. Chia. (Laurus L.) 33

Tnontana * 6..P. foliis ovato - acunrinatis triplinerviis rifd |

T nitidis, floribus paniculatis pubefcentibus. ,

octíd. (Laurus montana Sw., paniculata Pos.

7, P. foliis oblongis acuminatis incurvis reflex!

folete Snerviis, floribus racemofis.

(Laurus Lour.)

YT eenojfis. :

8. P. foliis oblongo - lanceolatis acutis glaber |

opacis coriaceis, corymbis peduncnlatis axil

bus, calycibus incanis. Inf. Camar. Japon.

V. e ae. illis venter"?

- . 9. P. foliis oblongis acutis glabris, axillis vena

lutilus villofis, paniculis axillaribus el

Inf. Canar. (Laurüs Ait. L. madere

THLPotj)—t— 1

canarienfis* ^ 10, P. foliis oblongis utrinque attenuatis "p.

S SEA pedunculis axillaribus elongatis 3- ors s
 ^ .Cmnr. (Laurus W. L. reticulata et Ten |
 Poir.) exu 1 :s [ubtsi
 11. P. foliis elliptico - oblongis obtufiuscnlis ari
 - pubefcentibus glanucefcentibus, corymbis 3575 —
 — tibus, "calycibus tomentofis, fructu py
 Amer. aequinoct. (Laurus Perfea L.) , niti |
 liis ovato - lanceolatis acuminatis E^,
 .corymbofis axillaribus, fructu ovili ir
 H 4mér. aufir. (Laurus exaltata SW. |
 tea turbacensis Kunth.) Sh ac
 .. 18, F. foliis oblongis obtufis fubrevolutis " |
 — - fubtus venofis glaucefcentibus, racem!s "^
 — folio longioribus. Jarnaica. rner. aujtr- (
 &
 D
 (7 o 4. rus Sw. Ocotea obtusifolia Kunth.) .- acl
 | cylon * . 14. P. foliis oblongo -lanceolatis elongatis * as
 xs |. - matis glaberrimis fupra nitidis, pedunculis
 Jaribus abbreviatis fubracemofis fructifer y
 .. ealyce increffatis verrucofis. Jnd. occid. (Ku
 Sw. DAE ciunamomifolia et macropoda AU
 varr.£ j "ien
 L. Ocotea Cymbarum Kunth.) |.
 * foliis ovato - lanceolatis acuminatis,
 enofo - eticulatis, racemis erectis folio P

[Begin Page: Page 269]

A ENNEANDRIA. Mowocwvia. Perfea. 269
 : ribus, calycibus turbinatis. Surinam. (Nectan-
 " dra fanguinea Rottb.) ;
 Jurinamenfis * 17. P. foliis ovato - lanceolatis acuminatis utrinqua
 glaberrimis; ramis patentiffimis, paniculis fili- i
 formibus elongatis, floribus glomeratis. Surinam.
 : Prafil. (Laurus Sw., Nectandra bijuga Rottb.)
 cupularig * 18. P. foliis elliptico - oblongis utrinque attenuatis
 fupra nitidis, paniculis feffilibus terminalibus,
 . . . ealyce turbinatis. Inf. Mascaren. (Laurus cu-
 .pularis Lar.)
 glolofa * 19. P. foliis ovatis glabris fubtus glaucefcentibus,
 ke C. em cymis peduncuillatis axillaribus, fructibus globo-
 i: Ds. Ind. occid. (Laurus.Lam;) z
 tauffica * 20. P. foliis oblongis utrinque attenuatis fubtus re-
 » ticulato - rugofis, pedunculis 1floris, fructibus
 * fubreniformibus. Chi. (Laurus cauftica Molin.)
 Cubeba 91. P. foliis oblongo - lanceolatis [ubeveniis nitidis,
 floribus congeffis pedunculatis, fructibus globo-
 roffolia * Hj minimis. Cochimnchina. (Laurus Lour.) i
 ffolia 22. P. foliis ovato - oblongis fupra nitidis fubtus ca-
 nefcentibus, fructibus ovatis pubefcentibus. Ca-
 enn, Richard. (Laurus Poir.)
 retroflexa * - P. foliis lanceolatis nitidis glabris, floribus ra- :
 . . cemofis axillatibus, calycibus fructiferis durefcen-
 2 tibus reflexis. Jjffpaniol Poiteau, (Laurus Poir.) ' "

Kun A. 94. P. foliis ovalibus utrinque glabris fubtus reti-
: culaiis, paniculis axillaribus folio brevioribus, ca- E
Mujji H lyeibus incano - pübefcentibus. JVov. Granat. A
umb, 25. P. foliis ellipticis coriaceis fubtus glauco- prui-
nofis , corymbis axillaribus, calycibus patentiffi- :
hi : mis ferrugineis, fructibus globofis. JVov. Granat, 2n
gu Kunth, 26. p. foliis ellipticis fubtus ferrugineo - fericeijs, ^ - -
nolis pedunculis axillaribus fub -6floris, calycibus fe-
riceis, fructibus ovatis. JPeru.
27. P. foliis ovatis acutis fupra nitidis fubtus ferru-
&ineo-tomentolis, corymbis axillaribus dichoto- — .
mis, Peru. T € Fé L2 "

28. P. foliis oblongis utrinque acuminatis coriaceis -
fupra nitidis fubtus reticulatis pilofinfculis, pani- -
. £ulis axillavibus folio brevioribus, fructibus ob-
longis. ner. aufir. (Ocotea Kunth.) Li tti

*9. P. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris
fubtus reticulato - venofis, floribus paniculatis
axillaribus pubefcentibus, calycibus acutis. 44d
J-- Amazonum. (Ocotea Kunth.) ME UL Aur

30. P. foliis ohlongis utrinque attenuatis g
fubtus reticulato - venofis, floribus paniculatis
axillaribus pubefcentibus, calycibus obtuüs. d
e iokios JI. Amazonurn. '(Ocotea Kunth.) ERI ud
CHe8 * SI. P. foliis lanceolatis acuminatis fubtus incano
^ . Pübefcentibus, paniculis folio brevioribus, ca
* — Q,jPubefcente.. Mexico. (Ocotea Kunth.) -
P. foliis oblongis utrinque attenuatis c
fubtus argenteo-fericeis, paniculis folio br
ribus, calyce pubefcénte. JVoe. Gramat. -
fericea Kunth.) —
El.
- icéi : L :
Tur És