

- C. VIRGATA Linn. = *Pterocaulon virgatum*.
 C. VISCOSA Hortul. = *Inula viscosa*.
 C. VISCOSULA Wall. = *Blumea viscosula*.
 C. VOLKAMERIEFOLIA Wall. = *Vernonia volkameriæfolia*.
 C. VOLUBILIS Wall. = *Microglossum proliferum*.
 C. VULGARIS Lam. = *Inula conyza*.
 C. WIGHTIANA Wall. n. 3028. = *Monosis Wightiana*.
 C. WIGHTIANA Wall. n. 3093. = *Blumea Wightiana*.

CCXIII. PHAGNALON Cass. bull. philom. 1819. p. 174. dict. 19. p. 118. 23. p. 561. et 39. p. 400. Less. syn. 204. — *Conyzæ et Gnaphalii* sp. auct.

Capitulum multiflorum heterogamum, fl. omnibus tubulosis, marginalibus pluriserialibus tenuissimis filiformibus fœmineis sæpè abortientibus, centralibus 5-dentatis hermaphroditis fertilibus. Recept. nudum planum. Involucrum imbricatum, squamis plùs minùs scariosis. Achæmium teretiusculum erostre adpressè villosum. Pappus 1-serialis paucisetus conformis piloso-setaceus subscaber. — Fruticuli regiones Mediterraneas aut Canarienses habitantes, ramis tomentosis teretibus. Folia sparsa linearia aut lanceolata integra aut subdentata subtùs tomentosa sæpiùs margine revoluta. Capitula ramos sæpiùs apice aphyllis terminantia ebracteata sæpè solitaria. Flores lutei aut lutescentes.

1. P. SORDIDUM, caule basi fruticoso, ramis tomentosis ultimis aphyllis apice capitula 1-3 sessilia gerentibus, foliis linearibus integerrimis margine revolutis utrinquè tomentosis, invol. ovato-cylindracei squamis ovatis scariosis obtusiusculis. ζ ad rupes et muros Galliæ mediterraneæ, Italiæ, Mauritaniæ, Hispaniæ. *Conyza sordida* Linn. mant. 466. DC. fl. fr. 4. p. 140. *Gnaphalium sordidum* Linn. sp. 1193. *Gnaphalium conyzoideum* Lam. fl. fr. 2. p. 63. *Phagnalon tricephalon* Cass. dict. 39. p. 401. — Barr. ic. t. 277 et 368. Invol. rufescens glaberrimum. Cor. flavidæ. (v. v. et s.)
2. P. UMBELLIFORME, caule basi fruticoso, ramis tomentosis apice ramulos plures 1-cephalos subumbellatos gracillimos interdum umbellato-ramulosos gerentibus, foliis integerrimis radicalibus lineari-oblongis planis caulinis linearibus margine revolutis subtomentosis, invol. oblongi squamis angustis acuminatis apice rufo-scariosis. ζ in rupestribus insulæ Palmæ arch. Canar. legerunt cl. Webb et Berthelot. Affinè P. sordido sed evidenter distinctum! (v. s. in h. Webb et Berth.)
3. P. SAXATILE (Cass. bull. philom. 1819. p. 174), caule basi suffruticoso ramossissimo, ramis tomentosis apice productis in pedunculos elongatos aphyllis 1-cephalos, foliis infer. oblongo-lanceolatis subdentatis super. linearibus margine revolutis suprà araneosis subtùs tomentosis, invol. campanulati glabri squamis sublinearibus acuminatis apice scariosis. ζ in rupibus et muris regionis Mediterraneæ à Cretâ ad insul. Canarienses, à Græciâ ad Lusitaniam. *Conyza saxatilis* Linn. sp. 1206. DC. fl. fr. 4. p. 140. *Phagn. subdentatum* Cass. dict. 39. p. 400. — Barr. ic. t. 426. Variat foliis caulinis planis aut margine revolutis, subdentatis aut integerrimis plùs minùs tomentosis. (v. v. et s.)

β . *intermedium*, foliis subadnato-amplexicaulibus, invol. squamis angustioribus minùs acutis sed non obtusis. ζ in ins. Scio (Oliv.!), in muris ins.