



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Repertorium botanices systematicae

Lipsiae, Sumtibus Friderici Hofmeister, 1842-48

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/7553>

t.3 (1844-1845): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/31971>

Page(s): Text, Page 457, Page 459, Page 460, Page 461, Page 462, Page 463, Page 464, Page 465, Page 466, Page 467, Page 468, Page 469, Page 470, Page 471, Page 472, Page 473, Page 474, Page 475, Page 476, Page 477, Page 478, Page 479, Page 480, Page 481, Page 482

Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Generated 6 June 2024 5:10 AM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1705855i00031971.pdf>

This page intentionally left blank.

**SYNOPSIS
SOLANACEARUM,
SCROPHULARINARUM, OROBANCHEARUM
ET
LABIATARUM
IN
BOTANICORUM SCRIPTIS AD HUNC DIEM EDITIS DESCRIPTARUM.**

CURANTE
**GUILIELMO GERARDO WALPERS,
PHILOSOPHIAE DOCTORE,**
ACADEMIAE CAESAREAE LEOPOLDINAE CAROLINAE NATURAE CURIOSORUM,
SOCIETATIS REGIAE BAVARICAE BOTANICAE RATISBONENSIS SOCIO ETC.

LIPSIAE.
SUMTIBUS FRIDERICI HOFMEISTER.

1844—45.

Ordo CLIV. OROBANCHEAE L. C. Rich.

[L. C. Rich. in Pers. Enchirid. II. 180. — Endlich. Gener. plantar. p. 725. — Meisn. Gener. plantar. vascular. I. 314. II. 224. — OROBANCHES generis ΔΙΑΣΚΕΥΗ auctore **Fr. Gu. Wallroth.** (Francof. ad Moen. 1825. 8vo.) — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 627. (ex parte.)]

4182. EPIPHEJUS Nutt.

(Nutt. Gener. plant. Americ. II. 60. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225. — Hook. Flor. Bor. Americ. II. 93.)

1. E. AMERICANA Nutt. l. c. — Hook. l. c. — Endlich. Iconograph. gener. t. 80. — Radix carnosa *Juglandis* magnitudine, undique fibrillosa, perennis. Scapus ex ipsa radice ramosissimus tortuosus nodosus angulosus aphyllus, demum lignescens, rami simplices v. divisi e squama ovato-oblonga prodeentes angulosi glabri, superne pedicellique pube tenuissima adspersi, floriferi digitales, fructiferi elongati sesquipedales, inflorescentiam ramoso-virgatam constituentes. Bractae solitariae squamis conformes, sensim minores brevissimae obtusiusculae enerves fuscescentes glabrae, margine parce hirtello. Calyx monophyllus urceolatus brevissime 5-dentatus. Flores polygami brevissime pedicellati alterni solitarii flavi, superiores masculi ringentes quadrifidi in labium inferius planum divisi, inferiores foeminei omnes fertiles obsolete 4-fidos mentientes, apice cito arce conniventis fere conferruminati et capsulae, donec hae dehiscant, calyptae mamillatae, apice clausae instar insidentes eoque stigma concipientes. Capsula obovata, basi a calyce cineta 1-locularis polysperma. — *Orobanche caule ramoso, floribus distantibus* Clayt. in Gronov. Virgin. 168. — *Orobanche minor Virginiana lignosior per totum caulem floribus minutis onusta* Moris. Oxon. Histor. Sect. 12. t. 16. fig. 9. — *Orobanche (Mylanche* Wallrth. Gener. Orob. διασκευή 76.) *Virginiana* Linn. Spec. plantar. 882. — *Leptamnium* Raf. Americ. monthl. journ. 1818. — Crescit parasitica in *Fagorum* radicibus in Virginia.

4183. PHELIPAEA Dsfont.*)

(Dsfont. Flor. Atlant. II. 60. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 631.)

Sectio I. TRIONYCHION Wallroth, Gener. Orob. διασκευή pag. 58. — C. A. Mey. mss. in Ledeb. Flor. Altaic. II. 460.

Calyx 4-5-fidus, lobis elongatis inaequalibus acuminatis. Antherae superficie glabrae, loculis villosa-dehiscentibus. Capsula styli decidui basi coronata.

1. PH. LANUGINOSA C. A. Mey. mss. in Ldb. Icon. flor. Ross. Altaic. illustr. t. 377. et Flor. Altaic. II. 460. † — C. A. Meyer, Vrzchns. der Pflnzn. am Caucas. 104. — Albo-lanata: squamis floralib. ovato-lanceolatis calycem excedentib.; calycis lobis lanceolatis subaequalib.; corollae fauce subinflata, labio superiore paullo longiore, lobis labii inferioris subaequalib. ellipticis obtusis subdenticulatis; filamentis antherisq. glabris; stylo glanduloso, stigmate bilobo. 2 — Scapus simplicissimus 4-10-pollicaris. — Species intermedia quasi inter *Ph. coeruleam* et *carnosam*, ab illa differt lanagine alba, squamis floralibus calyce longioribus in apice scapi subcomosis, labio corollae superiore paullo breviore, lobis obsoletius denticulatis, ab hac dignoscitur corolla in fauce multo minus ampliata, intus

*) Bractae ternae nec binae ut ait St. Endlicher et cum eo Meisner, si forte excipies species nonnullas minus notas.

5. **PH. RUFESCENS** Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 59. † — Rufescens ramosa: calyce quadrifido, laciniis lanceolato-acuminatis; corollae homochroae parum constrictae tubo patente, dorso arcuato, limbi lobis ovato-oblongis obtusis; antherarum valvis margine lanato-ciliatis; stigmate cerino-flavo. ♀ — Herba pallide brunnea v. rufescens, hinc violaceo-tincta palmaris puberula, basi paullo incrassata, saepe pluricaulis. Squamae erecto-patentes lanceolatae, in axillis saepius gemmiferae, quibus nondum evolutis caulis simplex appetet. Spica brevis densiflora, bracteae ovatae acuminatae calycis tubum subaequantes, bracteolae linearis. Calyx ad medium fere 4-fidus, laciniis inaequalibus, hinc fissus. Corolla rufescens v. subinde violacea semipollicaris, limbo brevi glanduloso-ciliolato. Stamina suprabasilaria glabra. Stigma bilamellatum cerinum. — Crescit in radicibus *Plantaginis Lagopodos* in Thraciae littore.
6. **PH. (OROBANCHE** Viviani, Plant. Aegypt. decad. 22.) **PEDUNCULATA** Wlprs. mss. — Caule a basi diviso flexuoso angulato squamoso; florib. laxe racemosis; pedunculis bracteis suppositam duplo superantib.; bracteis calycinis duabus linearis-setaceis; corolla calycem monophyllum quadrifidum quadruplo superante; filamentis germeque sphaerico glabris. ♀ — Crescit in desertis Kahiricis.
7. **PH. (OROBANCHE** Linn. Spec. plant. 882. — Thnbrig. Prodr. flor. Capens. 97. — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 933. 934. — Bull. Herb. t. 399. — Engl. bot. t. 184. — Wallrth. Gener. Orob. διασκευή 63. † — Rchb. Flor. Germ. excurs. 356. no. 2430. — Koch, Synops. fl. Germ. [edit. 1.] 539. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. IV. t. 250.) **RAMOSA** C. A. Meyer, Verzeichn. der Pflnzn. am Caucas. 104. — Scapo ramoso parce squamoso; florib. alternis in spicam acutatam laxe dispositis; calycis monophylli suburceolati quadrifidi dentib. ovatis acuminatis aequalib.; corollae infundibuliformi-tubulosae labio superiore ascendentem, inferioris lobis aequalib. obtusis rotundatis; staminib. pubentib. styloq. tenuiter glanduloso inclusis; stigmate retuso. ♂ — Scapus interdum a basi, frequentius tamen e media parte ramosus rarissimeque simplex, inferne sensim tumidulus glaber, superne hirsutus-furfurascens, digitalis v. pedalis, ramuli conformes hirsutiores, intermedio breviores. Spicae virgatae. Bractea exterior ovata acutiuscula fusca, calycem subaequans, interiores lineares acuminatae. Calyx tenuiter membranaceus urceolatus postice excisus, dentes oblongo-lineares acuti capsulam aequantes, praeter posticum minorem subaequales. Corolla praeter basin pro capsula circumcludendam rotundatam tubulosa, sensim in faucem ampliata hirtella, inferne flavescens, apice cyaneo-purpurascens v. coeruleascens, labium superius bilobum magis minusve rotundatum integrum, inferius subaequaliter trifidum, ad palatum flavescenti-hirsuta. Stamina basi hirtella. Stylus glabriuscus. Stigma albidum capitatum. Capsula ovato-subrotunda. — *Orobanche tertia polychonos* Clus. Histor. I. 271. — Moris. Oxon. Histor. III. 502. sect. 12. t. 16. fig. 8. — Chabr. Stirp. 257. fig. 3. — Guettard, Mém. 1746. t. 9. — *Orobanche interrupta* Pers. Enchirid. II. 181. — (ex Cham. et Schlehd. Linnaea III. 136.) — Ad radices *Cannabeos* per totam Europam et Sibiriam et in Promontorio bonae spei in agris humidiusculis crescit.
8. **PH. (OROBANCHE** Dcne. Ann. sc. natur. [2. Sér.] IV. 201.) **DELILEI** Wlprs. mss. — Simplex v. saepius ramosa: ramis angulatis pubescentib.; squamis caulinis lanceolatis acutis semipollicarib., floralib. breviorib.; spicis ramulos terminantib. laxifloris; florib. sessilib.; calycis cupuliformis dentib. lanceolato-setaceis, corolla pollicari extrorsum puberula, fauce dilatata, introrsum pubescente; staminib. infra medium tubi insertis; filamentis glabris; stylo glabro, fauci aequali. ♂ — Planta fusca 8-12-pollicaris, flores azurei duplo maiores quam *Ph. ramosae*. Calyx subcampanulato-cupuliformis, flores sessiles. — *Orobanche ramosa* Delile, Flor. de l'Egypte (nec Linn.) — Crescit parasitice in radicibus *Cucurbitae Melonis* et *Brassicarum* in hortis prope urbem Cahiram in Aegypto.
9. **PH. (OROBANCHE** Borkhausen in Roem. Neues Magaz. ao. 1794. p. 6. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 356. no. 2429., Plant. critic. VII. fig. 929. 930. 931. — Koch l. c. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. IX. t. 579.) **ARENARIA** Wlprs. mss. — Scapo simplici;

calyce monosepalo quinquedentato, dentib. subulatis; corolla tubuloso subrecta, tubo medio angustato, fauce subinflata, laciniis labiorum obtusis, margine reflexis; antherarum sutura lanato-pilosa. ♀ — Scapus basi leviter incrassatus erectus simplicissimus dodrantalis v. pedalis hirsutus albus diluteve coerulescens, demum fuscus. Squamae ovatae. Spica comosa spithamea 15–30-flora. Bracteae ternae, exterior ovato-oblonga, laterales lineares acutae breviores. Calyx plurimque 4-, rarius 3- v. 5-fidus, dentes lineares acuti aequales praeter quintum breviorem, corollae stricturam superantes. Corolla ultra basin pro capsula circumcludenda rotundatam dilutiorem et ex staminibus constrictam, attenuata sub-infundibuliformis, in faucem patentem ampliata dilute coerulescens, demum rubiginosa hirtella, labium superius profunde emarginatum parceque crenulatum, inferioris lobi ovato-rotundati subaequales obtusi, intus ad limbum hirtelli, ad palatum longitudinaliter albo-villosi. Antherae cum villo stupposo dehiscentes. Stigma bifidum aurantiacum. Capsula ovata. — *Orchis abortiva* Leyss. — *Orobanche laevis* Ehrh. mss. — *Orobanche (Phelipaea G. Don l. c.) comosa* Wallrth. Schedul. critic. I. 314. et Gener. Orob. διασκευή 59. † — Crescit ad radices *Gennistae tinctoriae* et *Artemisiae campestris* in Gallia et Germania.

10. PH. (OROBANCHE Alb. Dietr. Flor. Borussic. III. t. 151. †, Flor. Marchic. 338.)

ROBUSTA Alb. Dietr. mss. — Villoso: scapo crasso ramosissimo; spicis densifloris; bracteis ternis calycis longitudine; calycis quinquefidi lacinia quinta minima; corollae tubulosae labio superiori bilobo, lobulis reflexis, labii inferioris reflexi laciniis aequalib. vix crenulatis; filamentis glaberrimis, antheris villo cinctis; stylo glaberrimo, stigmate biglobuloso stramineo. ♀ — Scapus bipedalis v. altior strictissimus e basi (pollicem fere diametro tenente) ramosus livide vires glaber, infra spicas parce villosus. Squamae ovales obtusae pollicares, semipollicem latae, superiores angustiores acuminatae. Spicae 9-pollicares vel longiores. Bracteae ternae lanceolato-lineares, intermedia longiori. Calycis lacinia (excepta postica) linearis-lanceolatae acuminatissimae. Corolla pollicaris, tubus incurvus, ad faucem intus breviter villosus. Stigma pallidissime sulphureum globuloso-bilobum. — *Habitus Ph. ramosae*, flores *Ph. coeruleae*, ab utraque statura insignis. — Crescit in radicibus *Artemisiae campestris* in collibus arenosis apricis (bei Baumgartenbrück hinter Potsdam).

11. PH. (OROBANCHE Rxb. Flor. Indic. III. 27.) INDICA G. Don l. c. 632. no. 4. —

Ramosa pilosa: scapo ad ramifications tantummodo squama instructo; calyce subunilaterali 5-fido; spica densa clavata; corollae tubulosae labio superiore bilobo, inferiori trilobo; antheris lanatis bifidis, loculis calcaratis; filamentis glabris; stigmate bilobo. ♀ — Prope accedit ad *Ph. ramosam* sed recedit corollis duplo majoribus (coeruleis). — Crescit in India orientali et Nepalia in radicibus *Nicotianarum*.

12. PH. (OROBANCHE Fr. W. Schultz, Flora [B. Z.] XXVI. 127.) FRAASII WIprs. mss. — Calyce monosepalo quinquedentato, dentib. e lata basi lanceolatis acutis; corolla calycem triplo excedente tubulosa subhorizontaliter patente subarcuata, tubo supra ovarium coartato, tunc ampliato, fauce ampla, laciniis labiorum ovatis, labii superioris approximatis, labii inferioris distantib.; staminib. infra medium tubi insertis glabris. ♀? — Planta pulcherrima purpureo-coerulea, solummodo *Ph. (Orobanche) Siculae* et *Ph. (Orobanche) Schultzii* comparanda. — In radicibus *Psoraleae bituminosae* ad Tripolizam crescit.

13. PH. PULCHELLA C. A. Meyer in Eichwld. Plant. nov. Casp. Caucas. 17. † t. 18.

— Albo-lanata: squamis subfloralib. ovatis acutis calycem subaequantib.; lobis calycis linearis-subulatis subaequalib.; corollae fauce subinflata, labiis subaequilongis, lobis labii inferioris suborbiculatis denticulatis aequalib.; filamentis glabris, antheris styloq. pilosis; stigmate bilobo. ♀? — Scapi simplicissimi 3-4-pollicares, basi non incrassati, una cum squamis, calycibus et corollis dense albo-lanati, squamis paucis ovatis acutis distantibus obsiti. Flores 8-10 spicati. Bracteae (ternae?) lineares acuminatae calycem fere aequantes. Calycis quadridi lacinia linearis-subulatae subaequales. Corolla saturate violaceo-coerulea.

- 10 lin. longa subincurva, e basi cylindrica in faucem sensim ampliata, extus dense albo-lanata, intus parce pilosa, laciniis utriusque labii fimbriato-dentatis. Filamenta glabra. Antherae margine lanatae. Stylus albo-pilosus. Stigma subbilobum flavum obliquum. — Crescit in radicibus? in Imeretia.
14. PH. (OROBANCHE) Rehb. Plant. critic. VII. fig. 936. — Buxb. Centur. III. t. 1. fig. 2.) CAESIA Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 59. — Coerulescens simplex: calyce quadrifido, laciniis subulatis; corollae violaceae supra fundum arcte constrictae tubo erecto-patente, versus apicem arcuato, limbi lobis ovato-subrotundis v. ovato-oblongis obtusis; antheris glabris; stigmate pallide amethystino transverse sulcato. ♀ — In radicibus *Erodii cicutarii* in pascuis montis Tschatal-Sepé prope Enos et in insula Chalki crescit.
15. PH. (OROBANCHE) Viviani, Flora Lybic. 34. t. 15. fig. 2.) COMPACTA G. Don l. c. 632. no. 9. — Scapo simplici squamoso-imbricato, a basi ipsa florifero; spica ovata multiflora, squamis floralib. flores dimidiis aequalib.; calycib. quadrifidis, segmentis ovatis obtusis, interdum truncatis, corolla triplo breviorib.; corolla incurva versus faucem infundibuliformi-ampliata, laciniis labii superioris ovatis acutis, inferioris rotundatis undulatis subaequalib.; staminib. tubum corollinum aequalib. glabris, antheris pilosis; stigmate capitato-truncato. ♀ — Crescit in radicibus? in magna Syrti.
16. PH. (OROBANCHE) Nutt. Gener. pl. Americ. II. 58. — Hook. Flor. Bor. Americ II. 92.) LUDOWICIANA Wlprs. mss. — Pubescenti-glandulosa: caule brevi simplici v. subramoso; spica elongata densiflora; calyce inaequaliter profunde quinquefido bibracteato, laciniis linearib.; corollae intus extusq. pubescentis tubo elongato curvato, labiis subaequalib., superiori bifido, inferiore trifido, lobis acutiusculis; staminib. inclusis. ♀ — Calyx saepe sexfidus observatur, labium corollae superius saepe integrum. — Crescit in America boreali (New Caledonia, Saskatchewan, Rocky mountains).
- Sectio II. CISTANCHE Lnk. et Hffmnsgg. Flor. Portug. I. 319. t. 63.
Calyx semiquinquefidus, lobis aequalibus obtusis. Antherae undique lanatae. Capsula stylo persistente demum longitudinaliter secedente terminata. Scapus simplicissimus. — (*Haemodoron* Wallrth. Gener. Orob. διασχευή p. 69. Sect. IV.)
17. PH. FISSA C. A. Meyer, Verzeichn. der Pflnzn. am Cauc. 104. — Lanuginosa: squamis floralib. lanceolatis obtusis calyce longiorib.; calycis fissi lacinia superiori (v. posteriori) linearis, interiori (v. anteriori) spathaeformi quadridentata, dentib. obtusis; corollae (violaceae) rectiusculae tubuloso-campanulatae laciniis patentib. subaequalib. semiobiculatis; filamentis basi barbatis, antheris apice connectivo producto mucronulatis; stylo glaberrimo, stigmate indiviso. ♀ — In radicibus? in Caucaso crescit.
18. PH. FLAVA C. A. Meyer l. c. — Glaberrima: squamis linearis-lanceolatis, floralib. corolla multo longiorib.; calycis tubulosi lobis rotundatis; corollae flavae incurvae tubuloso-campanulatae lobis patentib. subaequalib. ovatis; filamentis basi pubescentib., antheris apice connectivo producto mucronulatis; stylo glaberrimo, stigmate subretuso. ♀ — Crescit in radicibus? in Caucaso.
19. PH. SALSA C. A. Meyer in Ledeb. Icon. flor. Rossic. Altaic. illustr. t. 376. — Ledeb. Flor. Altaic. II. 461. † — Sublanata: squamis floralib. ovato-lanceolatis calyce longiorib.; bracteis sublinearib.; calycis laciniis semiobiculatis aequalib.; corollae rectiusculae tubuloso-campanulatae lobis subaequalib. semiobiculatis patentib.; filamentis basi barbatis; antheris muticis; stylo glabro; stigmate emarginato. ♀ — Planta ex observationibus non parasitica semipedalis v. pedalis. Scapus erectus crassitie digitii minoris, basin versus tuberoso-incrassatus squamae florales e basi dilatata ovato-lanceolatae obtusiusculae, dorso albo-lanatae calyce fere sessilis longiores, corolla duplo breviores. Bracteae lineares v. anguste oblongae ellipticae obtusae, calycem aequantes, lanuginosae lanato-ciliatae. Calycis semiquinquefidi lacinia semiorbiculatae obtusissimae, margine scariosae

alba lanugine ciliatae. Corolla odorem *Violarum* spargens speciosa 1-1 $\frac{1}{4}$ poll. longa, extus glaberrima, tubo albido, limbo amoene violaceo, labio superiore paullo breviore bifido, inferiore trifido, lobis subaequalibus patentibus rotundatis crenulatis ciliolatis. Filamenta basi dense lanata, antherae dense albo-lanuginosae, inaequaliter bimucronatae. Stigma leviter bilobum fuscescens. Capsula magna ovata. — *Anblatum Tataricum* Fisch. mss. — Crescit in locis argilloso-salsis deserti Soongarico-Kirghisici trans fl. Kurtschum.

20. PH. TUBULOSA Schenk, Plant. spec. Aeg. Arab. 23. † — Scapo carnoso sulcato uni-tripedali; squamis late lanceolatis obtusis; bracteis ternis lanceolatis elongatis; calycis laciniis oblongis obtusis; corollae tubo curvato calyce duplo longiori; filamentis pilis sparsis obsitis; stigmate corollam superante. ♀ — Scapus pollicis crassitie cylindricus sulcatus squamatus. Bracteae ternae, duabus lateralibus fere duplo brevioribus, media maxima calycem superante, omnibus lanceolatis acutis carnosis, margine laceris. Corollae tubus calyce duplo longior arcuato-infundibuliformis, lacinia labii superioris et inferioris laterales rotundatae, intermedia paullo breviori acutiuscula. Filamenta exserta sparse pilosa. Antherae cordato-sagittatae muticae villoso-lanuginosae. Stigma bilobum glabrum. — Crescit in radicibus? inter Suez et Tor in Arabia petraea.
21. PH. (CYSTANCHE Lnk. et Hffmnsgg. Flor. Portug. I. 319. t. 63.) LUTEA Dsfont. Fl. Atlant. II. 60. † t. 146. — Scapo simplicissimo sulcato carnoso; bracteis ternis subaequalib., exteriorib. ovato-oblongis, interiorib. uninerviis; corolla e basi angustata arcuato-tubulosa in faucem ampliata quinquefida speciosa, lobis ovato-rotundatis aequalib. patentib.; staminib. glaberrimis, antheris maximis obsolete mucronatis; stigmate capitato emarginato. ♀ — Scapus glaberrimus (ut tota planta) lutescens. Bracteae ternae, exterior semiamplexicaulis ovato-oblonga, corolla duplo brevior, scapo concolor, interiores ovatae uninerviae conformes, calyce breviores. Calycis dentes 5 ovato-rotundati obtusi aequales, corollae tubo multo breviores. Corolla mediotenus arcuato-tubulosa, inferne sensim angustata, superne ampliata, lacinia ovato-rotundatae aequales patentes. Stamina valida glaberrima, antherae lanato-villosae. Stigma crassum emarginatum cernuum. — *Orobanche tinctoria* Forsk. Aeg. Arab. 112. — Wallrth. Gener. Orob. διασκευή 70. † — Crescit in Barbaria, Arabia et in Aegypto.
22. PH. (OROBANCHE Wallrth. Gener. Orob. διασκευή 70. — CYSTANCHE Lnk. et Hffmnsgg. Flor. Portug. I. 320.) VIOLACEA Dsfont. Flor. Atlant. II. 60. t. 145. — Scapo simplici carnoso; bracteis ternatis; calycib. quinquepartitis; corollis cylindricis arcuatis. ♀ — Squamae lanceolatae obtusae numerosae sparsae, spica conica, corollae violaceae limbus irregularis, lobi rotundati, stigma crassum bilobum, plicae fauci luteae. — Αιμόδωρον Theophr. Histor. VIII. 8. — *Orobanche Phelypaea* Willd. Spec. plantar. III. 352. — Crescit in deserto Barbariae.
23. PH. (OROBANCHE Willd. Spec. pl. III. 353. [excl. syn. Forsk. Vahl et Dsfont.]) TINCTORIA Wlprs. mss. — Scapo simplicissimo, squamis semiamplexicaulib. ovatis eroso-crenulatis munito; bracteis ternis, exteriorib. conformib. oblongis breviorib.; calyce campanulato inaequaliter obtuseq. quinquefido; corolla e basi subinfundibuliformi ventricosa inflata quinquefida, labiorum lobis aequalib. rotundatis semet incumbentibus. ♀ — Scapus basi leviter incrassatus carnosus sesquipedalis. Florum spica ovata 10-12-flora. Bracteae ternae, interiores duplo angustiores breviores obtusae. Calyx ad medium quinquefidus, dentes ovati obtusi, corolla multo breviores. Corolla e basi angustata subinfundibuliformi inflato-tubulosa lutea micans 5-fida, labio superiori profunde bifido, inferiori aequaliter trilobo. — *Phelypaea Lusitanica flore luteo* Tournef. Coroll. 47. — *Orobanche (Lathraea* Linn. Spec. plant. 844. [excl. var. β.]) *Phelypaea* Wllrth. Gener. Orob. διασκευή 70. † — Crescit in Lusitania.
24. PH. (OROBANCHE Edgwrth. in Hook. Journ. of bot. II. 285.) CALOTROPIDIS Wlprs. mss. — Spica confertiflora; scapo glabro spongioso, succi aquosae pleno; bracteis ternis unifloris, inferiore majore, apice acuminata, demum marcescente, calycem superante carnosa purpurascente, supra fulva, duabus lateralib.

ellipticis canaliculatis, laterib. versus basin pilis carnosis ciliatis glabris, calyce breviorib.; calyce quinquefido, segmentis obtusis glabris; corolla ringente, tubo calyce subduplo longiore curvato, limbo bilabiato, labio superiori bifido minore suberecto, segmentis rotundis emarginatis purpureis, inferiore patulo trifido, segmentis rotundis emarginatis purpurascens, intus flavis, fauce valleculis duabus luteis instructa; staminib. 4 didynamis, inferiorib. longiorib. glaberrimis, juniorib. in antherium lineare antheras superans productis quod postea marcescens ad antheram affingitur, antheris bilobis cordatis, pilis albis praesertim ad basin marginesque saccarum hirtis, juniorib. hisce pilis arcte coalitis post impregnationem discedentib.; polline ovali; pistillo glaberrimo ad basin ovarii disco luteo circumdato, ovario conico uniloculari placentis 4; stylo staminib. longiore medio angustato curvato, glanduloso stigmate apice clavato. 2? — Crescit in radibus *Calotropidis Hamiltonii* in „the Sich States“.

25. PH. (OROBANCHE Cham. et Schlehd. Linnaea III. 134. †) CALIFORNICA G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 632. no. 3. — Viscido-pubescent: scapo simplici; florib. corymbosis; calycib. bracteatis campanulatis regulariter quinquefidis; corolla recta tubulosa ringente, labio supero plano, apice bilobo, infero trisepto, laciniis dissitis linearib. acutis; staminib. ecalcaratis, antheris sagittatis rima villosis; stigmate orbiculari peltato. 2? — Tota breviter viscido-glanduloso-pubescent. Scapus triplicaris, squamae lanceolatae acutae. Flores pedunculati, pedunculi praeter squamam fulcientem bracteis duabus linearis-lanceolatis instructus. Calyx dimidiatus corollam aequans, lacinia lineares, basi dilatatae. Corolla pollice longior tubulosa, labium superius planum vexilliforme bilobum, lobis acutiusculis. Stamina non exserta. — Crescit in vicinia portus Sti. Francisci in California.

26. PH. ARMENA C. Koch, Linnaea XVII. 291. — Simplicissima, inferne glabra, squamis carnosis coloratis ovato-acutis obtecta, superne cum bracteis ovato-lanceolatis et bracteolis linearis-lanceolatis albo-lanuginosa: calyce bracteis duplo, corolla triplo breviore, lobis ovato-acutis inaequalib.; corolla recta subaequiloba, intus annulo lato albo-piloso notata ex quo stamina evadunt; seminib. nudis. 2? — Species insufficienter descripta. — Crescit in planicie ad Araxem sita.

† *Species non satis notae.*

27. PH.? SUBACAULIS Bth. Scrophul. Indic. 55. — Caulis brevissimus crassus squamatus. Pedunculi in caule 3–5 squamis breviores uniflori. Calyx 6–7 lin. longus tubulosus, basi parum inflatus, apice irregulariter 4–5-dentatus. Corolla 2–2½-pollicaris, tubus basi tenuis e calyce breviter exsertus, dein in faucem amplam dilatatus, limbus breviter et late subbilabiatus quinquefidus. Stamina 4 glabra. Antherae glabrae, loculis calcaratis. Stigma capitatum? Capsula.....? — Crescit in Peninsula Indiae orientalis.

28. PH. (OROBANCHE Pers. Enchir. II. 181.) AEGYPTIACA Wlprs. mss. — Multi-caulis: florib. longe pedunculatis; calycib. quinquefidis; filamentis glabris, antheris apice barbatis. 2? — Crescit in Aegypto.

†† *Species e genere expellenda.*

PH. ABBREVIATA Steud. = AEGINETIA ABBREVIATA.

PH. BIFLORA Spr. = ANOPLANTHUS UNIFLORUS.

PH. BIEBERSTEINII Fisch. = ANOPLANTHUS BIEBERSTEINII.

PH. COCCINEA Pers. = ANOPLANTHUS BIEBERSTEINII.

PH. FASCICULATA Spr. = ANOPLANTHUS FASCICULATUS.

PH. FOLIATA Lamb. = ANOPLANTHUS BIEBERSTEINII.

PH. INDICA Spr. = AEGINETIA INDICA.

PH. TOURNEFORTII Dsf. = ANOPLANTHUS TOURNEFORTII.

††† *Species prorsus incognitae.*

*PH. CARNOSA C. A. Mey.

*PH. (OROBANCHE Mutel) SCHULTZII Wlprs.

*PH. (OROBANCHE Spenner) SICULA Wlprs.

4184. **CONOPHOLIS** Wllrth.

(Wllrth. Gener. Orob. διασκευή 78. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225.)

1. C. (OROBANCHE Linn. Suppl. 88. — Willd. Spec. plant. III. 351.) AMERICANA
Wllrth. l. c. † — Scapus simplicissimus teres coloratus succulentus spithameus, totus undique squamis ovato-oblongis acuminatis enerviis adpressis sessilibus flavescentibus, demum squamarum strobilorum abietinorum instar rigidibus imbricatus. Spica oblonga acuminata bracteis cooperata, partem scapi squamosam subaequans. Bracteae ternae, exterior exacte squamaeformis, sursum sensim minor, interiores calyci adpressae lineares acuminatae, calyce subaequantes. Flores subsessiles lutei concolores fere cum reliquis partibus. ♀ — Crescit in Carolina ad arborum fruticumque radices.

4185. **OROBANCHE** Linn.

(Linn. Gener. plant. no. 779. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225. — Wllrth. Gener plant. Orobanches ΔΙΑΣΚΕΥΗ excl. sect. 2. 3. 4. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 628.)

§. 1. *Sepalis discretis v. in anteriore parte basi concretis, posteriore liberis.*

1. O. CRUENTA Bertol. Plant. Ital. rario. decad. III. 56. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 533. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 354. no. 2415., Plant. critic. VIII. fig. 896. — Sepalis plurinerviis subaequaliter bifidis tubum corollae superantib.; corolla campanulata, antice basi strumoso-ventricosa, dorso arcuata, labiis inaequaliter denticulatis glanduloso-fimbriatis, superiori galeato integro v. emarginato, lobis patentib., laciniis labii inferioris subaequalib.; staminib. basi corollae insertis dense pilosis, superne styloq. glanduloso-pubescentib.; disco stigmatis holosericeo elevato-marginato. ♀ — Corolla campanulata ampla, basi antice strumoso-gibba, intus sanguinea, stamina imae basi corollae inserta, stigma luteum margine fusco-purpureo cinctum et tota pilis copiosis brevibus glanduliferis tecta atque odore suaveolente dignoscitur. — *O. gracilis* Sm. Transact. of the Linn. Soc. IV. 172. — Rchb. Plant. critic. VIII. fig. 898. 899. — *O. caryophyllata* Vivian. Ann. bot. I. 175. — *O. vulgaris* Gaud. Fl. Helvet. IV. 176. — *O. caryophyllacea* Schultz, Beitr. zur Knntnss. der deutsch. Orob. 8. — Crescit parasitice in radicibus *Loti corniculati* et *Hippocrepidis comosae* in locis graminosis in Germania australi, Helvetia et in Italia.

β. leiostemon Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 55. — Rufescens, basi subaequalis: bracteis corollae cruentae tubum subaequantib.; sepalis nervosis subulatis bifidisve; corollae tubo ad basin antice ventricoso, dorso arcuato, limbo patente glanduloso-ciliato; staminib. imae corollae insertis glaberrimis, nunc imae basi pilosis. — *O. annulata* Griseb. Reise II. 188. — Crescit parasitice in radicibus *Thymi Serpylli* in regione montana Macedoniae.

2. O. VERSICOLOR F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVII. 129. — Sepalis bi- v. obsolete plurinerviis, e basi ovata lanceolato-subulatis inaequaliter bifidis tubum corollae superantib.; corolla tubuloso-campanulata a medio tubi sensim ampliata, fauce amplissima, dorso recta, labiis denticulatis, superiori integro; staminib. infra medium tubi insertis a basi ultra medium lanuginoso-pilosis; stigmatis disco laevi. ♀ — Habitus *O. cruentae*, sed flores multo minores, corolla basi tubulosa, nec ventricosa, pallide flavescentes et supra ovarium atrosanguinea. — Crescit parasitice in radicibus *Chrysanthemi coronopifolii* prope Naupliam et Corinthum in Graecia.

3. O. SPRUNNERI F. W. Schultz l. c. 130. — Sepalis plurinerviis e basi latissima subrotunda lanceolato-acuminatis indivisis v. bifidis, margine dentato-ciliatis, corollae tubum vix aequantib.; corolla a basi amplissima campanulata, antice basi strumoso-ventricosa, dorso curvata, labiis inaequaliter denticulatis glanduloso-fimbriatis, superiori inferiore multo majori recto subemarginato, lobis (in

vivo?) patentib., lacinia media labii inferioris lateralib. majori; staminib. ad basin corollae insertis, a basi villosis, superne glabris styloq. glanduloso-pubescentib.; bracteis brunneis sparsim viloso-pilosus. ♀ — *Habitus O. cruentae*, corolla intus sanguinea. — Crescit parasitice in radicibus *Cisti* cujusdam ad Melissam prope urbem Naupliam in Graecia.

4. **O. BREVIFLORA** F. W. Schultz l. c. — Sepalis 3-5-nerviis e basi ovata lanceo-lato-subulatis integris, tubum corollae aequantib. v. superantib.; corolla a basi amplissima campanulata, antice basi strumoso-ventricosa, dorso curvata, labiis inaequaliter denticulatis glanduloso-fimbriatis, superiori subemarginato, lacinia media labii inferioris lateralib. paullo longiore; staminib. basi corollae insertis glabriusculis, basi villosis. ♀ — Species dubia ex habitu affinis *O. cruentae*. Stigma, stylus et stamina exserta. — Crescit in Graeciae provincia Attica.
5. **O. RAPUM** Thuill. Flor. Paris. (edit. 2.) 317. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. IV. t. 249. — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 923., Flor. Germ. excurs. 355. no. 2426. — Koch l. c. — Moulins, Annales des sc. natur. (2. Sér.) III. 69. † — Sepalis plurinerviis subaequaliter bifidis integrisve tubum corollae subaequantib.; corolla campanulata antice basi strumoso-ventricosa, dorso arcuata, labiis undulatis obsolete denticulatis (haud fimbriatis), superiori galeato emarginato, lobis patentib., labii inferioris lobo intermedio lateralib. duplo majori; staminib. basi corollae insertis, inferne glaberrimis, apice styloq. glanduloso-pubescentib., disco stigmatis holosericeo immarginato. ♀ — Corolla ampla campanulata *O. cruentae*, sicca luteo-fusca, antheris defloratis albis, staminibus inferne glaberrimis et labiis non fimbriatis (conferas tamen iconem et descriptionem Alb. Dietr.) dignoscitur. — *O. major* DC. Fl. Franc. III. 488. (an etiam Linn. Spec. plant.??) — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 900. et Fl. Germ. excurs. 354. no. 2417. — Engl. bot. t. 421. — Curtis, Flor. Londin. II. t. 128. — Crescit parasitice in radicibus *Genistae tinctoriae* et *scopariae* in Germania australiori, in Helvetia, Gallia et Italia.
6. **O. ULICIS** Moulins, Ann. des sc. nat. III. 71. † — Scapo graciliori elato, basi mediocriter incrassato sphaerico; squamis baseos paucis majusculis laxiusculis, reliquis paucis elongatis acutissimis; spica brevi laxe 20-40-flora; sepalis integris, rarius bidentatis bilobisve; corolla magna trigona ventricoso-depressa, extus lutea, fauce dilatata sanguineo-rubra; staminib. paullo supra corollae basin affixis, basi pilosis, duabus posticis altius insertis; stigmate maximo intense luteo. ♀ — Planta saepe 18-20-pollicaris, colore universalis inter citrinum et rubro-sanguineum ludens, odore *Berberidis* fugacissimo. — Crescit parasitice in radicibus *Ulicis nani* in Gallia (prope Lanquais).
7. **O. PROCERA** Koch, Dtschlnd. Flor. IV. 438., Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 534. — Sepalis plurinerviis late ovatis subaequaliter bifidis integrisq., tubo corollino breviorib.; corolla campanulata, antice basi strumoso-ventricosa, dorso curvata, labiis inaequaliter denticulatis, margine subglandulosis, superiore galeato emarginato, lobo intermedio labii inferioris [paullo majore]; staminib. basi corollae insertis glabris, ima basi parce pilosis, apice styloq. subglandulosis. ♀ — Crescit parasitice in radicibus *Cirsii arvensis* prope Manhemium.
8. **O. PRUINOSA** Lapeyr. Suppl. 87. — Rchb. Plant. critic. VIII. fig. 911. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 534. — (Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 55.) — Sepalis quinquenerviis bifidis, laciniis subaequalib. angustis subulatis tubum corollae aequantib.; corolla campanulata, dorso subcurvata, labiis expansis undulato-plicatis crispis obtuse denticulatis non ciliatis colorato-venosis, superiore bilobo, lobis labii inferioris rotundatis, intermedio duplo majori; staminib. supra basin corollae insertis, inferne villosis, apice styloq. glandulosis. ♂ — Corolla magna praecedentium sed tenuis substantiae, exsiccata papyracea, labiis magnis plicato-crispis instructa venisque coeruleis pulchre picta. — *O. grandiflora* Bory et

*Chaub. Flor. Peloponn. 983. + t. 23? *) — Crescit parasitice in radicibus *Viciae Fabae* in Europa orientali-australi.*

9. *O. ANGUSTISEPALA* F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVII. 130. — Sepalis univ. obsolete quadrinerviis indivisis bifidisq., e basi subovata angustissime subulatis, tubo corollae breviorib. eumq. aequantib.; corolla campanulata, dorso subcurvata, fauce ampliata, labiis expansis undulato-plicatis obtuse et obsolete denticulatis, superiori subbilobo, lobis labii inferioris rotundatis, intermedio duplo majori; staminib. supra basin corollae insertis, inferne villosis. ♀ — *Habitus O. pruinosa.* — Crescit parasitice in radicibus *Orobi digitati* in Hymetto monte Graeciae.

10. *O. SCABIOSAE* Koch, Dtschlnd. Flora IV. 440., Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 534. — Sepalis plurinerviis ovatis in apicem subulatum attenuatis, corollae tubum superantib., v. bifidis, laciniis parallelis; corolla campanulata, dorso arcuata, extus labioq. superiore intus piloso-scabris, pilis sparsis brevib. glanduligeris, tuberculo violaceo nigrove insidentib., labiis inaequalib. acute dentatis, margine crispis, superiore paullo sursum curvato bilobo, lobis patentib., laciniis labii inferioris aequalib.; staminib. prope basin corollae insertis, inferne sparsim pilosis, apice styloq. subglabris. ♀ — Similis *O. Epithymo*, differt autem caule crassiore altiore, tuberculis nigris piligeris corollae, lobis labii inferioribus aequalibus filamentisque apice glabris conniventibus nec arcuato-descendentibus. — *O. concolor* Duby, Bot. Gallic. 350?? — Crescit parasitice in radicibus *Chaerophylli sylvestris*, *Menthae arvensis* et *Scabiosae columbariae* (bei Berchtesgarden und Lofer im Königreiche Baiern) et in Galloprovincia.

11. *O. SPECIOSA* DC. Fl. Franc. III. 490. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. III. t. 149. (Flor. Marchic. 328.) — Sepalis plurinerviis, subito in acumen subulatum contractis tubum corollae aequantib.; corolla campanulata in medio dorso rectiuscula, superne antrorum curvata, extus labioque superiori, intus glanduloso-pilosus, pilis tuberculo ochraceo insidentib., labiis inaequalib. acute denticulatis, margine crispatis, superiore apice paullo sursum curvato bilobo, lobis patentib., laciniis labii inferioris subaequalib.; staminib. prope basin corollae insertis, inferne sparsim pilosis, superne glabris; stylo superne glanduloso-piloso. ♀ — *O. pallidiflora* Wimm. et Grabowsky, Flor. Silesiac. II. 233. + — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 534. — Crescit parasitice in radicibus *Cirsii arvensis* in Silesia, prope Frankofurtum ad Viadrum et in Gallia. — Scapus et flores cerino-flavescentes, squamae luride brunneae.

12. *O. CONDENSATA* Moris, Stirp. Sard. elench. App. 8. — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 897. — Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 56. — Superne villosa: squamis bracteisq. solitariis lanceolato-acuminatis corollam rubro-roseam excedentib.; calycis bipartiti laciniis subbifidis; corollae labio superiore subbilobo; spica elongata cylindrica compacta; stylo glabro; stigmate purpureo; staminib. basi pilosiusculis. ♀ — Crescit parasitice in radicibus *Genistae Corsicae* in Sardinia et in radicibus *Campanulae persicifoliae* in peninsula Hajion-oros in Rumelia.

13. *O. LEUCANTHA* Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 57. — Pallescens palmaris, basi subaequalis: bracteis corollae albae tubum subaequantib.; sepalis 1-2-nerviis subulatis bifidis; corollae tubo patente rectiusculo, limbo patente; staminib. suprabasilarib. glabris; stigmate violaceo. ♀ — *Habitus* tenuior, spica abbreviata, corolla semipollicaris, stamina ad basin insertionis lana lutea brevissima instructa, caeterum glaberrima alba, antherae brunneae tenuiter bistratatae, stigma biglobosum declinatum. — *O. alba* (Stephan??) Rchb. Plant. critic. VII. fig. 912. (nec

*) *O. GRANDIFLORA* Bory et Chaub. l. c. — *Pedalis v. sesquipedalis*, pilis subviscidis hispida: florib. dense spicatis; corollis majorib. tubulosis, tubi latitudine quadruplo longiorib., limbo expanso patulo, lobis quaternis rotundatis denticulatis, labio superiori margine patulo expanso; bracteis bifidis, laciniis subulatis tubum vix superantib.; filamentis basi pilosis; stylo glabro; stigmate cordato. ♂? — Crescit in Peloponneso.

Buxb., M. Bieberst.). — Crescit in castanetis umbrosis prope Karaës in Rumeliae peninsula Hajion Oros.

14. *O. BARTLINGII* Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 57. (adnot.) — Ochracea, basi subaequalis: bracteis corollae pallidissime rubrae tubum subaequantib.; sepalis uninerviis subulatis, corollae tubo erecto-patente ad apicem arcuato-declivem usque rectiusculo, limbo porrecto; staminib. suprabasilarib., inferne sparsim pilosis; stigmate saturate flavo. ♀ — Caulis pedalis pallide ochraceus, squamis ochraceo-luteis. Spica elongata. Bracteae 6-8 lin. longae subulatae 3-5-nerviae. Sepala integra, dorso carinata rubescenti-pallida glanduloso-fimbriata. Corolla 8-10 lin. longa e basi aequaliter in tubum subcylindricum ampliata, labio utroque horizontaliter porrecto, superiori bilobo, inferioris lobis aequalibus subrotundis denticulato-ciliatis. Stamina superne glabra, antherae brunneae tenuiter mucronatae. Stigma ex stylis apice uncinato pendulum biglobosum immarginatum glabrum laeve v. minutissime papillosum colore chromatis plumbi. — Crescit parasitice in *Libanotide montana* (in Unter-Hessen bei Allendorf).
15. *C. CRASSISTYLA* F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVII. 131. — Sepalis obsolete plurinerviis e basi ovata lanceolato-subulatis indivisis v. dente brevissimo bifidis, tubum corollae aequantib.; corolla campanulata, dorso arcuata, extus glanduloso-pilosa, labiis inaequalib. denticulatis, lobo intermedio labii inferioris lateralib. longiore; staminib. prope basin corollae insertis, inferne sparsim pilosis, apice styloq. glanduloso-pilosis; stylo crasso. ♀ — Species dubia habitu *O. Epithymi*. — *O. comosa* Sprunner mss. — Crescit parasitice in radicibus *Cisti* cuiusdam in Graecia.
16. *O. PUNCTATA* F. W. Schultz l. c. — Sepalis uni- v. obsolete plurinerviis, ex ovata basi lanceolato-subulatis indivisis v. bifidis, margine fimbriato-glandulosis, corollae tubum aequantib.; corolla campanulata, dorso arcuata, extus tuberculis atro-violaceis punctata pilisq. glandulosa et venis violaceo-purpureis longitudinaliter picta, labiis inaequaliter denticulatis, lobo intermedio labii inferioris lateralib. longiore; staminib. prope basin corollae insertis, inferne squamis pilosis, apice styloq. glanduloso-pilosis. ♀ — Habitus *O. Epithymi*, cuius forte varietas. — Crescit parasitice in *Cisto* quodam in Graecia.
17. *O. EPITHYMUM* DC. Flor. Franc. III. 490. — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 887. 888. 889. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 535. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. IV. t. 251. — Sepalis plurinerviis lanceolatis subulato-acuminatis tubo corollae longiorib. indivisis v. dente divaricato bifidis; corolla campanulata, dorso leviter arcuata, extus labioq. superiore intus glanduloso-pilosis, pilis tuberculo minutissimo insidentib., labiis inaequalib. acute dentatis, margine crispatis, superiore apice paullo sursum curvato bilobo, lobis patentib., lobo intermedio labii inferioris lateralib. duplo longiore; staminib. prope basin corollae insertis, inferne sparsim pilosis, apice styloq. glanduloso-pilosis; disco stigmatis velutino margine elevato destituto. ♀ — Planta plerumque 5-6-pollicaris, viva sordide lutescens, saepe colore purpureo suffusa. Stigma obscure purpureum, antherae fuscae nec albae. — *O. rubra* Sm. Engl. bot. t. 1786. — Hook. Flor. Londin. t. 105? — Wallroth, Gener. Orob. διασχευή 43. †?? — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 885. — *O. sparsiflora* Willrth. Schedul. critic. 309. — *O. paradoxa* Koch mss. — *O. nuda* Koch mss. — *O. major* Wolf mss. — *Epithymum* Marant. Method. 175. [Willrth. Gener. Orob. διασχευή 48. †].
- β. rubiginosa*: glandulis pallide rubiginosis adspersa: corolla longior angustior obscure fusco-purpurea, labio superiori protracto subtruncato, lobulis deflexis, antherae flavae, stigma aurantiacum. — *O. rubiginosa* Alb. Dietr. Flor. Borussic. III. t. 252., Flor. Marchic. 331. — Crescit parasitice in radicibus *Thymi Serpylli* in ericetis campisque incultis per totam Germaniam, Galliam, Helvetiam et Britaniam.
18. *O. LYCICA* F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVII. 128. — Sepalis plurinerviis ovatis bifidis, dentib. lanceolato-subulatis tubum corollae aequantib. longioribq., rarissime dente altero sepali unius truncato; corolla tubuloso-campanulata, dorso

curvata, fauce ampliata, labiis inaequaliter acuteq. dentatis, superiore bilobo, staminib. sub medio tubi insertis, a basi ad medium subvillosis. ♀ — Habitus *O. rubentis* et *O. Epithymi*. — Crescit ad Lycos in Attica.

19. *O. APICULATA*^{*)} Wllrth. Gener. Orob. διασκευή 50. † — (Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 58. adnot.) — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 878?? — Ochracea, palmaris, basi subaequalis: bracteis corollae homochroae tubum subaequantib.; sepalis 1-2-nerviis subulatis bifidisq.; corollae tubo erecto-patente, dorso arcuato, limbo patente; staminib. suprabasilarib., inferne sparsim pilosis; stigmate saturate flavo. ♀ — Caulis pallide ochraceus, squamae fuscescentes. Spica brevis, bracteis semipollicaribus ovato-lanceolatis 3-5-nerviis. Sepala 3-4 lin. longa bifida, dorso convexa binervia diaphana glandulosa. Corolla 6-8 lin. longa pallide ochracea nec rubescens, e basi aequaliter in tubum dorso arcuatam dilatata, apice declivis, labio superiori bilobo reflexo brevi, inferioris lobis patentibus, medio laterales latitudine duplo superante. — Crescit parasitice in radicibus *Pelargonii graveolentis* in ollis hortorum (in Thuringia) et in radicibus *Libanotidis montanae* (in Unter-Hessen bei Alendorf.)
20. *O. DIAPHANA* F. W. Schultz Flora (B. Z.) XXVII. 130. — Sepalis trinerviis dia-phanis lanceolatis indivisis, corollae tubum vix aequantib.; corolla tubuloso-cam-panulata, dorso vix curvata, labiis inaequaliter denticulatis, superiori paullo sur-sum curvato; staminib. supra basin corollae insertis, basi subvillosis. ♀ — Habitus *O. Galii*, cuius forte varietas. — Crescit in Graecia (in Phtiotidi).
21. *O. GALII* Duby, Bot. Gallic. I. 349.**) — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 892-895. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. III. t. 146. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 535. —

*) Eadem esse dicitur ac *O. Hederae*, quam conferas infra pag. 472. no. 40.

**) Ad hanc pertinere videntur sequentes, quas pro varietatibus habeo:

1. *O. ADENOSTEMON* Rchb. Plant. critic. VII. fig. 894., Fl. Germ. excurs. 354. no. 2414. — Robusta testaceo-ochracea, superne tota glandulosa: corolla ampliata, labii inferioris laciinis planis rotundatis; sepalis bifidis (antice?) cohaerentib.; stylo filamentisq. glanduliferis; stigmate divaricato-bigloboso. ♀ — Crescit pa-rasitice in radicibus Galii Molluginis (bei Dresden).
2. *O. KRAUSEI* Alb. Dietr. Flor. Borussic. VII. t. 437., Flor. Marchic. 332. † — Glandulosa: squamis lineari-lanceolatis; spica brevi densa; bracteis quam flores breviorib.; sepalis bifidis, laciinis inaequalib. acutis; corolla tubulosa subrecta, labiis crenulatis, superiori subtruncato emarginato, lobulis demum reflexis, in-ferioris patentis laciinis oblongis rotundatis, media majori; filamentis inferne villosis, superne glandulosis; stylo glanduloso, stigmate obverse reniformi late-ritio. ♀ — Planta 6-8-pollicaris pallide sulphurea, glandulis aureis obsita. Spica 2-3-pollicaris, bracteae lanceolato-lineares. Flores pallide sulphurei sub-rubicundi semipollicares. — Crescit parasitice in radicibus Galii veri (bei dem Dorfe Berge hinter dem Städtchen Nauen in der Mark Brandenburg).
3. *O. MACRANTHA* Alb. Dietr. Flor. Borussic. VII. t. 438., Flor. Marchic. 334. † — Glandulosa: squamis inferiorib. subrotundis, subito acuminatis, superiorib. li-neari-lanceolatis; spica elongata; bracteis flores excedentib.; sepalis unico colla-riformi quadrifido, laciinis acuminatis, exteriorib. majorib.; corolla maxima curvata, labiis crenulatis, superiori emarginato porrecto, inferioris trilobi laci-nia media majori; filamentis inferne villosis, superne glandulosis; stylo glandu-loso, stigmate divaricato-biglobuloso purpureo. ♀ — Planta bipedalis pallide fusca rubro-suffusa, glandulis aureis obsita, basi tuberoso-incrassata. Spica ultra semipedalis remotiflora. Sepala antice coalita. Corolla ultra pollicaris valde incurva flavescenti-ferruginea. Flores Dianthus redolent. — Crescit pa-rasitice in radicibus Galii (bei dem Dorfe Berge ohnweit des Städtchens Nauen in der Mark Brandenburg).
4. *O. TORQUATA* Rchb. Plant. critic. VIII. fig. 1128. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. IV. t. 440., Flor. Marchic. 335. † — Glandulosa: squamis inferiorib. ex ovali basi longe acuminatis; spica elongata; bracteis corollam fere aequantib.; sepalis antice coalitis in phyllum collariforme quadrifidum, laciinis exteriorib. linearib., intermediis abbreviatis; corolla subcurvata, labiis crenulatis, superiori galeato emarginato, inferiori trilobo, laciinis subaequalib.; filamentis inferne villosis, superne glandulosis; stylo glanduloso; stigmate biglobuloso purpureo. ♀ — Si-millima praecedenti, sed differt floribus minoribus rectioribus bractea semper longioribus calycisque laciinis intermediis abbreviatis obtusissimis. — Crescit pa-rasitice in radicibus Galii (bei dem Dorfe Berge ohnweit des Städtchens Nauen in der Mark Brandenburg).

Sepalis plurinerviis subaequaliter bifidis, tubum corollae dimidium aequantib., antice contiguis connatisq.; corolla e basi sensim ampliata campanulata, dorso curvata, labiis inaequaliter denticulatis, superiori galeato, laterib. porrectis (non patentibus), labii inferioris laciniis ovatis subaequalib. porrectis, tubo dimidio breviorib.; staminib. supra basin corollae insertis dense pilosis, superne styloq. glanduloso-pilosis; disco stigmatis velutino margine elevato destituto. ♀ — Stigma obscure purpureum. — *O. caryophyllacea* Sm. Transact. of the Linn. Soc. IV. 169. — C. A. Meyer in Ldb. Flor. Altaic. II. 452. † — Wllrth. Gener. Orob. διασκευή 35. † (excl. syn. plurib.). — *O. vulgaris* DC. Fl. Franc. III. 489. — *O. Bi-pontina* F. W. Schultz, Beitr. zur Knntnss. der deutsch. Orob. 7. — *O. caryophyllacea* Rchb. Fl. Germ. excurs. 353. no. 2412., Plant. critic. VII. fig. 890. 891. — *O. strobiligena* Rchb. Plant. critic. VII. fig. 905. 906., Flor. Germ. excurs. 355. no. 2420. — *O. laxiflora* Rchb. l. c. no. 2421., Plant. critic. VII. fig. 908. 909. 910. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. IV. t. 253. † — *O. major* Pollich, Fl. Palatin. II. 200. — *O. tubiflora* Alb. Dietr. Flor. Borussic. III. t. 147. — *O. mutila* Dumort. Florul. Belgic. 33. [diagnosis pessima!!!] — Crescit parasitice in radicibus *Galii veri* et *Molluginis* per totam Germaniam, Britanniam, Galliam, Helvetiam et in Rumelia.

22. *O. GLABRATA* C. A. Meyer in Eichwld. Plant. nov. Casp. Caucas. 16. † t. 17. — Furfuracea: squamis subfloralib. linearib. florem aequantib.; sepalis indivisis linear-i-lanceolatis; corollae subcampanulatae rectiusculae labio inferiore paullo breviore, lobis obtusis denticulatis, intermedio longiore; filamentis basi glaberrimis, apice styloq. subglandulosis; stigmate emarginato. ♀ — Scapus quinquepollicaris. Corolla (sicca) sordide et obscure rufa faucem versus paullo ampliata semipollicaris. — Accedit ad *O. Galii* formas minores paucifloras, satis tamen differt staminibus basi glabris nec hirsutis laciniaque media labii inferioris longiori. — Crescit in Kachetia.

23. *O. AVELLANAE* Pfund, Flora (B. Z.) XXVI. 183. † — Sepalis plurinerviis subaequaliter bifidis, margine antico dente unico instructis contiguis v. coalitis, tubum corollae dimidium subaequantib., laciniis lanceolatis acutis; corolla tubuloso-campanulata antrorsum curvata, labiis obtuse v. obsolete denticulatis glanduloso-ciliatis, superiori obtusissime emarginato, lobis duobus acutis patentib. diviso, inferiori inaequaliter trilobo; filamentis supra basin corollae insertis, interne pilorum tensorum serie munitis styloq. superne glanduloso-pilosis; stigmate laevi. ♀ — Scapus 8-10-pollicaris pallide mellitus glandulosus. Squamae lanceolatae longe acuminatae fuscae. — Crescit parasitice in radicibus *Coryli Avelanae* in Bohemia (bei Prag in einem Wäldchen „dem Sterne").

24. *O. RUBENS* Wllrth. Gener. Orob. διασκευή 46. † — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 535. — Sepalis plurinerviis late ovatis subulato-acuminatis, antice posticeq. dente instructis v. inaequaliter bifidis, tubum corollae subaequantib., antice

5. *O. GILVA* Alb. Dietr. Flor. Borussic. VII. t. 439., Flor. Marchic. 336. † — *Glandulosa*: squamis inferiorib. imbricatis oblongis; spica elongata, inferne laxa; bracteis florum longitudine; sepalis antice coalitis in phyllum collariforme quadridatum, laciniis acutis, exteriorib. sublongiorib.; corolla subcurvata, labiis crenulatis, superiori galeato emarginato, inferiori trilobo, lacinia media parum longiori; filamentis inferne villosis, superne glandulosis; stylo glanduloso; stigmate divaricato-biglobuloso purpureo. ♀ — Planta pedalis colore ceraceo-flavo, basi vix incrassata. Flores magnitudinej *O. Krausei* sed magis incurvati. — Crescit parasitice in radicibus Galii (bei dem Dorfe Berge öhnweit des Städtchens Nauen in der Mark Brandenburg).

6. *O. CITRINA* Alb. Dietr. Flor. Borussic. VII. t. 441., Flor. Marchic. 336. † — *Glandulosa*: squamis inferiorib. paucis oblongis; spica densiuscula, apice comosa; bracteis flores excedentib.; sepalis antice coalitis in phyllum collariforme quadridatum, laciniis acutis, exteriorib. longiorib.; corolla curvata, labiis subcrenulatis, superiori galeato emarginato, inferioris trilobi porrecti laciniis subaequalib.; filamentis inferne villosis, superne glandulosis; stylo glanduloso, stigmate purpureo incrassato bifido. ♀ — A praecedentibus differt colore pallide citrino tum scapi, quam florum, et stigmate minutissime bifido. — Crescit parasitice in radicibus Galii (bei dem Dorfe Berge öhnweit des Städtchens Nauen in der Mark Brandenburg und bei Baumgartenbrück hinter Potsdam).

contiguis v. coalitis; corolla e basi curvata tubulo - campanulata, dorso recta, apice galeata declivi, labiis inaequaliter dentatis, superiore bilobo, lobis patentib., labii inferioris ovatis subaequalib., lateralib. patentib.; staminib. in curvatura corollae insertis a basi ad medium dense pilosis; stigmatis disco velutino margine elevato destituto. 24 — Corolla 9-10 lin. longa tubulosa, tubo supra basin conspicue curvato, dorso recto v. subimpresso, labio superiori insigniter galeato et curvato apiceque paullo sursum curvato haec species statim dignoscitur. Stigma cerino-flavum. — *O. elatior* Koch et Ziz. Cat. pl. Palat. 12. — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 901. 902. — *O. elatior* Sutton, Transact. of the Linn. Soc. IV. t. 17. — Engl. bot. t. 568. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 354. no. 2418. — Alb. Dietr. Flor. Boruss. III. t. 148., Flor. Marchic. 330. — *O. Bueckii* Alb. Dietr. Flor. Borussic. III. t. 145., Flor. Marchic. 329?*) — *O. lutea* Baumg. — *O. Medicaginis* F. W. Schultz, Ann. d. Rgnnsbrgr. Gsllschft. V. 505. — Crescit parasitice in radicibus *Medicaginis falcatae* et *sativa* per Germaniam et Galliam.

25. *O. GRANDISEPALA* F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVII. 128. — Sepalis plurinerviis ellipticis, apice tridentatis corollam aequantib. v. superantib., dentib. subulatis, superiori inferiorib. duplo v. quadruplo longiore; corolla tubulosa subcampanulata subarcuata, laciniis denticulatis; staminib. infra medium tubi insertis, a basi ad medium parce pilosis. 24? — Planta magna bipedalis et altior, flores magnitudine florum *O. minoris*, habitus vero *O. rubentis* v. *O. Centaureae*. — In Graecia ad Naupliam crescit.
26. *O. SUBVERTICILLATA* F. W. Schultz l. c. — Sepalis obsolete quinquenerviis ovatis inaequaliter bifidis v. indivisis tubum corollae aequantib.; corolla tubulo - campanulata arcuata, labiis inaequaliter denticulatis, superiore vix bilobo; staminib. in curvatura corollae insertis, a basi ad medium subvillosis. 24 — Habitus *O. rubentis*, sed flores paullo minores. — Crescit parasitice in radicibus *Viciae* cuiusdam prope Thebas in Graecia.
27. *O. LILACINA* F. W. Schultz l. c. 129. — Sepalis obsolete 1-3-nerviis, e basi ovata subito subulatis indivisis v. dente brevi auctis tubum corollae aequantib. v. superantib.; corolla tubulo - campanulata, dorso leviter arcuata, labiis obsolete denticulatis, lobis rotundato-truncatis subaequalib.; staminib. sub medio tubi insertis, inferne pilosis. 24 — Habitus *O. rubentis*, sed minor. — Crescit in Graeciae provincia Attica.
28. *O. LORICATA* Rchb. Fl. Germ. excurs. 355. no. 2423. (excl. synon.) — Koch, Synops. fl. German. (edit. 1.) 536. — [Alb. Dietr. Flor. Borussic. IX. t. 580?] — Sepalis 3-5-nerviis bipartitis tubum corollae aequantib.; corolla tubulo - campanulata dorso recta, apice antrorsum curvata, labiis obtuse denticulatis, superiore bilobo, lobis patentib.; staminib. sub medio tubi insertis glabris, basi parce pilosis; stigmatib. disco.....? 24 — Sepala angusta profunde divisa, corollam aequantia v. superantia, corolla 7-8 lineas longa, a basi ad labium inferius usque recta, in dorso labii superioris tantum paullo curvata, labium bilobum patens, stamina parce pilosa, alte supra finem tertiae partis tubi inserta. — *O. elatior* Schleich. Pl. exsicc. — *O. Artemisiae campestris* Gaud. Fl. Helvet. IV. 479. — (*O. major* Bull. Herb. t. 359?) — Crescit parasitice in radicibus *Artemisiae campestris*

*) *O. BUECKII* Alb. Dietr. l. l. c. — Scapo glabro sesquipedali; squamis inferiorib. ex ovata basi lanceolatis, superiorib. lanceolato-linearib.; spica elongata; bracteis longitudine tubi corollini; sepalis inaequaliter bipartitis, segmentis lanceolatis acutis; corolla tubulosa, labiis denticulatis, superiori erecto emarginato, lobulis revolutis, inferioris deflexi laciniis rotundatis, intermedia longiori; filamentis puberulis; stylo glabro; stigmate divaricato-biglobuloso flavo. 24 — Tota fusco-virens v. purpurascens. Spica 6-8-pollicaris laxa. Bracteae lanceolato-lineares multinerves. Sepala virescenti-fusca ciliata. Corolla pollicaris molliter pilosa ex virescenti fusca, nervis purpureis percursa. Stylus apice purpurascens, stigma cerino-flavum. — Flores spargunt odorem Convallariae majalis. — Crescit parasitice in radicibus *Medicaginis falcatae* prope Frankofurtum ad Viadrum.

in montosis incultis (auf den Westersbergen bei Aschersleben und bei Frankenhausen in Thüringen, auch im Canton Wallis).

29. **O. GALLICA** Grénier, Flora (B. Z.) XXII. 576. — Sepalis indivisis corolla dimidio minorib.; corolla tubulosa, tubo ad medium curvato coaretato, dein subeylindrico, laciniis labii inferioris tribus subaequalib. obovatis fimbriatis saepeq. mucronatis, labio superiori retuso tenuiterq. denticulato; staminib. glabris infra medium tubi insertis; ovario stigmateq. glabris; corollis praesertim intus intense coeruleis. ♀ — Crescit parasitice in radicibus *Artemisiae Gallicae* in Gallia australi.
30. **O. PICRIDIS** F. W. Schultz mss. in Koch, Dtschlnd. Flor. IV. 453., Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 536. — Sepalis uni-binerviis integris v. antice dente auctis tubum corollae superantib.; corolla tubuloso-campanulata, dorso recta, apice antrorum curvata, labiis obtuse denticulatis, superiori integro, margine laterali patulo; staminib. fere in medio tubi insertis, a basi ultra medium dense pilosis, superne verruculoso-scabrellis; stigmatis disco sublaevi granulis minutissimis obtusissimis dense obtecto. ♂ — Stigma sordide violaceum. Simillima *O. loricatae*, sed caulis superne et bracteae multo magis villosae, sepala uninervia, rarius dente aucta et tunc trinervia, corolla superne paullo magis antrorum curvata, labium superius integrum, stamina a basi supra medium dense pilosa et supra verruculosa. Quam *O. flava* pilosior est, sepala corollae tubum superant, corolla dorso multo minus curvata est et labium superius integrum, lateribus vix patulis, nullo modo refractis, filamenta longiora, apice multo minus curvata sunt, stigma ultra filamentorum curvaturam prominet sordide violaceum nec cerino-flavum, latius et in disco subtiliter granulatum non cicatrisatum. Ab *O. lucorum* differt: corolla recta, antice tantum paullo curvata, labiis obtuse crenulatis, labio superiore integro, insertione staminum altiore et stigmate subtiliter granulato. — Crescit parasitice in radicibus *Picridis hieracioidis* in Germania.
31. **O. STIGMATODES** Wimmer, Flora v. Schlesien 280. — Sepalis subaequaliter bifidis, laciniis rectis lanceolatis, apice contiguis v. coalitis enerviis, tubo corollino paullo breviorib.; corolla tubuloso-campanulata, dorso arcuata, labio superiori obsolete trilobo, lobis rectis, laciniis labii inferioris subaequalib. oblongo-ovatis, omnib. margine erosio-dentatis; staminib. suprabasilarib., infra villosopubescentib., supra glandulosis arcuatim deflexis; stylo parce glandulifero. ♀ — Stigma e labio superiori exsertum, primum cerino-flavum, tunc aureum holosericeum capitato-bilobum. Scapus 1-1½-pedalis. Spica semipedalis densiflora 20-30-flores exhibens. Sepala saepe antice in phyllum collariforme quadrifidum coalita. — Crescit parasitice in radicibus *Centaureae Scabiosae* in agris Silesiae (bei den Gypsgruben bei Dirschel in Oberschlesien).
32. **O. FLAVA** Martius mss. apd. F. W. Schultz, Beiträge zur Kntnss. d. deutschen Orobanchen 9. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 536. — Sepalis uninerviis v. obsolete trinerviis integris v. antice dente auctis tubum dimidium aequantib.; corolla tubuloso-campanulata, dorso curvata, labiis denticulatis, superiori bilobo, lobis reflexis retrorsum accumbentib.; staminib. fere in medio tubi insertis, a basi ultra medium dense pilosis; stylo glabro, stigmatis disco verrucoso-cicatrizzato. ♀ — Valde insignis est lobis labii superioris refractis et postice sibi contiguis. Tota cerino-v. dilute flava, corolla 7 lineas longa, stamina longiora apice manubrii instar valde arcuata et descendenta, stigma cerino-flavum. — Crescit parasitice in radicibus *Tussilaginis niveae* (auf den Sägar-Auen bei München).
33. **O. LUCORUM** Alex. Braun mss. apd. Schultz, Annalen der Gwchsknde. V. 504. — Koch l. c. 537. — Sepalis binerviis inaequaliter bifidis, tubum corollae aequantib.; corolla tubuloso-campanulata, dorso curvata, labiis subtiliter glandulosociliatis obsolete denticulatis, superiore bilobo, lobis patentib.; staminib. prope basin corollae insertis a basi supra medium dense pilosis; stylo glabro, stigmatis disco laevi velutino. ♀ — Insigniter differt a praecedente: colore flavo-rubente, corolla ampliore, rictu multo majore, lobis patentibus non refractis, filamentis longioribus apice multo minus curvatis, stylo ultra staminum curvaturam emerso

et stigmate majore fusco-rubro profundius bilobo, velutino nec verrucoso-cicatrizado. — *O. loricata* Rchb. Plant. critic. VII. fig. 918. — An etiam Alb. Dietr. Flor. Borussic. IX. t. 580.??? — Crescit parasitice in radicibus *Berberidis vulgaris* (bisher bloß im Englischen Garten zu München und in den baierschen Alpen bei Partenkirchen beobachtet).

β . *Rubi* Alex. Braun mss. apd. Koch, Dtschlnd. Flora IV. 458. (nec Vauch.) — Florib. paullo majorib. et amplioribus. — *O. Rubi* Duby, Bot. Gallic. 350. — Crescit parasitice in radicibus *Rubi caesii*.

34. *O. ARCUATA* F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVII. 129. — Sepalis obsolete 2-3-nerviis e basi ovata lanceolatis integris v. dente divaricato tenuissimo bifidis, tubum corollae aequantib.; corolla tubulosa arcuata horizontaliter patente et penes sursum curvata, tubo supra ovarium vix coarctato et fauce ampliata, laciniis denticulatis rotundatis, labio superiori inferiori multo majori; staminib. supra basin corollae insertis et ultra medium villoso-pilosus. ♀ — Species parva pilis albidis sparsim lanuginosa, floribus xerampelinis brevioribus quam *O. minoris* instructa. — Crescit in Graeciae provincia Attica.
35. *O. KLUGEI* Schmitz et Regel, Flora Bonnens. 190. — Sepalis corollae tubum aequantib. e basi ovato-oblonga bifidis binerviis, laciniis subaequalib. subulato-acuminatis; corolla tubulosa superne leviter antrorsum curvata, extus laevi, dorso glanduloso-pubescente, labio superiori emarginato eroso-denticulato, demum erecto, inferioris trilobi laciniis lateralib. e basi ovato-subrotunda acuminatis obsolete trifidis cuspidatis acute dentatis, media majori acute denticulata, saepissime nervo medio excurrente cuspidata; staminib. supra basin insertis sparse pilosulis; stylo glabro, stigmate cerino-flavo. ♀ — Planta pedalis v. sesquipedalis eleganter carneo-purpurea glanduloso-pubescentis nitida. Bracteae floribus longiores pallide purpurascentes. Spica elongata apicem versus densiflora subcomosa. Corolla 6-8 lin. longa dorso laete purpurascens, antice pallida, venis intensius coloratis percursa. — Crescit parasitice in radicibus *Trifolii medii* (bei dem Dorfe Linz in der Nähe von Bonn bisher allein gefunden).
36. *O. PARVILOBA* F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVII. 128. — Sepalis obsolete 3-6-nerviis e basi ovata lanceolato-subulatis bifidis, rarissime indivisis corollae tubum superantib.; corolla tubulosa subarcuata, laciniis parvis obsolete denticulatis; staminib. infra medium tubi insertis sparsim villoso-pilosus. ♀ — Habitus *O. Salviae*. Planta praesertim in inflorescentia pilis albidis subvillosa, exsiccata griseo-ochroleuca. — Crescit in Graecia ad Naupliam.
37. *O. SALVIAE* F. W. Schultz, Annalen der Gwchsknde. V. 505. — Koch, Synops. fl. German. (edit. 1.) 537. — Sepalis uninerviis inaequaliter bifidis tubum corollae superantib.; corolla tubuloso-campanulata, dorso curvata, labiis denticulatis subciliatis, superiori bilobo, lobis porrectis; staminib. supra basin corollae insertis, a basi ultra medium dense pilosis, superne pilis glanduliferis parce adspersis; stigmatis disco velutino. ♀ — Stigma intense cerino-luteum. Simillima *O. lucorum*, a qua differt sepalis semper uninerviis, labiis copiose denticulatis, lobis labii superioris semper porrectis nunquam patentibus stigmateque cerino-flavis. — Crescit parasitice in radicibus *Salviae glutinosae* in subalpinis (in den Salzburger Alpen, der Ramsau bei Berchtesgaden und in den Baierschen Alpen zwischen Lengries und der Glashütte).
38. *O. CAROTAE* Moulins, Ann. sc. nat. III. 78. † — Scapo gracili, leviter striato, basi non aut vix incrassato; squamis baseos paucis, laxis elongatis acutis, reliquis perinde paucis, angustis, apice reflexis; spica densa laxave, brevi, dimidium scapum nunquam aequante; sepalis semper profunde bifidis; corolla parva, cylindracea, gracili, incurva; staminib. longe supra corollae basin affixis, basi villosis, stigmate violaceo. ♂ — Planta 10-22-pollicaris rubro-violacea. — Crescit parasitice in radicibus *Dauci Carotae* in Gallia (prope Lanquais).
39. *O. MINOR* Sutton, Transact. of the Linn. Soc. IV. 178. — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 876. 877. 879. 880., Fl. Germ. excurs. 353. no. 2407. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 587. — Sepalis plurinerviis, e basi ovata subito anguste subulatis

bifidisve, laciniis subulatis tubum corollae aequantib. v. longiorib.; corolla tubulosa arcuata, labiis obtuse denticulatis venosis undulatis, superiore bilobo porrecto, lobis labii inferioris subrotundis subaequalib.; staminib. sub medio tubi insertis glabris, inferne pilis sparsis obsitis. ♂ — Stigma purpureum v. lilacinum. Similis *O. amethysteae*, differt tamen bracteis e basi ovata lanceolatis, tubum v. etiam corollam aequantibus, corolla aequilata quidem, sed breviore tubulosa sensim curvata, nec subito in genu flexa, labiis rotundatis obtuse denticulatis staminibusque minus alte insertis. — *O. arvensis* Dumort. Florul. Belgic. prodr. 33? (diagnosis pessima). — Crescit parasitice in radicibus *Trifolii pratensis* (bei Bonn, in den Cäntonen Waadt und Wallis, so wie bei Fiume in Istrien).

40. **O. HEDERAE** Vauch. Monogr. Orob. 56. t. 8. — Schmitz et Regel, Flora Bonnens. 191. — (Moulins, Ann. des sc. natur. III. 80. †) — Scapo gracili valde striato, basi in sphaeram incrassato; squamis baseos latis imbricatis, reliquis laxis lanceolatis acutis; spica longissima dense multiflora; sepalis magis minusve bifidis, saepius integerrimis; corolla parva cylindracea gracili incurva, fauce coarctata, laterib. compressissima; staminib. longe supra tubi basin affixis, basi parce pilosis (pilis deciduis), posticis ab invicem remotissimis; stigmate luteo. 2 — Planta 6-21-pollicaris e luteo violascens. Odor levissime mellitus. Stamina postica saepe abortiva. — *O. barbata* Poir. et Rchb. Plant. critic. VII. fig. 881. 882., Rchb. Fl. Germ. excurs. 353. no. 2408. — Crescit in radicibus *Hederae Helicis* in Europa australiori.

41. **O. AMETHYSTEAE** Thuill. Fl. Paris. II. 317. — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 920. 921. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 355. no. 2425. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 538. — Sepalis 3-6-nerviis e basi ovata subito angustata subulato-attenuatis bifidisve, laciniis angustis subulatis corollam aequantib.; corolla tubulosa, basi subito in genu flexa et antrorum curvata, deinde rectiuscula, labiis inaequaliter acute denticulatis undulato-crispis ramoso-venosis, superiore galeato porrecto emarginato v. subquadrilobo, lobis lateralib. labii inferioris subbilobis, intermedio duplo majore 2-3-fido; staminib. corollae curvatura insertis glabris, inferne sparse pilosis. 2 — Caulis violaceus v. purpureus, flores albidi v. dorso leviter lilacini v. toti lilacini venisque purpureis picti. Stigma fuscum v. rubro-fuscum. — *O. Eryngii* Duby, Bot. Gallic. I. 350. — *O. elatior* β. *microglossa* Wllrth. Gener. Orob. διασκευή 51. — Crescit parasitice in radicibus *Eryngii campestris* in Europa occidentali-australi.

42. **O. HISPANICA** Boiss. Voyage bot. dans le midi de l'Espagne no. 1282. — Caule simplici parce puberulo, spica densa; florib. bractea unica ovato-triangulari acuta nigricante glabrescente parallela sulcato-striata suffultis; calycis disepali glabriusculi sepalis multinerviis subbicarinatis, ad tertiam partem bifidis, lobis acutis bracteam aequantib., corolla dimidio breviorib.; corolla parva glabrescente, coerulea incurva, supra ovarium coarctata, limbi vix ampliati lobis rotundatis subintegris; antheris paullo infra corollam dimidiata insertis glaberrimis. 2 — Crescit in arenosis Hispaniae australis.

43. **O. FRAGRANS** Koch, Dtschlnd. Flor. IV. 463., et Synops. fl. German. (edit. 1.) 538. — Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 58. — Sepalis integris v. inaequaliter bifidis; corolla basi tubulosa, superne sensim ampliata, dorso curvata; staminib. in medio tubi insertis e basi arcuato-patenti ascendentib., inferne pilosis, superne glabris; sacculis antherarum breviter tenuissimeq. mucronatis. 2? — Planta etiam exsiccata fragrans. — *O. coerulea* Friv. Hb. — Crescit in Austria inferiore et in Macedonia.

44. **O. CURVIFLORA** Viviani, Plantar. Aegypt. decad. 22. no. 29. t. 2. fig. 17. — Furfuraceo-hirsuta: scapo squamoso; spica compacta multiflora; bracteis ovatis acutis corolla duplo breviorib.; calyce bipartito, laciniis bifidis, lacinia altera linearis-obtusa, altera antica ovata; corollae tubo (candido) incurvato cylindraceo, labio superiore bilobo, laciniis subrotundo-ovatis crenulatis, inferioris tripartiti subaequalib. similis, omnib. crenulatis coeruleis, germine staminib. corollaq,

- glaberrimis. ♀ — Filamenta brevia medio tubo inserta. Corolla fere rectangule curvata. — Crescit parasitice in radicibus *Phoenicis dactyliferae* in Aegypto.
45. **O. FERRUGINEA** C. Koch, Linnaea XVII. 291. — Simplex, superne pilis ferrugineis obtecta: squamis raris minutis; bracteis ovato-lanceolatis; sepalis lanceolatis corolla ampliata minorib. minusq. denticulatis; labio corollae superiori galeato truncato, inferioris laciniis subaequalib.; staminib. et pistillo glaberrimis. ♀? — Species non sufficienter descripta! — Crescit in planicie ad Araxen sita.
46. **O. COERULESCENS** Stephan mss. in Willd. Spec. plantar. III. 349. — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 925. — Fl. Germ. excurs. 356. no. 2427. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. VIII. t. 511. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 538. — Sepalis indivisis bifidisq. tubo corollae longiorib.; corolla tubulosa, tubo curvato, inferne ovato, supra ovarium coarctato, laciniis labii inferioris concavis; staminib. supra medium tubi insertis, basi parce pilosis. ♀ — Flores e minoribus coerulei. Spica lanatovillosa in speciminibus exsiccatis quasi mucore obducta. — Crescit parasitice in radicibus *Artemisiae campestris* ad ripas Danubii (bei Regensburg) et in planicie trans Araxen sita.
47. **O. COLORATA** C. Koch, Linnaea XVII. 291. — Rubro-brunnea glaberrima: squamis aequalib. ovato-lanceolatis, superiorib. flores excedentib., crassiusculis; sepalis ovato-lanceolatis ex basi subconnatis (antice? aut postice?); corollae carnosae labio superiori galeato bilobo, extus piloso, inferiore trilobo, palato intracto (?); filamentis glabris ex basi porrigentib. (?); stylo bicapitato (!!) glabro. ♀ — Species insufficienter descripta. — Crescit in Armenia.
48. **O. AMMOPHILA** C. A. Meyer in Ledeb. Flor. Altaic. II. 454. †, Ikon. flor. Ross. Altaic. illustr. t. 389. — Albo-lanata: squamis floralib. ovato-lanceolatis florem aequantib.; sepalis bifidis, lobis lanceolatis subaequalib. tubo corollae cylindraceae incurvae breviorib.; labiis corollae subaequilongis, lobis labii inferioris obtusis denticulatis subaequalib.; filamentis styloq. hirsutis, stigmate subbipartito; laciniis patentissimis. ♀ — Differt ab *O. coerulecente* sepalis minus profunde fissis tubo corollae brevioribus, corollis amoene saturateque coeruleis, filamentis styloque semper hirsutis et loco natali arenoso. — Habitat in deserto Kirghisico.
49. **O. BOREALIS** Turcz. Catal. pl. Baik. Dah. no. 877. in Bullet. de la soc. impér. des naturalistes de Moscou XV. no. IV. p. 722. — Albo-lanata: squamis caulinis floralibq. ovato-lanceolatis; sepalis bifidis, lobis lanceolatis subaequalib., tubo corollae cylindraceae incurvae breviorib.; labiis corollae subaequilongis, superiore profunde bifido, inferiore trifido, laciniis obtusis denticulatis subaequalib.; filamentis styloq. glabris; stigmate subbipartito, laciniis patentissimis. ♀ — Simillima *O. ammophila*, sed distinguitur genitalibus glabris atque labio superiore corollae profunde bifido. — In montosis deserti Soongoro-Kirghisici prope Ajagus.
50. **O. VARIEGATA** Wllrth. Gener. Orobanch. διασκευή 40. † — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 903. 904. — Flor. Germ. excurs. 354. no. 2419. — Scapo basi leviter in-crassato; squamis bracteisq. ovato-oblongis remotis furfuraceo-hirsutissimis, segmentis calycinis ovato-lanceolatis in dentes lineares aequales divis; corolla inflato-ventricosa, extus glanduloso-aspera dilutiore, intus purpurascens, labio superiore rotundato reflexo subintegro, inferiore trifido crispo, lobo intermedio productiore; staminib. basi interna styloq. hirsutiusculis; stigmate obcordato subdiviso. ♀ — Scapus pedalis purpurascens. Spica 15-20-flora oblonga. Bractea corollam subaequans. Sepala hirsutissima. Corolla dilute flavescens, intus satrate purpurascens, labium superius retractum, margine replicatum, inferioris lacinia media major plicato-gibbosa, laterales rotundatae. — *O. foetida* DC. Flor. Franc. V. 392? (nec Dsf.) — *O. Cytisi* Duby, Bot. Gallic. 349. — Crescit parasitice in radicibus *Sarothamni scopariae* in Sicilia et Germania australi (bei Innsbruck).
51. **O. RETICULATA** Wllrth. l. c. 42. † — Scapo subaequali, squamis ovato-oblongis munito; bracteis oblongo-lanceolata corollam aequantib. hirsuto-furfuraceis; calycis diphylli sepalis lanceolato-linearib. simplicib. corolla breviorib.; corolla

inflato-tubulosa glandulosa, labio superiore emarginato venis saturationib. dae-daleis nutrito, inferioris lobis rotundatis aequalib.; staminib. styloq. glabriusculis; stigmate sphaerico diviso. ♀ — *O. foetida* Lapeyr. Abr. Pyr. I. 358? — *O. elatior* Flügge mss. — Crescit in agro Tolotono.

52. *O. BRACTEATA* Vivian. Annali di Storia nat. IV. 235. — Calycib. bipartitis, laci-niis lanceolatis acuminato-setaceis, corollam subaequantib.; bractea antica lanceolato-acuminata florem superante; corollae labio superiore indiviso ovato-rotundato undulato, inferiore trilobo, lobis subaequalib. ovato-subrotundis crenato-undulatis; staminib. styloq. exsertis glabris. — Habitat in Corsica.

53. *O. FOETIDA* Dsf. Flor. Atlant. II. 59. t. 144. — Lnk. et Hffmnsgg. Flor. Portug. I. 316. † t. 62. — Willd. Spec. plantar. III. 348. — Wllrth. Gener. Orob. διασκευή 44. † — Scapo sensim in basin intumescente; bracteis lanceolatis acuminatis corollas superantib. squamisq. remotis conformib. hirsuto-furfuraceis; segmentis calycinis (sepalis) ovato-lanceolatis in dentes linearis-subulatos divisis; corolla inflato-tubulosa nervosa (atro-purpurea), labio superiore profunde emarginato, inferioris lacinia intermedia rotundata porrecta lateralibq. subtrifidis denticulato-crispis; staminib. glaberrimis; stigmate bilobo connivente. ♀ — Scapus sesquipedalis, spica spithamea speciosa 50-70-flora. — *O. barbata* Broter. Fl. Lusitan. I. 183. — *O. fusca* Lam. Encycl. méth. IV. 621. — *O. major* Lngsdrff. mss. — *Orobanche major* flore cucullato foetidissimo Tournef. Herb. — Crescit in arenosis maritimis Barbariae, Lusitaniae et Hispaniae.

54. *O. SORDIDA* C. A. Meyer mss. in Ledeb. Icon. flor. Ross. Alt. illustr. t. 386. — Ledeb. Flor. Altaic. II. 455. † — Pubescens: squamis floralib. oblongo-lanceolatis flore duplo breviorib.; sepalis liberis bifidis, lobis lanceolatis subaequalib.; corollae cylindricae incurvae labiis subaequilongis, lobis labii inferioris oblongis acutiusculis integerrimis planis, intermedio sublongiore; filamentis styloq. sub-hirsutis; stigmate bilobo. ♀ — Valde affinis sequenti, sed omnino distincta. Differt enim pilis albis brevibus densis in tota plantae superficie, squamis floralibus longioribus flore duplo (non triplo) brevioribus, corolla sordide flavescente v. dilutissime subfuscata (non amoene saturateque coeruleo-violacea), lobis labii inferioris integerrimis v. denticulis obsoletis perpaucis instructis (non crebre aperteq. denticulatis). — Crescit rarissima in locis rupestribus montium Arkaul in deserto Soongarico-Kirghisico orientali non procul a lacu Saisan-Noor.

55. *O. AMOENA* C. A. Meyer mss. in Ldb. Icon. flor. Ross. Alt. illustr. t. 385. — Ldb. flor. Altaic. II. 457. † — Glabriuscula: squamis floralib. ovato-lanceolatis flore triplo breviorib.; sepalis liberis bifidis, lobis linearis-lanceolatis subaequalib.; corollae cylindricae incurvae labiis aequilongis, lobis labii inferioris obtusiusculis denticulatis, intermedio sublongiore; filamentis basi hirsutiusculis, apice styloq. subglandulosis; stigmate bilobo. ♀ — Scapus semipedalis. Corolla amoene saturate violaceo-coerulea, extus glandulis paucis adspersa, intus glaberrima tubulosa, leviter incurva, fauce modice ampliata. — Ab *O. arenaria* M. B., quacum labio corollae superiore bifido convenit valde differt squamis floralibus angustioribus longioribus, sepalis bifidis, lobis elongatis non brevissime bidentatis corolla denique quadruplo majore minus incurva. — Crescit in locis rupestribus montium Arkaul in deserto Soongarico-Kirghisico orientali non procul a lacu Saisan-Noor.

56. *O. ARENARIA* M. Bieberst. Flor. Tauric. Caucas. II. 83. — Glabriuscula: squamis lanceolatis; spica pauciflora, squamis floralib. corolla breviorib. sepalisq. glabriusculis; sepalis bifidis; laci-niis corollae acutiusculis; staminib. glabris. ♀ — Corollae coeruleae labium superius bifidum. — *Orobanche Cretica procerior non ramosa, caule tenui, flore parvo subcoeruleo* Tournef. Cor. 10. — *O. Cumana* Wllrth. Gener. Orobanch. διασκευή 58. — Rehb. Plant. critic. VII. t. 691. fig. 926. — Crescit in Podolia, Bessarabia, Tauria et Caucasia locis arenosis.

57. *O. ALBA* Stephan in Willd. Spec. plantar. III. 350. — [C. Koch, Linnaea XVII. 291?] — Scapo fulvo-villoso, squamis lanceolatis remotis munito; bracteis ovatis acutis tubo breviorib.; calycis diphylli sepalis oblongis acutis; corollae tubulosae

labio superiori obcordato, inferioris laciniis subaequalib. rotundatis denticulatis, stigmate bilobo crasso. ♀ — Scapus semipedalis glanduloso — rufescenti — pilosus. Spica 1—3-pollicaris. Corolla speciosa alba cum purpura subeunte glandulosa. — *Orobanche major thyrsorum florum specioso* Buxb. Centur. III. t. 2. (nec III. 2. t. 1. fig. 2.) — Crescit in Caucasi graminosis ubertim.

§. 2. *Sepalis in parte posteriore basin versus concretis, antice liberis.*

58. O. MEDIA Dsf. Flor. Atlant. II. 59. — Scapo simplici piloso striato firmo; squamis adpressis ovatis v. ovato-lanceolatis; florib. dense spicatis; bracteis ovatis concavis calycem aequantib.; sepalis postice coalitis bifidis, laciniis anguste acutis; corolla curvata calycem duplo superante, labio superiore bilobo, inferiore trifido, lobis rotundatis subaequalib.; staminib. inclusis. ♀ — Corolla pallide flavescentia. — Crescit locis arenosis in Barbaria.
59. O. CERNUA Linn. Spec. plant. 882. — Wllrth. Gener. Orob. διασκευή 73. — Caule simplicissimo; corollis recurvatis; bracteis ovatis corolla breviorib.; scapo nudiusculo. ♀ — *Orobanche caule simplici, corolla incurva bracteis deltoideis longiore* Loeffl. Itin. 152. — Ex auctoritate Cl. C. A. Meyer species haec brevissime et valde insufficienter descripta huc relata est. — Crescit parasitice in radicibus *Artemisiae campestris* in aridis Hispaniae.
60. O. BICOLOR C. A. Meyer mss. in Ldb. Icon. fl. Ross. Alt. illustr. t. 390. — Ldb. Flor. Altaic. II. 458. † — Furfuracea: squamis floralib. ovatis acutis, flore subdupo longiorib.; sepalis bifidis v. indivisis, laciniis lanceolatis subaequalib.; corollae cylindricae incurvae labio superiore sublongiore bilobo, lobis labii inferioris parvis semiorbiculatis denticulatis subaequalib.; filamentis basi puberulis, apice styloq. glabris; stigmate emarginato. ♀ — Scapus 4—8-pollicaris. Sepala rarius indivisa, postice coalita, demum irregulariter erupta. Corolla valde incurva, fere semiannularis albida v. dilutissime violacea, limbo saturate violaceo. — *O. cernua* Pall. mss. — Crescit in deserto Soongoro — Kirghisico occidentali ad ripam rivuli Tschuganka versus radicem montis Tschingistau.
61. O. CANESCENS Bunge. Mém. des div. sav. de St. Ptersb. II. 124. — Albo-lanata: squamis floralib. ovatis acuminatis florem excedentib.; sepalis postice basi connatis, altero bifido, altero trifido, lobis linearib. inaequalib. corollae cylindricae incurvae labiis aequalib., superiore lato bilobo, inter lobos revolutos bidentato, lobis labii inferioris rotundatis denticulatis; filamentis styloque glabris, stigmate bilobo. ♀ — Flores intense coeruleo-violacei. — Typum novi generis praebere videtur, ab *Orobanchis calycis* sepalis altero bifido, altero trifido, et labio corollae superiore inter lobos bidentato diversi. — Crescit in Chinae borealis montosis Lun-Zyan-ssy.
- † *Species non satis notae.*
62. O. RIGENS Loisel. Flor. Gallic. 384. ex G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 628. no. 4. — Scapo glabro; squamis rigidis lanceolatis imbricatis pubescen-
tib.; florib. laxe spicatis; stylo staminibq. glabris; laciniis labii corollini inferioris acutiusculis; stigmatis bifidi lobis distantibus. ♀? — Crescit in Corsica. — Spe-
cies e diagnosi data omnino non recognoscenda (sed cf. infra no. 65.).
63. O. SANGUINEA Prsl. Delic. Pragens. 176. — Pubescens: scapo simplici squa-
moso; squamis floralib. flores subaequantib.; spicis densis; corollae laciniis ae-
qualib. obtusis denticulatis; staminib. glaberrimis. ♀ — Crescit in Sicilia.
64. O. PLATYSTIGMA Rehb. Plant. critic. VII. p. 31., Flor. Germ. excurs. 353. no. 2409. — Stigmatis lobis deplano — securiformib. complicatis; stylo apice glanduli-
gero; filamentis glabris; antheris in vertice atque fissura brevi villo dehiscentib.; corolla brevi ampliata. ♀ — Scapus robustus atropurpureus, bracteae sparsae
remotae, spica densissima, flores ampli e testaceo purpureo-striati glandulosi.
— Crescit in Germania australi (Trattberg im Salzburgischen).
65. O. NUDIFLORA Wllrth. Schedul. critic. I. 310., Gener. Orobanch. διασκευή 34. †
— Rehb. Plant. critic. VII. fig. 883. 884. 916. — Scapo subaequali; squamis brac-

teisq. ovatis parce hirsutiusculis; segmentis calycinis ovato-oblongis in dentes lineares subaequales bifidis; corolla ventricoso-subcampanulata inclinata glaberrima, labio superiore rotundato emarginato crenulato, inferioris lobis lateralib. subrhomboides, intermedio ovato porrecto breviorib.; staminib. styloq. glaberrimis, stigmate emarginato inflexo. ♀ — *O. rigens* Loisel. Fl. Gallic. II. 384? — *O. minor* Flor. Danic. t. 1219? — Crescit parasitice in radicibus *Pruni spinosae* (bei Lausanne).

66. *O. CRINITA* Viviani, Flor. Corsic. 11. — Scapo ad basin squamis linearib. elongatis obsito, squamis floralib. linearib. acuminatis, extus pilosis, flore longiorib.; corollis quadrifidis incurvis subcylindricis, lobis rotundatis crenato-ciliatis; filamentis capsulisq. glaberrimis; stigmate bilobo recurvo. ♀ — Spica elongata compacta, apice comosa. Corollae fulvae. — Crescit in Corsica prope San Bonifacio.
67. *O. CRENATA* Forsk. Aeg. Arab. 113. — Caule simplici villoso; corolla quinqueloba denticulato-crenata, stama includenter. ♀ — Crescit in Aegypto.
68. *O. PURPUREA* Linn. Suppl. 228. — Caule simplici ramosoq.; corollis quadrifidis; staminibus calcaratis. — Crescit in Promontorio bonae spei.

†† *Species e genere expellendae.*

- O. ABORTIVA* Leyss. = *PHELIPAEA ARENARIA*.
O. ACAULIS Rxb. = *AEGINETIA ACAULIS*.
O. AEGINETIA Linn. = *AEGINETIA INDICA*.
O. ALECTRA D. Dietr. = *AULAYA CAPENSIS*.
O. AMERICANA Linn. = *CONOPHOLIS AMERICANA*.
O. ARENARIA Brkhsn. = *PHELIPAEA ARENARIA*.
O. BIFLORA Nutt. = *ANOPLANTHUS UNIFLORUS*.
O. BRASILIENSIS Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 63. = *BESLERIA*.....?
O. CAESIA M. Bieb. = *PHELIPAEA CAESIA*.
O. CALIFORNICA Cham. et Schlchtd. = *PHELIPAEA CALIFORNICA*.
O. CALOTROPIDIS Edgw. = *PHELIPAEA CALOTROPIDIS*.
O. CAPENSIS Thnbrig. = *AULAYA CAPENSIS*.
O. CARNOSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 61. = *BESLERIA*.....?
O. CERNUA Arrabida l. c. t. 71. = ??
O. CERNUA Pall. = *PHELIPAEA COERULEA*.
O. COCCINEA M. Bieb. = *ANOPLANTHUS COCCINEUS*.
O. COERULEA Vill. = *PHELIPAEA COERULEA*.
O. COMOSA Hook. = *ANOPLANTHUS COMOSUS*.
O. COMOSA Wllrth. = *PHELIPAEA ARENARIA*.
O. COMPACTA Viv. = *PHELIPAEA COMPACTA*.
O. CRENATA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 60. = ??
O. DELILEI Dcne. = *PHELIPAEA DELILEI*.
O. FASCICULATA Nutt. = *ANOPLANTHUS FASCICULATUS*.
O. FISSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 69. = *HYPOCYRTA*.....?
O. FLUMINENSIS Arrabida l. c. t. 62. = *BESLERIA*.....?
O. FORNIX Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 75. = *HYPOCYRTA*.....?
O. FRAASII F. W. Schultz. = *PHELIPAEA FRAASII*.
O. GLABRA Hook. = *BOSCHNIAKIA GLABRA*.
O. HIRTA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 79. = *GESNERIA ALLAGOPHYLLA*.
O. INDICA Rxb. = *PHELIPAEA INDICA*.
O. INDICA Spr. = *STRIGA OROBANCHOIDES*.
O. INTERRUPTA Pers. = *PHELIPAEA RAMOSA*.
O. LAEVIS Ehrh. = *PHELIPAEA ARENARIA*.
O. LAEVIS Lam. = *PHELIPAEA COERULEA*.
O. LONGIFLORA Pers. = *PHELIPAEA LONGIFLORA*.
O. LUDOWICIANA = *PHELIPAEA LUDOWICIANA*.
O. MELANCHOLICA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 77. = *HYPOCYRTA*.....?
O. MONANTHEOS Arrabida l. c. t. 66. = *HYPOCYRTA*.....?

- O. MONTANA Rudb. = CLANDESTINA RECTIFLORA.
 O. PEDUNCULATA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 73. = ??
 O. PEDUNCULATA Rxb. = AEGINETIA PEDUNCULATA.
 O. PEDUNCULATA Viv. = PHELIPAEA PEDUNCULATA.
 O. PERIANTHOMEGA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 68. = HYPOCYRTA.....?
 O. PHELIPAEA Wllrth. = PHELIPAEA TINCTORIA.
 O. PHELIPAEA Willd. = PHELIPAEA VIOLACEA.
 O. PURPURASCENS Gmel. = PHELIPAEA COERULEA.
 O. PURPUREA Jcq. = PHELIPAEA COERULEA.
 O. RACEMOSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 72. = RYDITOPHYLLUM PRASINATUM.
 O. RAMOSA Linn. = PHELIPAEA RAMOSA.
 O. ROBUSTA Alb. Dietr. = PHELIPAEA ROBUSTA.
 O. ROSSICA Cham. et Schlchtd. = BOSCHNIAKIA GLABRA.
 O. SECUNDA Clus. = PHELIPAEA COERULEA.
 O. SERPENS Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 67. = HYPOCYRTA.....?
 O. SICULA Spenn. = PHELIPAEA SICULA.
 O. SCHULTZII Mutel. = PHELIPAEA SCHULTZII.
 O. SQUAMOSA Thnbrig. = AULAYA SQUAMOSA.
 O. SPICATA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 78. = GESNERIA ALLAGOPHYLLA.
 O. TINCTORIA Forsk. = PHELIPAEA LUTEA.
 O. TINCTORIA Willd. = PHELIPAEA TINCTORIA.
 O. TUBEROSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 70. = ??
 O. TUBEROSA Hook. = BOSCHNIAKIA HOOKERI.
 O. TUBULOSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 76. = ??
 O. UMBELLATA Arrabida l. c. t. 65. = ??
 O. UNIFLORA Linn. = ANOPLANTHUS UNIFLORUS.
 O. UITENHAGENSIS Ekl. = HARVEYA PURPUREA.
 O. VENTRICOSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 74. = ??
 O. VERTICILLATA Arrabida l. c. t. 64. = ??
 O. VIOLACEA Wllrth. = PHELIPAEA VIOLACEA.
 O. VIRGINIANA Linn. = EPIPHEJUS AMERICANUS.

4186. **BOSCHNIAKIA** C. A. Meyer.

(C. A. Meyer mss. ex Bngrd. Mém. de l'acad. impér. de St. Ptrsbrg. [N. Sér.] II. 159. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225.)

1. B. (OROBANCHE Hook. Fl. Bor. Amer. II. 91. t. 167.) **GLABRA** C. A. Meyer mss. ex Bngrd. l. c. — Glaberrima: caule squamato, basi incrassato reticulato; squamis cordatis acutis (siccitate) intense fuscis opacis; calyce cyathiformi tridentato; corollae tubo inflato, labio superiori elongato integro, inferiore abbreviato obscure trilobo. 2 — Tuber pollice saepe crassior difformis solidus, radicibus (*Betulae ovatae??*) lignosis insidet, caulem mox singulum, mox plures profert. Scapus caulise simplicissimus crassissimus 6–10–12–pollicaris, squamis basi obsitus densissime imbricatis, sursum dissitis sparsis. Squamae ovatae obtusae acuminatae, inferiores subinde breviores omnino laeves, superiores (bracteae) pilis albis crispatis ciliatae, calyce longiores, corolla breviores. Spica densissima diametro pollicari, basi paullulum relaxata majorem caulis occupans partem imo fere integrum. Flores intra squamas brevissime pedicellati, calyce ebracteato, 6 circiter lineas longi. Calyx tubo corollae brevior monophyllus, pilis albis crispato-ciliatus, subtruncatus v. inaequaliter quinquedentatus, dente quinto postico minimo, lateralibus majoribus, interdum luxuriantibus. Corolla tubulosa ringens glabra, pilis albis crispatis ciliata. Tubus brevis, labium superius fornicatum porrectum bifidum v. saepius integrum, inferum minimum subtruncatum leviter trilobum. Stamina 4 didynama medio tubo inserta exserta, labio superiori breviora. Filamenta basi dilatata subglandulosa, caeterum glabra. Antherae introrsae biloculares muticae. Stylus in labium inferum deflexus, stigma aequale. Capsula

subobliqua lentiformis. — *Orobanche caule simplicissimo ultra dimidium florifero* Gmel. Flor. Sibirc. III. 216. t. 46. fig. 2. — *Orobanche Rossica* Cham. et Schlchtd. Linnaea III. 132. † — *Stellara lathraeoides* Fisch. mss. — Crescit in insula Chamilsonis, ad Lenam et in Kamtschatka. — Kamtschadalis contra Haemoptysin est remedium.

2. B. HOOKERI Wlprs. mss. — Glaberrima: scapo squamato, basi tuberoso; squamis ovatis acuminatis (siccitate) intense fuscis opacis, tubere reticulato areolis tuberculiformib. pentagonis; spica densa; florib. unibracteatis; calyce cyathiformi obliquo tridentato; corolla tubulosa bilabiata, labiis erectis, superiore ovato integro, inferiore trilobo breviore, lobis ovali-oblongis obtusis erectis. 2 — Parasitica in radicibus.....? Scapus erectus simplex digitalis et ultra, squamosus, basi in tuber reticulatum incrassatum squamis laxiusculis fusco-nigrescentibus tectum abiens. Flores in spicam elongatam congesti erecti paullulum curvati. Stamina inclusa. Filamenta basi barbata. Antherae ovatae erectae apiculatae, facie anteriori dehiscentes, rimis longitudinalibus superne junctis. Germen ovalis subrotundum. Stylus supra curvatus. Stigma subquadrilobum. — *Orobanche tuberosa* Hook. Flor. Boreal. Americ. II. 92. t. 168. — Crescit in Americae borealis ora occidentali.

4187. CLANDESTINA Tournef.

(Tournef. Instit. rei herb. 952. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225.)

1. CL. RECTIFLORA Lam. Illustr. gener. t. 551. fig. 1. — Caudice hypogaeo ramoso squamato; scapis brevissimis; florib. ex axillis squamarum solitariis longe pendunculatis strictis magnis coeruleis. 2 — *Clandestina flore subcoeruleo* Tournef. Instit. rei herb. 952. — *Lathraea Clandestina* Linn. Spec. plant. 843. — *Orobanche montana* Rudb. Elys. II. 233. fig. 14. — *Dentaria aphyllos* Ray, Histor. 1230. — Moris. Oxon. Histor. III. 503. sect. 12. t. 16. fig. 15. — Crescit in locis umbrosis parasitice in radicibus arborum in Europa australi (in Gallia, Hispania et Italia).

4188. LATHRAEA Linn.

(Linn. Gener. pl. no. 743. [excl. sp.] — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225.)

1. L. SQUAMARIA Linn. Spec. plant. 544. — Grtnr. De fructib. et seminib. I. 242. t. 52. — Sm. Engl. bot. t. 50. — Flor. Danic. t. 136. — Schkhr. Bot. Hndbch. t. 70. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. II. t. 113. — Svensk bot. t. 316. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 357. no. 2431. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 539. — Rhizoma crassum ramosissimum, squamis brevibus carnosus dense imbricatis albidi undique obsitum; scapi plures semipedales crassi albidi, squamis sparsis albidi carnosus instructi; flores in racemum unilateralem inclinatum collecti, breviter pedicellati biseriati, squamis bracteantibus dorso pedunculi communi biseriatis crassis carnosis rubescens; calyx albido-rubescens; corolla calyce subduplo longior albida, laciniis pallide purpurascens. 2 — *Clandestina penduliflora* Lam. — Blackw. Herb. t. 430. — *Squamaria Orobanche* Scopol. Flor. Carniol. 760. — Rivin. Monop. irregular. t. 89. fig. 2. — *Amblatum* Dodon. Pemptad. 553. fig. 1. — Crescit parasitice in radicibus arborum fruticumque frondosorum (praesertim *Coryli Avellanae*) per totam fere Europam et in Himalaya montibus.

β. erecta C. Koch, Linnaea XVII. 291. — Erecta (nec cernua) coerulescens: bracteis ovatis; calyce piloso inflato; corolla tubulosa exserta, labio superiori galeato, inferiori erecto subtrilobo; staminib. exsertis, antheris albo-villosis; florib. densiorib. horizontalib. nec cernuis. 2 — Crescit in Somchetiae sylvis carpineis. — Specie differre videtur.

† Species e genere expellendae.

L. ANBLATUM Linn. = ANOPLANTHUS TOURNEFORTII.

L. CLANDESTINA Linn. = CLANDESTINA RECTIFLORA.

L. PHELYPAEA Forsk. = PHELIPAEA RAMOSA.

L. PHELYPAEA Linn. = PHELIPAEA LUTEA.

L. PHELYPAEA β. Linn. = ANOPLANTHUS COCCINEUS.

L. QUINQUEFIDA Forsk. = PHELIPAEA LUTEA.

4189. **ANOPLANTHUS** Endl.

(Endl. mss. et Iconogr. gener. t. 72. — Meisn. Gener. plant. vascular. I. 314. II. 225. — *Anoplon* Wllrth. Gener. Orobanch. διασκευή [Orobanches sect. 3. — nec Zoolog.] — *Anoplon* G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 633.)

Sectio I. **EUANOPLON** Endl. Gener. plant. p. 727.

Corollae tubus longus incurvus, limbus patens. Scapus brevis v. obsoletus, pedunculos elongatos graciles unifloros, basi squamae vaginatos promens.

1. A. **UNIFLORUS** Endl. Iconogr. gener. t. 72. — Pedunculis unifloris longissimis gracillimus hirtellis, basi squamis vaginaeformib. munitis, scapum radicalem obsoletum longe superantib.; corolla tubulosa incurva, labio superiore bifido, laciniis labium inferius trifidum aequantib. extus margineq. ciliatis; staminib. styloq. glabris; stigmate capitato emarginato. ♀ — *Habitus Pinguiculae*. Scapus radicalis squamis paucissimis ovatis crassiusculis acutis semiamplexicauli-decurrentibus munitus, sesquiuncialis glaberrimus subsimplex pallide fuscescens, squamae florigerae obtusae tenuiter pubentes. Pedunculi quadripollicares uniflori. Calyx campanulatus quinquefidus ebracteatus, dentes ovato-acuminati hirsuti. Corolla tubulosa incurva longitudinaliter striata hirsuta pallide coerulescens subbilabiata quinquefida, lacinia ovato-oblongae obtusae aequales tenuiter ciliatae. Antherae glabrae. Capsula ovata. — *Dentariae seu Anblato cordi affinis, flore pallide coeruleo* Gronov. Virginie. 70. — *Gentiana minor aurea, flore simplici ampio deflexo pallide flavescente* Pluken. Mat. 29. t. 348. fig. 1. — *Orobanche uniflora* Linn. Spec. plantar. 882. — *Orobanche* (*Phelipaea* Spr. Syst. vegetab. II. 818.) *biflora* Nutt. Gener. plant. Americ. II. 59. — Hook. Flor. Boreal. Americ. II. 93. — *Anoplon biflorum* G. Don l. c. 634. no. 4. — Crescit in Virginia, Canada et New Foundland.

2. A. **COMOSUS** Wlprs. mss. — Pubescens: caule brevi densissime fasciculatum ramoso; ramis squamosis; calyce quinquepartito ebracteato, laciniis lanceolatis acuminatis (nec subulatis ut ait auctor); corollae tubo longe exerto curvato, labiis elongatis recurvis, superiori oblongo bifido, inferiori trifido, laciniis linearioribus, apice bidentatis; antheris pilosis. ♀ — *Planta quadripollicaris corymboso-ramosa*, caulis sesquipollicaris, densissime squamatus, squamae ovato-acuminatae breves. Pedunculi pollicares squama linearis, calycis basin subattingente supra medium vaginatim inclusi. Calyx fere basin usque quinquefidus breviter pilosulus. Corolla calyce ultra duplo longior, pollicaris, tubo parum incurvo, labium superius breviter bifidum, lacinia labii inferioris aequales, ad labiorum incisuram usque sectae, apice breviter bifidae patentim recurvae. Stylus apice fere rectangule inclinatus glaber, stigma infundibuliforme capitatum. Capsula ovata glabra. — *Orobanche comosa* Hook. Fl. Bor. Americ. II. 92. t. 169. — In ripis fl. Columbiae crescit.

3. A. **FASCICULATUS** Wlprs. mss. — Pulverulento-pubescentes: caule brevi fasciculatum ramoso; ramulis seu pedunculis nudis unifloris; calyce quinquefido ebracteato, lobis triangularib. acutis; corollae tubo longe exerto curvato, labiis erectis concavis brevib. obtusis, superiore bifido, inferiore trifido, laciniis integris; filamentis glandulosis, antheris glabris. ♀ — *Planta 2½-4-5-pollicaris*. Scapus simplex squamatus, squamae ovatae obtusae, floriferae acutiusculae. Pedunculi solitarii ebracteati pollicares ex axillis squamarum 4-6 ultimarum. Calyx brevis cupuliforme-campanulatus, breviter quinquedentatus. Corolla calyce multoties longior tubulosa incurva, lacinia tubo 4-5-ies breviores, superiores binae altius coalitae, cum tubo piloso-pubescentes. Stylus glaber, sub apice deflexus, stigma capitato-infundibuliforme. — *Orobanche* (*Phelipaea* Spr. Syst. vegetab. II. 818.) *fasciculata* Nutt. Gener. plant. Americ. II. 59. — Hook. Flor. Bor. Americ. II. 93. t. 170. — *Anoplon fasciculatum* G. Don l. c. 633. no 3. — Crescit in America boreali (Saskatchewan, Columbia).

4. A. COCCINEUS Wlprs. mss. — Pinguis glaberrimus: scapo squamis semiamplexicauli-vaginantib. remotis munito in pedunculum uniflorum terminalem protenso; calyce monophyllo ebracteato irregulariter quinquesido; corolla inflato-ventricosa quinquesida, lobis subaequalib. ovato-rotundatis. ♀ — *Phelipaea* (*Anoplon* G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 633.) *Tournefortii* Dsf. Ann. mus. d'hist. natur. X. 298. t. 21. — *Phelypaea* (*Anoplon* C. A. Mey. Verzeichn. der Pflnzn. am Cauc. 104.) *Biebersteinii* Fisch. mss. — *Phelipaea* (*Orobanche* M. Bieb. Fl. Casp. 58., Flor. Taur. Caucas. III. 418., Pl. rar. Ross. II. t. 58.) *coccinea* Pers. Enchir. II. 181. — Wallrth. Gener. Orob. διασκευή 68. † — *Lathraea Phelypaea* β. Linn. Spec. plant. 844. — *Phelypaea orientalis*, *flore coccineo* Tournef. Coroll. 47. t. 479. — *Lathraea Phelipaea* Güldenst. Itin. I. 422. — [*Phelipaea foliata* Lamb. Transact. of the Linn. Soc. X. 260. t. 7. — Spr. Syst. vegetab. II. 818??] — *Aeginetia coccinea* Juss. mss. — *Orobanche Phelipaea* M. Bieberst. Fl. Casp. Appndx. 179. — Crescit in Armenia, in Tauria, Caucasia et in Sibiria versus mare Caspicum. — Plantam *Tournefortianam* a *Biebersteiniana* specie differre valde dubitamus simul cum Cl. Wallroth.

Sectio II. ANBLATUM Endl. l. c.

Corollae tubus brevis ventricosus, limbus bilabiatus. Scapus squamis majusculis amplexicaulibus vaginatus in pedunculum uniflorum desinens.

5. A. (AMBLATUM G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 635.) TOURNEFORTII Wlprs. mss. — Corollae labiis indivisis. ♀? — *Lathraea Anblatum* Linn. Spec. plant. 844. — *Anblatum orientale*, *flore purpurascente* Tournef. Coroll. 48. t. 481. — [*Phelipaea foliata* Lamb.??? — Cf. speciem praecedentem!] — Stirps a nemine post **Tournefortium** visa, valde dubia! — Crescit in Oriente.

4190. AEGINETIA Linn.

(Linn. Spec. plant. [edit. 1.] 632. — Meisn. Gener. plant. vascular. I. 314. II. 224. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 635.)

1. AE. INDICA Rxb. Plant. of the coast of Coromand. I. 63. t. 91. — Bth. Scrophul. Indic. 55. — Scapo elongato subsimplici nudo; corollae limbo breviter quadridido. ♀ — (Wall. Catal. 3964.) — *Orobanche Aeginetia* Linn. Spec. plantar. 883. — *Tsiam-Cumulu* Rheede, Hort. Malabar. XI. 97. t. 47. — Corolla curvata purpurea, calyx flavescens. — In India orientali (Nepalia, Silhet, Circars, Taong Dong, Tavoy, Dheyra Dhoun, Kidarkonta etc.) crescit.
2. AE. (OROBANCHE Rxb. Hort. Benghal. 45. et Fl. Indic. III. 29.) PEDUNCULATA Wall. Plant. Asiatic. rarer. III. 13. † t. 219. — Glabra: scapo simplici squamis paucis attenuatis carnosis instructo, squamis floralib. triangularib.; calyce spathaceo monophyllo interiore latere fisso; corollae tubo inflato calycem aequante; limbo quinquepartito subaequali, segmentis reniformib. denticulatis; filamentis glabris; stigmate magno cordato-peltato. ♀ — Pedunculi uniflori scapum aequantes. Flores maximi. Corollae tubus luteus, limbo obscure violaceo. Calyx liquore viscoso repletus est. Stamina inclusa. Capsula ovata. — Crescit parasitice in radicibus *Andropogi muricati* et *Bambusarum* complurium in Benghalia.
3. AE. ABBREVIATA Hamilt. mss. in Wall. Catal. 3965. — Bth. l. c. — Wlprs. Nov. Act. acad. Caes. Leop. Carol. nat. curios. XIX. Suppl. I. 400. — Caule brevissimo ramoso (v. simplici) squamato; corollae amplae limbo bilabiato, labio inferiore ample trilobo. ♀ — Crescit in Peninsula Indiae orientalis et in Manilla.
4. AE. (OROBANCHE Rxb. Flor. Indic. III. 29. et Plant. of the coast of Coromand. t. 292.) ACAULIS Wlprs. mss. — Acaulis: florib. in capitula irregularia radicalia sessilia congestis; calycib. monophyllis spathaceis unilateraliter fissis v. irregulariter bifidis; corollae laciniis crenatis; antheris simplicib., duabus interiorib. glandula magna recurva ovali auctis; stigmate peltato. ○ — Bracteae triangulares, pedicellum unum v. plures includentes. Corolla extus purpurea, intus flava. — Crescit parasitice in radicibus *China sugar-cane* (?) in horto botanico Calcuttensi.

† *Species e genere expellendae.*

- AE. CAPITATA Grah. = LIPOSTOMA CAPITATUM.
- AE. COCCINEA Juss. = ANOPLANTHUS COCCINEUS.
- AE. LONGIFLORA Cav. = BOUWARDIA LONGIFLORA.
- AE. MULTIFLORA Cav. = BOUWARDIA CAVANILLESII.

*
4191. **HYOBANCHE** Thnbrig.

(Thnbrig. ex Linn. Mantiss. plant. 263. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 224.
— G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 635.)

1. H. SANGUINEA Linn. l. c. — Syst. veget. 574. — Endlich. Iconogr. gener. t. 82.
— Tota planta sanguinea: spica villosa; flores purpurei. ♀? — Petiv. Gaz. t. 37.
fig. 4. — *H. coccinea* Linn. mss.? — Crescit parasitice in radicibus.....? in Pro-
montorio bonae spei.

Genus dubium.

4192. **EPIRHIZANTHUS** Blume.

(Blume, Catal. hort. Buitenzorg. ex Flora [B. Z.] 1825. p. 133. — Meisn. Gener.
plantar. vascular. I. 314. II. 224.)

1. E. CYLINDRICA Blume l. c. 134. — Spicis densis cylindricis; germe oblongo;
stylo crasso minimo. ♀? — Crescit in insula Java.
2. E. ELONGATA Blume l. c. — Spicis laxis elongatis; germe globoso; stylo sim-
plici. ♀? — Crescit in insula Java.
3. E. LINEARIS Blume l. c. — Spicis minimis tenuissimis; germe globoso; stylo
setaceo. ♀? — Crescit in insula Java.

Genera affinia.

4192₁. **PHOLISMA** Nutt.

(Nutt. mss. in W. J. Hook. Icon. plantar. t. 626.)

Calyx profunde sexpartitus, laciniis linearisubspathulatis. Corolla monopetala infundibuliformis, limbo subregulari sexlobo, lobis rotundatis plicatis, aestivatione imbricatis. Stamina 6 supra medium tubi inserta inclusa uniserialia aequalia, cum lobis corollae alternantia. Filamenta brevia. Antherae oblongo-ovatae obtusae biloculares, loculis prope marginem longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium superum subglobosum, ad circumferentiam multiloculare, loculis uni-ovulatis, ovulis ad angulum internum circa axin crassissimum affixis. Stylus elongatus crassiusculus inclusus. Stigma dilatum, centro depresso, margine lobato-dentato. Fructus immaturus baccatus?? loculis seminibusque ut in ovario. Semina ex angulo interiori pendentia. — Herba succulenta colorata (parasitica?) in arenosis Californiae proveniens facie *Orobanches* aphylla, scapo simplici squamoso, floribus parvis densissime spicatis ut videtur ebracteatis.

1. PH. ARENARIUM Nutt. mss. in Hook. l. c. — Planta septem pollices alta habitu *Orobanchen* v. *Phelipaeam* referens. Scapus erectus simplex dense et subimbri-
catim squamatus, squamae e basi aequilata elliptico-oblongae obtusae adpressae. Florum spica bipollucaris, pollicem crassa ovalis multiflora. Calycis lacinia linearisubspathulatae acutiusculae, margine dorsoque pilosulaec, orollae tubo pa-
rum breviores. Corolla infundibuliformi-tubulosa, ore leviter constricto, limbi sexfidi lacinia rotundatae obtusae undulato-crenatae aequales patentes. Fila-
menta antherarum longitudine. Stylus stamna aequat. — Crescit locis arenosis
in California (Monterey et St. Diego).

4192₂. **LENNOA** Llave et Lexarza.

(Llave et Lexarza, Nov. veget. Mexic. descript. I. 7. — Meisn. gener. plant. vascul. I. 254. II. 164. — *Corallophyllum* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. VII. 276. † t. 660bis. — Kth. Synops. pl. aequin. IV. 267. — Endl. Gener. pl. p. 1329. no. 6361.)

1. *L. MADREPOROIDES Llave et Lexarza l. c. — *Corallophyllum coeruleum* H. B. Kth. l. l. c. — Crescit parasitice in radicibus.....? in Mexico.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Text]

SYNOPSIS

SHROPHVyRiW, OROBiCHW

ET

LABIITIRII

IN

BOTAMCORUM SCRIPTIS AD IIUNC DIEMEDITIS DESCRIPTARUM.

CURAME

GUILIELMO GERARDO WALPERS,

PHIIOSOPHIAE DOCTORE,

ACADEMIAE CAESAREAE LEOPOLDINAE CAROLIINAE NATURAE CURIOSORUM,
SOCIETATIS REGIAE BAVARICAE BOTANICAE RATISBONENSIS SOCIO ETC.

LIPSIAE.

«^liiHTIBCS FRIDERICI MOFMEISTER.

1844-45.

[Begin Page: Page 457]

4r>;

Ordo CLIY. OROBANCHEAE L. C. Rich.

[L. C. Rich. In Pers. Enchirid. II. 180. — Endlich. Gener. plantar. p. 725. —

Meisn. Gener. plantar. vascular. I. 314. II. 224. — OROBANCHES generis

AIA2KEYH auctore Fr. Gu. Wallroth. (Francof. ad Moen. 1825. 8vo.) —

G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 627. (ex parte.)]

4182. EPIPHEJIJS Niitt.

(Nult. Gener. plant. Americ. II. 60. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225. —

Hook. Flor. Bor. Americ. II. 93.)

1. E. AMERICANA Nutt. 1. c. — Hook. I. c. — Endlich. Iconograph. gener. t. 80. —

Radix carnosa Juglandis magniludine, undique fibrillosa, perennis. Scapus ex
ipsa radice ramosissimus loruosus nodosus angulosus aphyllus, demum ligneo-
cens, rami simplices v. divisi e squama ovato-oblonga prodeuntes angulosi gla-
bri, superne pedicellique pube tenuissima adspersi , floriferi digitales, frucliferi

. elongati sesquipedales, inflorescenliam ramoso-virgatam constiluenles. Bracleae
solilariae squamis conformes, sensim minores brevissimae oblusiusculae enerves

fuscescenles glabrae, raarginae parce hirtello. Calyx monophylius urceolatus brevissime 5-denlalus. Flores polygami brevissime pedicellali alterni solilarii flavi, superiores masculi ringentes quadrifidi in labium inferius planum divisi, in Ceriores foeminei omnes fertiles obsolele 4-fidos mentienles, apice cilo arcle conniventis fere conferruminali etcapsulae, donec hae dehiscant, calyplrae mamillalae, apice clausae instar insidentes eoque stigma concipientes. Capsula obovata, basi a calyce cincta 1-locularis polysperma. — Orobanche caule ramoso, floribus distantibus Clayt. in Gronov. Virgin. 168. — Orobanche minor Virginiana lignosior per totum caulem floribus minutis onusta Moris. Oxon. Hislor, Sect. 12. t. 16. fig. 9. — Orobanche [Mijlanche Wallrh. Gener. Orob. dtaaxeurj 76.) Virginiana Linn. Spec, plantar. 882. — Leptamnium Raf. Americ. monthl. journ. 1818, — Crescent parasitica in Fagorum radicibus in Virginia.

4183. PHELIPAEA Dsfont.*)

(Dsfont. Flor. Allant. II. 60. — Meisn, Gener, plant, vascul, 1,314.11.225. - G. Don,

General syst. of gard, and bot. IV, 631,)

Sectio I. TRIONYCHION Wallroth, Gener. Orob. diaaxsu-fi pag, 58. — C. A. Mey. mss.

in Ledeb. Flor. Altaic. II. 460.

Calyx 4-5-fidus, lobis elongalis inaequalibus acuminalis. Anlherae superficie

glabrae, loculis villosa-dehiscentibus, Capsula slyli decidui basi ooronala.

1, PH, LANUGINOSA C. A, Mey. mss, in Ldb, Icon. flor, Ross, Allaic, illuslr. t. 377.

et Flor. Aliaic. II, 460. f — C. A. Meyer, Vrzchns, der Pflnzn, am Caucis, 104, —

Albo-lanala: squamis floralib, ovalo-lanceolalis calycem excedenlib,; calycis lo-

bis lanceolatis subaequalib,; corollae fauce subinflata, labio superiore paullo lon-

giore, lobis labii inferioris subaequalib, ellipticis obtusis subdenlicuiialis; fila-

menlis anlherisq, glabris; stylo glanduloso, sligmate bilobo, 1|. — Scapus sim-

plicissimus 4-10-pollicaris, — Species intermedia quasi inter Ph. coeruleam et

carnosam, ab illa differt lanugine alba, squamis floralibus calyce longioribus in

apice scapi subcomosis, labio corollae superiore paullo breviore, lobis obsoletius

denticulatis, ab hac dignoscitur corolla in fauce multo minus ampliata, intus

*) Bracteae ternae nec binae ut ait St. Endlicher et cum eo Meisner,

si forte excipies species nonnullas minus notas.

III 58

[Begin Page: Page 459]

PHELiPAEA. OROBANCHEAE. 459

5. PH. RUFESCENS Griseb. Spicileg. tlor. Rumel. II. 59. f - Rufesceris ramosa;

calyce quadrifido, laciniis lanceolalo-acuminalis ; corollae homochroae parum
consrigiae lubo palenle, dorso arcualo, limbi lobis ovalo-oblongis oblusis; an-
therarum valvis margine lanalo-cilialis ; sligmale cerino-flavo. ^ — Herbapallide
brunnea v, rufescens, hinc violaceo-tincla paimaris puberula, basi paullo incras-
sala, saepe pluricaulis. Squamae ereclo-palenles lanceolatae, in axillis saepius
gemmafere, quibus nondum evolutis caulis simplex appetet. Spica brevis den-
siflora, bracleae ovatae acuminatae calycis tubum subaequantes, bracleolae linea-
res. Calyx ad medium fere 4-fidus, laciniis inaequalibus, hinc fissus. Corolla
rufescens v. subinde violacea seraipolli(tfris , limbo brevi glanduloso-ciliolato.
Stamina suprabasilaria glabra. Stigma bilamellatum cerinum. — Crescit in radi-
cibus Plantaginis Lagopodos in Thraciae littore.

6. PH. (OROBANCHE Viviani, Plant. Aegypt. decad. 22.) PEDUNCULATA Wlprs.
mss. — Caule a basi diviso flexuoso angulalo squamoso; florib. laxe racemosis;
pedunculis bracleam supposilam duplo superantib.; bracteis calycinis duabus
lineari-setaceis; corolla calycem monophyllum quadrifidum quadruplo superante;
filamentis germineque sphaerico glabris. 11- — Crescit in deserlis Kahircis.

7. PH. (OROBANCHE Linn. Spec. plant. 882. — Thnbrig. Prodr. flor. Capens. 97. -
Rchb. Plant. critic. VII. fig. 933. 934. — Bull. Herb. t. 399. — Engl. bot. t. 184. —
Wallrth. Gener. Orob. hiaaxs^rfi 63. f — Rchb. Flor. Germ. excurs. 356. no. 2430.

- Koch, Synops. fl. Germ. [edit. 1.] 539. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. IV. t. 250.)
RA>IOSA C. A. Meyer, Verzeichn. der Pflnzn. am Caucas. 104. — Scapo ramoso
parce squamoso; florib. allcrnis in spicam acutatam laxe dispositilis; calycis mo-
nophylli suburceolati quadrifidi dentib. ovalis acuminatis aequalib.; corollae in-
fundibuliformi-lubulosae labio superiore ascendente, inferioris lobis aequalib.
obtusis rotundatis; slaminib. pubentib. styloq. tenuiter glanduloso inclusis; slig-
mate retuso. O — Scapus inlerdura a basi, frequentius lamen e media parte ra-

mosus rarissimeque simplex, inferne sensim tumidulus glaber, superne hirsuto-furfurascens, digitalis v. pedalis, ramuli conformes hirsutiores, intermedio breviores. Spicae virgatae. Braclea exterior ovata acutiuscula fusca, calycem subaequans, inleriores lineares acurainatae. Calyx lenuiler membranaceus urceolalus postice excisus, dentes oblongo-lineares acuti capsulam aequantes, praeter poslcura minorem subaequales. Corolla praeler basin pro capsula circumcludendam rotundatara tubulosa, sensira in faucem ampliata hirtella, inferne flavescens, apice cyaneo-purpurascens v. coerulescens, labium superius bilobura raagis minusve rolundatura integrura, inferius subaequaliter trifidum, ad palatum flavescenti-hirsuta. Stamina basi hirtella. Stylus glabriusculus. Stigma albidum capitatura. Capsula ovato-subrolunda. — Orobanche tertia polychonos Clus. Hislor. 1.271.— Moris. Oxon. Histor. III. 502. sect. 12. t. 16. -fig. 8. — Chabr. Stirp. 257. fig. 3. — Guettard, Mem. 1746. t. 9. — Orobanche inferrupia Pers. Enchirid. II. 181. — (ex Cham. et Schlcld. Linnaea III. 1.36.) — Ad radices Cannabeos per totam Europam et Sibiriam et in Promontorio bonae spei in agris humidiusculis crescit.

8. PH. (OROBANCHE Dcne. Ann. sc. natur. [2. Ser.] IV. 201.) DELILEI Wlprs. mss.

— Simplex v. saepius ramosa : ramis angulatis pubescenlib.; squamis caulinis lanceolaiis acutis semipollicarib., floralib. breviorib.; spicis ramulos terrainantib. laxifloris; florib. sessilib.; calycis cupuliformis dentib. lanceolato-setaceis, corolla pollicari extrorsum puberula, fauce rtilatata, introrsura pubescente; staminib. infra mediura tubi insertis ; filamentis glabris; stylo glabro, fauci aequali. O — Planla fusca 8-12-pollicaris, flores azurei duplo raaiores quam Ph. ramosae. Calyx subcarapanulato-cupuliformis, flores sessiles. — Orobanche ramosa Delile, Flor. de TEgypte (nec Linn.) — Crescit parasitice in radicibus Cucurbitae Melonis et Brassicarum in horlis prope urbem Cahiram in Aegypto.

9. PH. (OROBANCHE Borkhausen in Roem. Neues Magaz. ao. 1794. p. 6, — Rchb. Fl.
Germ. excurs. 356. no. 2429., Plant. critic. VH. fig. 929. 930. 931. — Koch 1. c. -
Alb. Dietr. Flor. Borussic. IX. t. .579.) ARENARIA WIprs. mss. - Scapo simplici:

58*

[Begin Page: Page 460]

460 OKOBANCHEAE. phelipaea.

calyce monosepalo quinquedentalo, denlib. subulalis; corolla tubuloso subrecla,
tubo medio angustato, fauce subinflata, laciniis labiorum obtusis, margine re-
flexis ; anlherarum sutura lanato-pilosa. ^ — Scapus basi leviter incrassatus
erectus simplicissimus dodranialis v. pedalis hirsutus albus diluleve coerulescens,
demum fuscus. Squamae ovatae. Spica comosa spithamea 15-30-flora. Bractae
ternae, exterior ovato- oblonga , jaterales lineares aculae breviores. Calyx ple-
rumque 4-, rarius 3- v. 5-6dus, dentes lineares aculi aequales praeler quintum
breviorem, corollae stricturam superantes. Corolla ullra basin pro capsula cir-
cumcludenda rotundatam dilutiorem el ex staminibus constrictam, attenuata sub-
infundibuliformis, m faucem patentem ampliala dilute coerulescens, demum ru-
biginosa hirtella, labiura superius profunde emarginatum parceque crenulatum,
inferioris lobi ovato-rotundati subaequales obtusi, intus ad limbum hirtelli, ad
palatum longitudinaliter albo-villosi. Anlherae cum villo stupposo dehiscenles.
Stigma bifidum aurantiacum. Capsula ovaia. — Orchis abortiva Leyss. — Oro-
banche laevis Ehrh. mss. — Orobanche [Phelypaea G. Don I. c.) comosa Wallrth.
Schedul. critic. L 314. et Gener. Orob. dcuffxs'jrj 59. t — Crescil ad radices Ge-
nistae tinctoriae et Artemisiae campestris in Gallia et Germania.

10. PH. (OROBANCHE Alb. Dietr. Flor. Borussic. III. t. 151. t, Flor. Marchic. 338.)

ROBUSTA Alb. Dielr. mss. — Villosula: scapo crasso ramosissimo; spicis densi-floris; bracteis ternis calycis longitudine; calycis quinquefidi lacinia quinla minima; corollae tubulosae labio superiori bilobo, lobulis reflexis, labii inferioris reflexi laciniis aequalib. vix crenulatis; filamenlis glaberrimis, antheris villo cinctis; slylo glaberrimo, stigmate biglobuloso stramineo. -j- — Scapus bipedalis v, allior striciissimus e basi (pollicem fere diamctro tenente) ramosus livide vi-rens glaber, infra spicas parce villosus. Squamae ovales obtusae pollicares, semipollicem latae, superiores angustiores acuminatae. Spicae 9-pollicares vel longiores. Bracteae ternae lanceolato-lineares, intermedia longiori. Calycis lacinia (excepla postica) linear- lanceolatae acuminalissirae. Corolla pollicaris, tubus incurvus, ad faucem inlus breviier villosus. Stigma pallidissime sulphureum globuloso-bilobum. — Ubatus Ph. rainosae, flores Ph. coeruleae, ab utraque statura insignis. — Crescit in radicibus Artemisiae campestris in collibus arenosis aprylicis (bci ^Baumgartcnbritcf Innter *4]ctebam).

11. PH. (OROBANCHE Rxb. Flor. Indic. III. 27.) INDICA G. Don L c. 632. no. 4. -

Ramosa pilosa: scapo ad ramificationes lantummodo squama instructo; calyce subunilateralis 5-fido; spica densa clavata; corollae tubulosae labio superiore bilobo, inferiori trilobo; antheris lanatis bifidis, loculis calcaratis; filamentis glabris; stigmate bilobo. 2|. — Prope accedit ad Ph. ramosam sed recedit corollis duplo majoribus (coeruleis). — Crescit in India orientali et Nepalia in radicibus Nicotianarum.

12. PH. (OROBANCHE Fr. W. Schultz, Flora [B. Z.] XXVI. 127.) FRAASII WIprs.

mss. — Calyce monosepalum quinquedentato, dentib. e lata basi lanceolatis acutis; corolla calycera triplo excedente tubulosa subhorizontaliter patente subarcuata, lobo supra ovarium coarctato, tunc ampliato, fauce ampla, laciniis labiorum ovalis, labii superioris approximatis, labii inferioris distantib.; staminib. infra me-

dium tubi inserlis glabris. 2j.? — Planta pulcherrima purpureo-coerulea, solummodo Ph. (Orobanche) Siculae et Ph. (Orobanche) SchuUzii comparanda. — In radicibus Psoraleae bituminosae ad Tripolizam crescit.

13. PH. PULCHELLA C. A. Meyer in Eich\\ld. Plant. nov. Caspic. Caucas. 17. t L 18.

— Albo-lanata: squamis subfloralib. ovatis acutis calycem subaequantib.; lobis calycis linearis-subulatis subaequalib.; corollae fauce subinflata, labiis subaequivalentibus, liris labii inferioris suborbiculatis denticulatis aequalib.; filamentis glabris, antheris styloq. pilosis; stigmate bilobo. 2j.? — Scapi simplicissimi 3-4-pollicares, basi non incrassati, una cum squamis, calycibus et corollis dense albo-lanati, squamis paucis ovatis acutis distantibus obsiti. Flores 8-10 spicati. Bracteae (lernae?) lineares acuminatae calycem fere aequantes. Calycis quadrifidae laciniæ linearis-subulatae subaequales. Corolla salurate violaceo-coeruleascens.

[Begin Page: Page 461]

PHELIPAEA.

OROBANCHEAE. 401

10 lin. longa subincurva, e basi cylindrica in faucem sensim ampliata, exlus densa albo-lanata, intus parce pilosa, laciniis uliusque labii fimbriato-dentatis. Filamenta glabra. Antherae margine lanatae. Stylus albo-pilosus. Stigma sub-bilobum Davum obliquum. — Crescit in radicibus ? in Imeretia.

14. PH. (OROBANCHE Rchb. Plant. critic. VII. fig. 936. — Buxb. Centur. III. t. 1. fig. 2.) CAESIA Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 59. — Coerulescens simplex: calyx quadrifido, laciniis subulatis; corollae violaceae supra fundum arcte con-

strictae lubo erecto-patenle, versus apicem arcuato, limbi lobis ovato-subrotundis
V. ovalo-oblongis obtusis; antheris glabris; stigmate pallide amethystino trans-
verse sulcato. Cil. — In radicibus Erodii cicutarii in pascuis montis Tscbatal-Sepe
prope Enos et in insula Chalki crescit.

15. PH. (OROBANCHE Viviani, Flora Lybic. 34. t. 15. fig. 2.) COMPACTA G. Don

I. c. 632. no. 9. — Scapo simplici squamoso-imbricato, a basi ipsa florifero; spica
ovata multiflora, squamis floriib. flores dimidios aequantib.; calycib. quadrifidis,
segmentis ovatis obtusis, interdura truncalis, corolla triplo breviorib.; corolla in-
curva versus faucem infundibuliformi-ampliala, laciniis labii superioris ovalis
aculis, inferioris rotundatis undulaiis subaequalib.; staminib. tubum corollinum
aequantib. glabris, antheris pilosis; stigmale capitulo-truncato. 2f — Crescit in
radicibus ? in magna Syrli.

16. PH. (OROBANCHE Nutt. Gener. pl. Americ. II. 58. — Hook. Flor. Bor. Americ

II. 92.) LUDOWICIANA Wlprs. mss. — Pubescenti-glandulosa: caule brevi sim-
plici V. subramoso; spica elongata densiflora; calyce inaequaliler profunde quin-
quefido bibracteato, laciniis linearib.; corollae intus exlusq. pubescentis tubo
elongato curvato, labiis subaequalib., superiori bifido, inferiore trifido, lobis aCu-
tiusculis; starainib. inclusis. 2]. — Calyx saepe sexfidus observatur, labium co-
rollae superius saepe integrum. — Crescit in Arberica boreali (New Caledonia,
Saskatchewan, Rocky mountains).

Sectio II. CISTANCHE Lnk. et Hfltansgg. Flor. Portug. I. 319. t. 63.

Calyx semiquinquefidus, lobis aequalibus obtusis. Antherae undique lanatae.

Capsula slylo persistente demum longitudinaliter secedenle terminata. Scapus simplicissimus. — [Haemodoron Wallrth. Gener. Orob. 8ia.axz.ori p. 69. Sect. IV.)

17. PH. FISSA C. A. Meyer, Verzeichn. der Pflnzn. am Caucas. 104. — Lanuginosa: squamis floralib. lanceolatis obtusis calyce longiorib.; calycis fissi lacinia superiore (v. posteriori) linearis, interiori (v. anteriori) spathaformi quadridentata, dentib. obtusis; corollae (violaceae) rectiusculae tubuloso-campanulatae laciniis patenlib. subaequalib. semiorbiculatis; filamentis basi barbalis, antheris apice connectivo producto mucronulatis; stylo glaberrimo, stigmate indiviso. 2[^] — In radicibus ? in Caucaso crescit.

18. PH. FLAVA C. A. Meyer I. c. — Glaberrima: squarais linearis-lanceolatis, floralib. corolla raulto longiorib.; calycis tubulosi lobis rotundatis; corollae flavae incurvae tubuloso-campanulatae lobis patenlib. subaequalib. ovatis; filamenlis basi pubescentib., anlheris apice connectivo producto raucronulatis; stylo glaberrimo, stigmate subretuso. 2j. — Crescil in radicibus ? in Caucaso.

19. PH. SALSA C. A. Meyer in Ledeb. Icon. flor. Rossic. Allaic. illustr. t. 376. — Ledeb. Flor. Altaic. II. 461. t — Sublanata: squamis floralib. ovato-lanceolatis calyce longiorib.; bracteis sublinearib.; calycis laciniis semiorbiculatis aequalib.; corollae rectiusculae tubuloso- campanulatae lobis subaequalib. seraiorbiculatis patentib.; filaraeniis basi barbatis; antheris muticis; styloglabro; stigmate emarginato. % — Planta ex observationibus non parasitica semipedalis v. pedalis. Scapus erectus crassiiie digitii minoris, basin versus tuberoso-incrassatus squamea florales e basi dilatata ovato-lanceolatae obtusiusculae, dorso albo-lanatae calyce fere sesquilocores, corolla duplo breviores. Bracteae lineares v. anguste oblongae ellipticae obtusae, calycem aequantes, lanuginosae lanato-cilialae. Calycis semiquinquefidi laciniae semiorbiculatae obtusissimae. margine scariosae

[Begin Page: Page 462]

402 OROBANCHEAE. phelipaea.

alba lanugine ciliae. Corolla odorem Violarum spargens speciosa l-r/4 poll.
longa, exlus glaberrima , lubo albido, limbo amoene violaceo, labio superiore
paulio breviore bifido, inferiore Irifido, lobis .subaequalibus palenlibus rolundalis
crenulalis ciliolalis. Filamenla basi dense lanata, anlherae dense albo-lanugi-
nosae, inaequaliler bimucronatae. Stigma leviter bilobum fuscescens. Capsula
magna ovata. — Anhlatum Tatancum Fiscb. mss. — Crescil in locis argilloso-
salsis deserti Soongarico-Kirgbislci Irans tl. Kurtsbum.

•20. PH. TUBULOSA Scbenk, Plant. spec. Aeg. Arab. 23. f — Scapo carnoso sulcalo
uni- Iripedali; squamis lale lanceolalis oblusis; bracleis lernis lanceolalis elon-
galis; calycis laciniis oblongis obtusis; corollac lubo curvato calyce duplo lon-
giorit filamenlis pilis sparsis obsilis; sligmale corollam superanle. 2j. — Scapus
pollicis crassitie cylindricus sulcatus squamatus. Bracleae ternae, duabus lale-
ralibus fere duplo brevioribus, media maxima calycem superanle, omnibus lan-
ceolalis acutis carnosis, margine laceris. Corollae tubus caljce duplo longior
arcualo-infundibuliformis, laciniae labii superioris et inferioris latérales rolun-
dalae, inlermedia paullo breviori acuUuscula. Filamenla exserta sparse pilosa.
Antberae cordalo-sagittatae mulicae villosa-lanuginosae. Stigma bilobum glabrum.
— Crescil in radicibus ? inter Suez el Tor in Arabia pelraea.

2i. PH. (CYSTANCHE Lnk. et Hffmnsgg. Flor. Portug. I. 319. t. 63.) LUTEA Dsfont.
Fl. Atlani. H. 60. t I- 146. — Scapo simplicissimo sulcato carnoso; bracleis ternis
subaequaiib., exteriorib, ovato-oblongis, interiorib. uninerviis; corolla e basi
iinguslala arcualo-lubulosa in faucem ampliata quinquefida speciosa, lobis ovalo-

rolundalis aequalib. patenlib.; slaminib. glaberrimis, antberis maxirais obsolete
mucronalis; stigmale capilato emarginato. ^ — Scapus glaberrimus (ut lota planta)
lulescens. Bracte.ie lernae, exterior semiamplexicaulis ovalo-oblonga , corolla
duplo brevior, scapo concolor, inleriores ovatae uninerviae conformes, calyce
breviores. Calycis dentes 5 ovalo-rotundali obliusi aequales, corollae lubo multo
breviorcs. Corolla mediotenus arcuato- lubulosa , inferne sensim anguslala, su-
perne ampliaia, laciniae ovalo-rotundatae aequales palctes. Stamina valida
glaberrima, anlherae lanato-villosae. Sligma crassum emarginalum cernuum. —
Orohanche linctoria Forsk. Aeg. Arab. 112. — Wallrth. Gener. Orob. Siaaxsu-q
70. t — Crescil in Barbaria, Arabia et in Aegypto.

22. PH. (OROBANCHE Wallrth. Gener. Orob. dio.cxsurj 70. — CYSTANCHE Lnk. et
HCrmnsgg. Flor. Portug. I. 320.) VIOLACEA Dsfoni. Flor. Atlanl. H. 60. t. 145. -
Scapo simplici carnosu; bracteis ternatis; calycib. quinqueparlitis; corollis cylin-
drics arcuatis. ^ — Squamae lanceolatae obtusae numerosae sparsae, spica co-
nica, corollae violaceae limbus irregularis, lobi rotundati, stigma crassum bilobum,
plicae faucae luteae. — Mi/^oJwoov Theophr. Histor. VIII. 8. — Orobanche Phely-
paea Willd. Spec. plantar. III. 352. — Crescit in deserto Barbariae.

23. PH. (OROBANCHE Willd. Spec. pl. IIL 353. [excl. syn. Forsk. Vabl et Dsfonl.])
TINCTORIA Wlprs. mss. — Scapo simplicissimo, squamis semiamplexicaulib.
ovatis eroso-crenulatis munito; bracteis lernis, exteriorib. conformib. oblongis
breviorib.; calyce campanulato inaequaliter obtuseq. quinquefido; corolla e basi
subinfundibuliformi venlricosa inflata quinquefida, labiorum lobis aequalib. ro-
lundatis semel incumbentibus, !2j, — Scapus basi leviter incrassatus carnosus
sesquipedalis. Florum spica ovata 10-12-nora. Bracteae ternae, interiores duplo
angustiores breviores obtusae. Calyx ad medium quinquefidus, dentes ovali ob-
tusi, corolla multo breviores. Corolla e basi anguslata subinfundibuliformi in-

flato-lubulosa lutea micans 5-fida, labio superiori profunde bifido, inferiori ae-
qualiter irilobo. — Phelypaea Lusitanica flore luteo Tournef. Coroll. 47. — Oro-
banche [Lathraea Linn. Spec. plant. 844. [excl. var. /? .]] Phelypaea Willrth. Gener.
Orob. oiaaxtofj 70. t — Crescil in Lusitania.

24. PH. (OROBANCHE Edgwrh. in Hook. Journ. of bot. II. 2^35.) CALOTROPIDIS
Willrs. mss. — Spica confertillora; scapo glabro spongioso, succi aquosae pleno;
bracleis lernis unifloris, inferiore majore, apice acuminata, demum marces-
cente, calycem superante carnosa purpurascente, supra fulva, duabus laterilib.

[Begin Page: Page 463]

PHELIPAEA

OKOBANCHEAE. 403

elliplicis canaliculalis, laterib. versus basin pilis carnosis cilialis glabris, ca-
lyce breviorib.; calyce quinqneffido, segmentis oblusis glabris; corolla ringenle,
lubo calyce subduplo longiore curvato, limbo bilabiato, labio superiori bifido
minore subereclo, segmcnlis rotundis emarginatis purpureis, inferiore patulo tri-
fidc, segmentis rotundis eraarginatis purpurascentib., inius flavis, fauce valleculis
duabus luteis instrucla; slaminib. 4 didynamis, inferiorib. longiorib. glaberrimis,
juniorib. in antherium lineare antheras^ superans productis quod postea marces-
cens ad antheram affingitur, antheris bilobis cordatis, pilis albis praeseriim ad
basin marginesque saccarum hirtis, juniorib hisce pilis arcte coalitis posl im-
pregnationem discedenlib.; polline ovali; pistillo glaberrimo ad basin ovarii disco
luteo circumdato, ovario conico uniloculari placenlis 4; stylo staminib. longiore
raedio angustalo curvato, glanduloso stigmale apice clavallo. ^? — Crescil in ra-

dicibus Calotropidis UamiUonii in „the Sich States".

25. PH. (OROBANCHE Cham. et Schlchtd. Linnaea IH. 134. f) CALIFORNICA G.

Don, General syst. of gard. and bot. IV. 632. no. 3. — Viscido-pubescent: scapo
simplici ; florib. corymbosis; calycib. bracteatis campanulatis regulariter quinque-
Gdis; corolla recta tubulosa ringente, labio supero plano, apice bilobo, infero
Irisecllo, laciniis dissitis linearib. acutis; staminib. ecalcaralis, antheris sagittalis
rira villosis; stigmate orbiculari pellato. 2].? — Tola breviter viscido-glanduloso-
pubescens. Scapus triplicaris, squamae lanceolatae aculae. Flores pedunculati,
pedunculi praeter squamam fulciantem bracteis duabus linear-lanceolatis in-
structus Calyx dimidiatus corollam aequans, laciniae lineares, basi dilatatae.
Corolla pollice longior tubulosa, labium superius planum vexilliforme bilobum,
lobis acutiusculis. Stamina non exserta. — Crescit in vicinia portus Sti. Francisci
in California.

26. PH. ARJVIENA C Koch, Linnaea XVII. 291. — Simplicissima, inferne glabra,

squamis carnosis coloratis ovato-acutis obtecta, superne cum bracteis ovato-
lanceolatis et bracteolis linear-lanceolatis albo-lanuginosa : calyce bracteis duplo,
corolla tripli breviore, lobis ovato-acutis inaequalib.; corolla recta subaequiloba,
intus annulo lalo albo-piloso notata ex quo slamina evadunt; seminib. nudis. 2f
— Species insufficienter descripla. — Crescit in planilie ad Araxem sita.

t Species non satis notae,

27. PH.? SUBACaulIS Bth. Scrophul. Indic. 55. — Caulis brevissimus crassus squa-
matus. Pedunculi in caule 3-5 squamis breviores uniflori. Calyx 6-7 lin. lon-
gus tubulosus, basi parum inflatus, apice irregulariter 4-5- dentatus. Corolla
2-2'/2-pollicaris, lobus basi tenuis e calyce breviter exserlus, dein in faucem
amplam dilatalus, limbus breviter et late subbilabiatim quinquefidus. Slamina 4

glabra. Antherae glabrae, loculis calcaratis. Stigma capitatum? Capsula ? —

Crescit in Peninsula Indiae orientalis.

28. PH. (OROBANCHE Pers. Enchir. II. 181) AEGYPTIACA Wlprs. mss. - Multi-caulis: litorib. longe pedunculatis; calycib. quinquefidis; filamentis glabris, an-
theris apice barbalis. ^ — Crescit in Aegypto.

tt Species e genere expellendae.

PH. ABBREVIATA Steud. = AEGINETIA ABBREVIATA.

PH. BIFLORA Spr. = ANOPLANTHUS UNIFLORUS.

PH. BIEBERSTEINII Fisch. = ANOPLANTHUS BIEBERSTEINII.

PH. COCCINEA Pers. = ANOPLANTHUS BIEBERSTEINII.

PH. FASCICULATA Spr. = ANOPLANTHUS FASCICULATUS.

PH. FOLIATA Lamb. = ANOPLANTHUS BIEBERSTEINIL

PH. INDICA Spr. = AEGINETIA INDICA.

PH. TOURNEFORTII Dsf. = ANOPLANTHUS TOURNEFORTII.

ttt Species prorsus incognitae.

•PH. CARNOSA C. A. Mey.

*PH. (OROBANCHE Mutel) SCHULTZII Wlprs.

*PH. (OROBANCHE Spenner) SICULA Wlprs.

[Begin Page: Page 464]

4184. CO\OPIIOLIIS Wllrh.

(Wllrh. Gener. Orob. diaaxeo-fj 78. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225.)

1. C. (OROBAACHE Linn. Suppl. 88. — Willd. Spec. planl. III. 351.) AMERICANA

Wllrh. 1. c. t — Scapus simplicissimus leres coloratus succulentus spithameus, tolus undique squamis ovato- oblongis acuminalis enerviis adpressis sessilibus flavescentibus, demum squamarum strobilorum abietinorum instar rigidibus imbricatus. Spica oblonga acuminata bracieis cooperta, partem scapi squamosam subaequans. Bracleae ternae, exterior exakte squamaeformis, sursum sensim minor, iniores calyci adpressae lineares acuminatae, calycem subaequantes. Flores subsessiles lutei concolores fere cum reliquis partibus. % — Crescit in Carolina ad arborum frulicumque radices.

4185. OROBA\HE Linn.

(Linn. Gener. plant. no. 779. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225. — Wllrh.

Gener plant. Orobanches JIAIKETH excl. sect. 2. 3. 4. — G. Don, General syst. of

gard. and bot. IV. 628.)

§. 1. Sepalis discretis v. in anteriore parte hasi concretis, posteriore liberis.

1. O. CRUENTA Bertol. Plant. Ital. rario. decad. III. 56. — Koch, Synops. fl. Germ.

(edit. 1.) 53-3. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 354. no. 2415., Plant. critic. YIII. fig. 896.

— Sepalis plurinerviis subaequaliler bifidis tubum corollae superanlib.; corolla campanulata, anlice basi strumoso- venricoosa, dorso arcuala, iabiis inaequaliter denliculatis glanduloso-fimbrialis, superiori galeato inlegro v. emarginalo, lobis palenlib., laciniis labii inferioris subaequalib.; staminib. basi corollae inserlis

dense pilosis, superne styloq. glanduloso-pubescentib.; disco stigmalis holosericeo elevato-marginato. -i — Corolla campanulata ampla, basi aniice strumosogibba, inlus sanguinea, slamina imae basi corollae inserita, stigma luteum margine fusco-purpureo cinctum et tota pilis copiosis brevibus glanduliferis tecla alque odore suaveolens dignoscitur. — O. gracilis Sm. Transact. of the Linn. Soc. IV. 172, — Rchb. Plant. critic. VIII. fig. 898. 899. — O. caryophyllata Vivian. Ann. bot. I. 175. — O. vulgaris Gaud. Fl. Helvet. IV. 176. O. caryophyllacea Schultz, Beitr. zur Knnlnss. der deutsch. Orob. 8. — Crescit parasitice in radicibus Loti corniculati et Hippocrepidis comosae in locis graminosis in Germania austriai, Helvelia et in Italia.

y?. leiosiemon Griseb. Spicileg. flor. Rumel. 11.55. — Rufescens, basi subaequalis: bracteis corollae cruentae tubum subaequalibus; sepalis nervosis subulatis bifidis; corollae tubo ad basin anlice ventricoso, dorso arcuato, limbo patentem glanduloso-ciliato; slaminibus imae corollae insertis glaberrimis, nunc ima basi pilosis. — O. annulaia Griseb. Reise II. 188. — Crescit parasitice in radicibus Thymi Serpylli in regione montana Macedoniae.

2. O. VERSICOLOR F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVII. 129. — Sepalis bivalvis oblongis plurinerviis, e basi ovata lanceolato-subulatis inaequaliter bifidis tubum corollae superans; corolla tubuloso-campanulata a medio tubi sensim ampliata, fauce amplissima, dorso recta, labiis denticulatis, superiori integro; slaminibus infra medium tubi insertis a basi uera medium lanuginoso-pilosus; stigmalis disco laevi. 2]. — Habilis O. cruentae, sed flores multo minores, corolla basi tubulosa, nec ventricosa, pallide flavescentes et supra ovarium atrosanguinea. — Crescit parasitice in radicibus Chrysanthemi coronopifolii prope Naupliam et Corinthum in Graecia.

3. O. SPRUNNERI F. W. Schultz 1. c. 130. — Sepalis plurinerviis e basi latissima

subrotunda lanceolato-acuminatis indivisis v. bifidis, margine dentalo-ciliatis,
corollae tubum vix aequanlib.; corolla a basi amplissima campanulata, anlice
basi strumoso-ventricosa, dorso curvata, labiis inaequaliier denliculalis glandu-
loso-fimbrialis, superiori inferiore mullo majori reclo suberaarginalo , lobis (in

[Begin Page: Page 465]

OROBANCHE. OROBANCHEAE. 465

vivo?) patentib., lacinia media labii inferioris lateralib. majori; staminib. ad ba-
sin corollae inserlis, a basi villosis, superne glabris slyloq. glanduloso-pubescentib.; bracleis brunneis sparsira villoso-pilosis. 2J- — Habitus O. cruentae, corolla
iQf.us sanguinea. — Crescit parasitice in radicibus Cisti cujusdam ad Melissam
prope urbem Naupliam in Graecia.

4. 0. BREVIFLORA F. W. Schultz 1. c. — Sepalis 3-5-nerviis e basi ovata lanceo-
lato-subulatis integris, tubum corollae aequantib. v. superanlib.; corolla a basi
amplissima campanulata, antice basi strumoso-venlricosa, dorso curvata, labiis
inaequaliter denticulalis glanduloso-fimbriatis, superiori subemarginato, lacinia
media labii inferioris lateralib. paullo longiore; staminib. basi coroUae insertis
glabriusculis, basi villosis. 2|. — Species dubia ex habitu afflnis O. cruentae.
Sligma, stylus et stamina exserta. — Crescit in Graeciae provincia Atlica.

5. 0. RAPUM Thuill. Flor. Paris. (edit. 2.) 317. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. IV.
t. 249. — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 923., Flor. Germ. excurs. 355. no. 2426. —
Koch 1. c. — Moulins, Annales des sc. natur. (2. Ser.) III. 69. f — Sepalis pluri-
nerviis subaequaliier bifidis integrisve tubum corollae subaequantib. ; corolla
campanulata anlice basi strumoso-ventricosa, dorso arcuata, labiis undulatis ob-

solete denliculatis (haud flimbriatis), superiori galeato emarginato, lobis patentib., labii inferioris lobo intermedio lateralib. duplo majori; staminib. basi corollae inserlis, inferne glaberrimis, apice styloq. glanduloso-pubescentib., disco stigmatis holosericeo immarginato. " — Corolla ampla campanulata O. cruentae, sicca luteo-fusca, antheris defloratis albis, slaminibus inferne glaberrimis et labiis non fimbriatis (conferas tamen iconera et descriptionem Alb. Dietr.) dignoscitur. — O. major DC. Fl. Franc. III. 488. (an eliam Linn. Spec. plant.??) — Rchb. Plant. crilic. VII fig. 900. et Fl. Germ. excurs. 354. no. 2417. — Engl. bot. t. 421. — Curtis, Flor. Londin. II. 1. 128. — Crescit parasitice in radicibus Genistae iinctoriae et scopariae in Germania australiori, in Helvetia, Gallia et Italia.

6. O. Ulicis Moulins, Ann. des sc. nat. IIL 71. i — Scapo graciliore elato, basi mediocriter incrassato sphaerico; squamis baseos paucis majusculis laxiusculis, reliquis paucis elongatis acutissimis; spica brevi laxe 20-40-flora; sepalis integris, rarius bidentatis bilobis; corolla magna trigona ventricoso-depressa, extus lutea, fauce dilatata sanguineo-rubra; staminib. paullo supra corollae basin afixis, basi pilosis, duobus posticis altius insertis; stigmale maximo intense luteo. 2]. — Planta saepe 18-20-pollicaris, colore universaliter citrinum et rubro-sanguineum ludens, odore Berberidis fugacissimo. — Crescit parasitice in radicibus Ulicis nani in Gallia (prope Lanquais).

7. O. PROCERA Koch, Dtschlnd. Flor. IV. 438., Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 534. — Sepalis plurinerviis late ovatis subaequaliter bifidis integrisq., tubo corollino breviorib.; corolla campanulata, antice basi strumoso-ventricosa, dorso curvata, labiis inaequaliter denliculatis, margine subglandulosis, superiore galeato emarginato, lobo intermedio labii inferioris [paullo majore; staminib. basi corollae insertis glabris, ima basi parce pilosis, apice styloq. subglandulosis. 2f — Crescit parasitice in radicibus Cirsii arvensis prope Manhemium.

8. O. PRUINOSA Lapeyr. Suppl. 87. — Rchb. Plant. critic. VIIIL fig. 911. — Koch[^]
Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 534. — (Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 55.) — Sepalis
quinquenerviis bifidis, laciniis subaequalib. angustis subulatis tubum corollae
aequantib. ; corolla campanulata, dorso subcurvata, labiis expansis undulato-
plicatis crispis obtuse denticulatis non ciliatis colorato-venosis, superiore bilobo,
lobis labii inferioris rotundalis, intermedio duplo majori; staminib. supra basin
corollae insertis, inferne villosis, apice styloq. glandulosis. © — Corolla magna
praecedentium sed tenuis substantiae, exsiccata papyracea, labiis magnis plicalо-
crispis instructa venisque coeruleis pulchre picla. — O. grandiflora Bory et

III. 59

[Begin Page: Page 466]

466 OROBANCHEAE. orobanche.

Chaub. Flor. Peloponn. 983. t I- 23? *) — Crescit parasitice in radicibus Viciae
Fahae in Europa orientali-auslrali.

9. O. ANGUSTISEPALA F. W. Schullz, Flora (B. Z.) XXVII. 130. - Sepalis uni- v.
obsolele quadrinerviis indivisis bifidisq. , e basi subovata angustissime subulalis,
tubo corollae breviorib. eumq. aequantib.; corolla campanulata, dorso subcur-
vala, fauce ampliata, labiis expansis undulato-plicatis obtuse et obsolete denti-
culatis, superiori subbilobo, lobis labii inferioris rotundatis, intermedio duplo
majori; staminib. supra basin corollae inseritis, inferne villosis. 2]. — Habitus
O. pruinosa. — Crescit parasitice in radicibus Orobi diglati in Hymelto monte
Graeciae.

10. O. SCABIOSAE Koch, Dtschlnd. Flora IV. 440., Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 534.

— Sepalis plurinervii» ovatis in apicem subulatum attenuatis, corollae tubum superantib., v. bifidis, laciniis parallelis; corolla campanulata, dorso arcuata, extus labioq. superiore intus piloso-scabris, pilis sparsis brevib. glanduligeris, tubero violaceo nigro insidenlib., labiis inaequalib. acule dentatis, margine crispis, superiore paullo sursum curvato bilobo, lobis patentib., laciniis labii inferioris aequalib.; staminib. prope basin corollae insertis, inferne sparsim pilosis, apice slyloq. subglabris. % — Similis O. Epithymo, differt autem caule crassiore altiore, tuberculis nigris piligeris corollae, lobis labii inferioribus aequalibus filamentisque apice glabris conniventibus nec arcualo-descendentibus. — O. cencolor Duby, Bot. Gallic. 350?? — Crescent parasitice in radicibus Chaerophyllo sylvestris, Menthae arvensis et Scabiosae columbariae (bei SBcrd^te^garben unb Scfer im i?cmgrei(^c aSaicrn) et in Galloprovincia.

11. O. SPECIOSA DC. Fl. Franc. III 490. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. III. t. 149.

(Flor. Marchic. 328.) — Sepalis plurinerviis, subito in acumen subulatum contractis tubum corollae aequantib.; corolla campanulata in medio dorso rectiuscula, superne antrorum curvala, extus labioque superiori, intus glanduloso-pilosus, pilis tuberculo ochraceo incidentib., labiis inaequalib. acule denticulatis, margine crispatis, superiore apice paullo sursum curvato bilobo, lobis patentib., laciniis labii inferioris subaequalib.; staminib. prope basin corollae insertis, inferne sparsim pilosis, superne glabris; stylo superne glanduloso -piloso. 2j. — O. pallidiflora Wimm. et Grabowsky, Flor. Silesiac. II. 233. f — Koch, Synops. fl. Germ. (edil. 1.) 534. — Crescent parasitice in radicibus Cirsii arvensis in Silesia, prope Frankofurtum ad Viadrum et in Gallia. — Scapus et flores cerino-flavescens, squamae luride brunneae.

12. O. CONDENSATA Moris, Slrp. Sard. elench. App. 8. — Rchb. Plant. critic. VII.

fig. 897. — Griseb. Spicileg. flor. Rumel. 11.56. — Superne villosa: squamis brac-
leisq. solitariis lanceolato-acuminatis corollam rubro-roseam excedentib.; calycis
bipartiti laciniis subbifidis; corollae labio superiore subbilobo; spica elongata
cylindrica compacta; styllo glabro; stigmate purpureo; staminib. basi pilosiuscu-
lis. 2}. — Crescit parasitice in radicibus Genistae Corsicae in Sardinia et in radi-
cibus Campanulae persicifoliae in peninsula Hajion-oros in Rumelia.

13. O. LEUCANTHA Griseb. Spicileg. flor. Rumel. 11. 57. — Pallescens palmaris,
basi subaequalis: bracteis corollae albae tubum subaequanlib.; sepalis 1-2-ner-
viis subulalis bifidisve; corollae tubo patente rectiusculo, limbo patenle; staminib.
suprabasilarib. glabris; stigmate violaceo. Ij- — Habitus tenuior, spica abbreviata,
corolla semipollucaris, stama ad basin inserlionis lana lutea brevissima instructa,
caeterum glaberrima alba, antherae brunneae tenuiler biaristatae, stigma biglo-
bosum declinatum. — O. alba (Stephan??) Rchb. Plant. critic. VII. fig. 912. (nec

*) O. GRANDIFLORA Bory et Chaub. I. c. — Pedalis v. sesquipedalis , pilis sub-
riscidis hispida: florib. dense spicatis; corollis majorib. tubulosis, tubi latUudine
quadruplo longiorib., limbo expanso patulo, lobis quaternis rotundatis denticu-
latis, labio superiori margine patulo expanso ; bracteis hifidis, laciniis subulalis
tubum vix superantib.; filamentis basi pilosis; styllo glahro; stigmate cordato.^"!
— Crescil in Peloponneso.

[Begin Page: Page 467]

OROBANCHE. OROBANCHEAE. 467

Buxb., M. Bieberst.). — Crescit in castanetis umbrosis prope Karaes in Rumeliae
peninsula Hajion Oros.

14. O. BARTLINGII Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 57. (adnot.) — Ochracea, basi subaequalis: bracteis coroliae pallidissime rubrae tubum subaequantib.; sepalis unirerviis subulatis, corollae tubo erecto-palente ad apicem arcuato-declivem usque recliusculo, limbo porrecto; staminib. suprabasilarib., inferne sparsim pilosis; stigmale saturate flavo. ^ — Caulis pedalis pallide ochraceus, squamis ochraceo-luteis. Spica elongata. Bracteae 6-8 lin. longae subulatae 3-5-nerviae. Sepala integra, dorso carinata rubescens-pallida glanduloso-Gmbriata. Corolla 8-10 lin. longa e basi aequaliter in tubum subcylindricum ampliata, labio utroque horizontaliter porrecto, superiori bilobo, inferioris lobis aequalibus subrotundis denticulato-ciliatis. Stamina superne glabra, antherae brunneae tenuiter mucronatae. Sligma ex styli apice uncinato pendulum biglobosum immarginatum glabrum laeve v. minutissime papillosum colore chromalis plumbi. — Crescit parasitice in Libanotide montana (in Unter^effen fcei SIKenborf).

15. C. CRASSISTYLA F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVII. 131. - Sepalis obsolete plurinerviis e basi ovata lanceolato-subulatis indivisis v. dente brevissimo bifidis, tubum corollae aequantib. ; corolla campanulata, dorso arcuata, extus glanduloso-pilosa, labiis inaequalib. denliculatis, lobo intermedio labii inferioris lateralib. longiore; staminib. prope basin corollae insertis, inferne sparsim pilosis, apice stijoq. glanduloso-pilosis; stylo crasso. ^ — Species dubia habitu O. Epithijmi. — O. comosa Sprunner mss. — Crescit parasitice in radicibus Cisti cujusdam in Graecia.

16. O. PUNCTATA F. W. Schullz 1. c. — Sepalis uni- v. obsolete plurinerviis, ex ovata basi lanceolato-subulatis indivisis v. bifidis, margine fimbriato-glandulosis, corollae tubum aequantib.; corolla campanulata, dorso arcuata , extus luberculis atro-violaceis punctata pilisq. glandulosa et venis violaceo-purpureis longitudi-

naliter picta, labiis inaequaliter denticulatis, lobo intermedio labii inferioris lateralib. longiore; staminib. prope basin corollae insertis, inferne squarais pilosis, apice styloq. glanduloso-pilosis. 2]. — Habitus O. Epilhymi, cuius forte varietas. — Crescit parasitice in Cisto quodam in Graecia.

17. O. EPITHYMUM DC. Flor. Franc. HL 490. — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 887. 88-8. 889. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 535. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. IV. t. 251. — Sepalis plurinerviis lanceolatis subulato-acuminatis tubo corollae longiorib. indivisis v. dente divaricato bifidis; corolla campanulata, dorso leviter arcuata, extus labioq. superiore intus glanduloso-pilosis, pilis tuberculo minutissimo insidentib., labiis inaequalib. acute dentatis, margine crispatis, superiore apice paulo sursum curvato bilobo, lobis palentib., lobo intermedio labii inferioris lateralib. duplo longiore; staminib. prope basin corollae insertis, inferne sparsim pilosis, apice styloq. glanduloso-pilosis; disco stigmatis velutino margine elevato destituto. ^ — Planta plerumque 5-6-pollicaris, viva sordide lutescens, saepe colore purpureo suffusa. Stigma obscure purpureum, antherae fuscae nec albae. — O. ruhra Sm. Engl. bot. t. 1786. — Hook. Flor. Londin. t. 105? — Wallroth, Gener. Orob. diaaxeo-^ 43. f?? — Rchb. Plant. critic. VII. fig. 885. — O. sparsiflora Willrth. Schedul. critic. 309. — O. paradoxa Koch mss. — O. nuda Koch mss. — O. major Wolf mss. — Epithymum Marant. Method. 175. [Willrth. Gener. Orob. diaaxB'J-q 48. f].

fi. rubiginosa : glandulis pallide rubiginosis adspersa: corolla longior angustior obscure fusco-purpurea, labio superiori protracto subluncato, lobulis deflexis, antherae flavae, stigma aurantiacum. — O. rubiginosa Alb. Dietr. Flor. Borussic. III. t. 252., Flor. Marchic. 331. — Crescit parasitice in radicibus Thymi Serpylli in ericetis campisque incuuis per tolam Germaniam, Galliam, Helvetiam et Britaniam.

18. O. LYCICA F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVIL 128. — Sepalis plurinerviis ovatis bifidis, dentib. lanceolato-subulatis tubum corollae aequantib, longioribq., rarissime dente altero sepali unius truncato; corolla tubuloso - campanulata, dorso

[Begin Page: Page 468]

468 OROBANCHEAE. orobanche.

curvata, fauce ampliata, labiis inaequaliter aculeq. dentatis, superiore bilobo, staminib. sub medio tubi inseritis , a basi ad medium subvillosis. ^— Habitus O. ruhentis et O. Epilhymi. — Crescit ad Lycos in Attica.

19. O. APICULATA') Wllrth. Gener. Orob. dtaaxBo-q 50. f — (Griseb. Spicileg. flor.

Rumel. n. 58. adnot.) — Rchb. Plant. critic VH. fig. 878?? — Ochracea, palmaris, basi subaequalis : bracleis corollae homochroae lumen subaequantib.; sepalis 1-2-nerviis subulatis bifidisq.; corollae tubo erecto-patenle, dorso arcuato, limbo patente; staminib. suprabasilarib., inferne sparsim pilosis; stigmate saturate flavo.

2j. — Caulis pallide ochraceus, squamae fuscescentes. Spica brevis, bracteis semipollicaribus ovato-lanceolatis 3-5-nerviis. Sepala 3-41in. longa bifida, dorso convexa binervia diaphana glandulosa. Corolla 6-8 lin. longa pallide ochracea nec rubescens, e basi aequaliter in lumen dorso arcuatum dilatata, apice declivis, labio superiori bilobo reflexo brevi , inferioris lobis patentibus, medio laterales latitudine duplo superante. — Crescit parasitice in radicibus Pelargonu graveolentis in ollis hortorum (in Thuringia) et in radicibus Libanotidis montanae (in Unter%^cffcn bet 2lttenfcDrf.)

20. O. DIAPHANA F. W. Schultz Flora (B. Z.) XXVIL 130. — Sepalis trinerviis diaphanis lanceolatis indivisis, corollae tubum vix aequantib.; corolla tubuloso-cam-

panulata, dorso vix curvata, labiis inaequaliter denticulatis, superiori paullo sursum curvato; staminib. supra basin corollae insertis, basi subvillosis. 2j. — Habilus O. Galii, cuius forte varietas. — Crescit in Graecia (in Phtiotidi).

21. O. GALII Duby, Bot. Gallic. I. 349.**) - Rchb. Plant. critic. VII. fig. 892-895. -

Alb. Dietr. Flor. Borussic. III. t. 146. - Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 535. —

*) Eadem esse dicitur ac O. Hederae, quam conferas infra pag. 472. no. 40.

**) Ad hanc pertinere videntur sequentes, quas pro varietatibus habeo:

1. O. ADENOSTEMON Rchb. Plant. critic. VII. fig. 894., Fl. Germ. excurs. 354. no. 2414. — Rohusta testaceo - ochracea , superne tota glandulosa: corolla ampliata, labii inferioris laciniis planis rotundatis : sepalis bifidis [antice?] cohaerentib.; stylo filamentisq. glanduliferis ; stigmate divaricato -bigloboso. 2j. — Crescit parasitice in radicibus Galii Molluginis (tci iTcclfccn).

2. O. KRAVSEI Alh. Dietr. Flor. Iliorussic. VII. t. 437., Flor. Marchic. 332. f —
Glandulosa: squamis linear-lanceolatis ; spica hrevi densa; bracteis quam flores hreviorib.; sepalis bifidis, laciniis inaequalib. acutis; corolla tubulosa subrecta, labiis crenulatis , superiori suhtruncato emarginato, lobulis demum reflexis, inferioris patenlis laciniis ohlongis rotundatis, media majori; filamentis inferne villosis, superne glandulosis ; stylo glanduloso , stigmate obverse reniformi tate-ritio. 4 — Plonta 6-8-pollicaris pallide sulphurea, glandulis aureis obsita.

Spica l-S-pollicaris, bracteae lanceolato-lineares. Flores pallide sulphurei suhruhicu7idi semipoUicares. — Crescil parasitice in radicibus Galii veri (bet bein ®ci-fe 5>?crqe fiintev betn Stctbtc&en Dlaucn in ber COiarf S3rambent>urq).

3. O. MACRANTHA Alb. Dietr. Flor. Borussic. VII. t. 438 , Flor. Marchic. 334. f —

Glandulosa: squamis inferiorih. subrotundis, suhito acuminatis , superiorib. li~
nearly-lanceolatis ; spica elongata; hracteis flores excedentih.; sepalo unico colla^
riformi quadrifido , laciniis acuminatis, exteriorib. majorih.; corolla maxima
curvata, labiis crenulatis, superiori emarginato porrecto, inferioris trilohi laci-
nia media majori; filamentis inferne villosis, superne glandulosis; stylo glandu-
loso, stigmate divaricato-higlobuloso purpureo. ^ — Planta bipedalis pallide
fusca rubro-suffusa, glandulis aureis obsita, basi tuberoso -incrassata. Spica
ultra semipedalis remotiflora. Sepala antice coalita. Corolla ultra pollicaris
valde incurva flavescenti-ferruginea. Flores Dianthum redolent. — Crescit pa-
rasitice in radicibus Galii [bci fcem ^oxft SBcrge ci)n)3)dt tcS @tdbtd&cn§ Slauen in bcr
a)iarf JBrancnburq).

4. O. TORQUATA Rchb. Plant. critic. VIII. fig. 1128. — Alb. Dietr. Flor. Borussic.
IV. t. 440., Flor. Marchic. 335. f — Glandulosa : squamis inferiorib. ex ovali basi
longe acuminatis; spica elongata; hracteis corollam fere aequantib.; sepalis an—
tice coalitis in phyllum coUariforme quadrifidum, laciniis exteriorib. linearib.,
intermediis abbreviatis; corolla subcurvata , labiis crenulatis, superiori galeato
emarginato, inferiori triloho , laciniis subaequalib.; filamentis inferne villosis,
superne glandulosis ; stylo glanduloso ; stigmate higlobuloso purpureo. ^ — Si—
millima praecedenti , sed differt fioribus minoribus rectioribus hractea semper
longioribus calycisque laciniis intermediis abbreviatis obtusissimis. — Crescit
parasitice in radicibus Galii (6ci bcni J^crfe iBerqc cl&nnjeit bc^ ^@tvibtc^cn^ Slauen in
bcr a)iarf ^Branbenturg).

[Begin Page: Page 469]

OROBANCHE. OROBANCHEAE. 469

Sepalis plurinerviis subaequaliter biOdis, lumen corollae diraidium aequanlib.,
anlice conliguis connatisq.; corolla e basi sensim ampliala campanulala, dorso
curvala, labiis inaequaliler denticulatis, superiori galealo, laterib. porrectis (non
patenibus), labii inferioris laciniis ovatis subaequalib. porrectis, tubo diradio
breviorib.; starainib. supra basin corollae insertis dense pilosis, superne styloq.
glanduloso-pilosis; disco siigmalis velutino margine elevato destituto. ^ — Stigma
obscure purpureum. — *O. caryopliylacea* Sm. Transact. of the Linn. Soc. IV.

169. - C. A. Meyer in Ldb. Flor. Altaic. IL 452. f - Wllrth. Gener. Orob, 8ia-
cxB-jTi 35. t (excl. syn. plurib.). — *O. vulgaris* DC, Fl. Franc. III. 489. — *O. Bi-*
pontina F. W. Schultz, Beitr. zur Knntnss. der deutsch. Orob. 7. — *O. caryo-*
phyllacea Rchb. Fl, Germ. excurs. 353. no. 2412., Plant, critic. VII fig, 890. 891, —
O. strohiligena Rchb, Plant, crilic, VII flg. 905. 906., Flor. Gerra. excurs. 355, no.
2420, — *O. laxiflora* Rchb, 1. c. no. 2421,, Plant. critic. VII. fig, 908, 909. 910, —
Alb. Dietr, Flor, Borussic. IV. t. 253. t — *O. major* Pollich, Fl. Palatin. II. 200.

— *O. tubiflora* Alb. Dielr. Flor. Borussic. III. t, 147, — *O. mutila* Dumort. Florul.
Belgic, 33. [diagnosis pessima!!!] — Crescil parasitice in radicibus Galii veri et
Molluginis per totam Germaniam, Britanniam, Galliam, Helvetiara et in Rumelia.

22. 0. GLABRATA C. A. Meyer in Eichwld, Plant, nov. Casp. Caucas. 16, t t, 17.

— Furfuracea: squamis subfloralib, linearib. florem aequantib.; sepalis indivisis
lineari-lanceolatis; corollae subcampanulatae rectiusculae labio inferiore paullo
breviore, lobis obtusis denticulatis, intermedio longiorej filaraenlis basi glaber-
rimis, apice styloq, subglandulosis; stigmate emarginato, "4 — Scapus quinque-
pollicaris, Corolla (sicca) sordide el obscure rufa faucem versus paullo ampliala
semipollicaris, — Accedit ad *O. Galii* formas minores paucifloras, satis tamen
differt staminibus basi glabris nec hirsutis laciniaque raedia labii inferioris lon-
giori. — Crescit in Kachetia.

23. 0. AVELLANAE Pfund, Flora (B. Z.) XXVI. 183. t - Sepalis plurinerviis subaequaliter bifidis, margine anlico dente unico instructis contiguis v. coalilis, tubum corollae dimidium subaequantib., laciniis lanceolatis acutis ; corolla tubulo-carapanulata anlrorsum curvala , labiis obluse v. obsolete denticulatis glanduloso-ciliatis, superiori obtusissirae emarginato, lobis duobus acutis patentib. diviso, inferiori inaequaliter trilobo; filaraentis supra basin corollae inscrts, interne pilorura densorura serie raunilis styloq, superne glanduloso-pilosis ; sligaate laevi. 2|, — Scapus 8-10-pollicaris pallide raellitus glandulosus. Squaraae lanceolatae longe acuminatae fuscae. — Crescit parasitice in radicibus Coryli Avelanae in Bohemia (6ei ^xaq in einem 2Balb(^en „bem @terne").

24. 0. RUBENS Wllrth. Gener, Orob, dcacxaurj 46, t — Koch, Synops, fl, Germ.
(edit, 1.) 535. — Sepalis plurinerviis late ovalis subulato-acuminatis, antice posticeq, dente instruciis v, inaequaliter bifidis, tubum corollae subaequantib., antice

5. 0. GILVA Alb. Dietr. Flor. Borussic. VII. t. 439., Flor. Marchic. 336. t — Glan-dulosa: squamis inferiorib. imbricatis oblongis; spica elongata, inferne laxa; bracteis florum longitudine ; sepalis antice coalitis in phyllum collariforme quadrifidum, laciniis acutis, exteriorib. sublongiorib.; corolla subcurvata, labiis cre-nulatis, superiori galeato emarginato , inferiori trilobo, lacinia media parum longiori; fxlamentis inferne villosis , superne glandulosis; stylo glanduloso ; stig-mate divaricato-higloholuso purpureo. "4 — Planta pedalis colore ceraceo—flavo, hasi vix incrassata. Flores magnitudine] 0, Krausei sed magis incurvati. — Crescit parasitice in radicibus Galii (6et bem fDorfe aSerfle cBntoeit be^ @tabt^en6 SJiauen in ber ^Jlaxt a^vanbenburg).

6. 0. CITRINA Alb. Dietr. Flor. Borussic. VII. t. 441., Flor. Marchic. 336- t — Glan-

dulosa: squamis inferiorib. paucis ohlongis; spica densiuscula, apice comosa;
hracteis flores excedentih.; sepalis antice coalifis in phyllum collariforme quadri-
fidum, laciniis acutis, exteriorih. longiorib.; corolla curvata, labiis subcrenulatis,
superiori galeato emarginato, inferioris trilobi porrecti laciniis subaequalib.;
filamentis inferne villosis, superne glandulosis; stylo glanduloso, stigmate pur-
pureo incrassato hifido. — A praecedentibus differt colore pallide citrino tum
scapi, quum florum, et stigmate minutissime hifido. — Crescit parasitice in ra—
dicibus Galii (6ei bem 3)orfe a?evge oi^ntreit be6 ©tcibtd^eng 9Zauen tn ber aJiarf ®ran=—
beuburg unb tet JBaumgavtcnbrucf l^ntter ^ot^bam).

[Begin Page: Page 470]

4T0 OROBANCHEAE. orobanche.

conliguis v. coalilis; corolla e basi curvata tubuloso - campanulata, dorso recta,
apice galeala declivi, labiis inaequaliter dentatis, superiore bilobo, lobis paten-
tib., iabii inferioris ovatis subaequalib., lateralib. patenlib.; staminib. in curva-
lura corollae insertis a basi ad medium dense pilosis; sligmais disco velutino
margin'e elevato destituto. 2]. — Corolla 9-10 lin. longa lubulosa, tubo supra basin
conspicue curvato, dorso recto v. subimpresso, labio superiori insigniter galeato
et curvato apiceque paullo sursum curvato haec species statim dignoscitur.

Sigma cerino-flavum. — O. elatior Koch et Ziz. Cat. pl. Palat. 12. — Rchb. Plant.

critic. VII. fig. 901. 902. — O. elatior Sutton, Transact. of the Linn. Soc. IV. t. 17.

— Engl. bot. i. 568. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 354. no. 2418. — Alb. Dietr. Flor.

Boruss, III. t. 148., Flor. Marchic. 330. — O. Bueckii Alb. Dielr. Flor. Borussic, III.

1. 145., Flor. Marchic. 329?*) — O. lutea Baumg. — O. Medicaginis F. W. Schultz,

Ann. d. Rgnnsbrgr. Gsllschft. V. 505. — Crescit parasitice in radicibus Medicaginis

falcatae et sativae per Germaniam et Galliam.

25. 0. GRANDISEPALA F. W. Schultz, Flora (B. Z.) XXVII. 128. - Sepalis plurimerviis ellipticis, apice tridentalis corollam aequanlib. v. superantib., dentib. subulalis, superiori inferiorib. duplo v. quadruplo longiore; corolla tubulosa subcampanulata subarcuata, laciniis denticulatis; staminib. infra medium tubi insertis, a basi ad medium parce pilosis. 2|,? — Planta magna bipedalis et allior, flores raagnitudine florum O. minoris, habilus vero O. rubentis v. O. Centaureae. — In Graecia ad Naupliam crescit.

26. 0. SUBVERTICILLATA F. W. Schultz I. c. — Sepalis obsolete quinquenerviis ovalis inaequaliter bifidis v. indivisis tubum corollae aequanlib.; corolla lubuloso-campanulata arcuata, labiis inaequaliter denticulatis, superiore vix bilobo; staminib. in curvatura corollae insertis, a basi ad medium subvillosis. 2j. — Habitus O. rubentis, sed flores paullo minores. — Crescit parasitice in radicibus Viciae cujusdam prope Thebas in Graecia.

27. 0. LILACINA F. W. Schultz I. c. 129- — Sepalis obsolete 1-3-nerviis, e basi ovala subito subulatis indivisis v. dente brevi auctis lubum corollae aequantib. v. superantib.; corolla tubuloso-campanulata, dorso leviler arcuata, labiis obsolete denliculalis, lobis rotundato-truncalis subaequalib.; slaminib, sub medio lubi insertis, inferne pilosis. '4- — Habitus O. rubentis, sed minor. — Crescit in Graeciae provincia Attica.

28. O. LORICATA Rchb. Fl. Germ. excurs. 355. no. 2423. (excl. synon.) - Koch, Synops. fl. German. (edit. 1.) 536. - [Alb. Dietr. Flor. Borussic. IX. t. 580?] - Sepalis 3-5-nerviis bipartitis tubum corollae aequantib.; corolla tubuloso-campanulata dorso recta, apice antrorsum curvata, labiis obtuse denliculatis, superiore bilobo, lobis paletib.; staminib. sub medio tubi insertis glabris, basi parce

pilosus; stigmatib. disco ? ^ — Sepala angusta profunde divisa, corollam

aequantia v. superantia, corolla 7-8 lineas longa, a basi ad labium inferius usque recta, in dorso labii superioris tanum paulo curvata, labium bilobum palens, lamina parce pilosa, alle supra finem lertiae parlis tubi inserita. — O. elalior Schleich. Pl. exsicc. — O. Artemisiae campestris Gaud. Fl. Helvet. IV. 479. — (O. major Bull. Herb. t. 359?) — Crescit parasitice in vadibis Artemisiae campestris

*) O. BUECKII Alb. Dietr. I. I. c. c. — Scapo glabro sesquipedali; squamis inferiorib. ex ovata basi lanceolatis, superiorib. lanceolato-linearib. ; spica elongata ; bracteis longitudine iubi corollini; sepalis inaequaliter bipartitis, segmentis lanceolatis acutis; corolla tubulosa, labiis denticulatis, superiori erecto emarginato, lobulis revolutis, inferioris deflexi laciniis rotundatis , intermedia longiori ; filamentis puberulis ; stylo glabro; stigmate divaricato-biglobuloso fiamo.

2J. — Tota fusco-virens v. purpurascens. Spica Q-H-potlicaris laxa. Bracteae lanceolato-lineares multinerves. Sepala virescenti-fusca ciliata. Corolla pallidior pioxa ex virescenti fusca, nervis purpureis percussa. Stylus apice purpurascens, stigma cerino-flavum. — Flores spargunt odorem (.onvallariae majalis. — Crescit parasitice in radicibus Medicaginis falcatae prope Frankofurtum ad Viadrum.

[Begin Page: Page 471]

OROBANCHE.

OROBANCHEAE. 47

in monlosis incullis (auf tcn 2Scjiev56ergcn bci 5(fd^cr6(c6en nnb bci grantenlnuifcn in

3:^iiringen, auc^ im (lantcn 2SaUiC'-

29. 0. GALLICA Grenier, Flora (B. Z.) XXIL 576. — Sepalis indivisis corolla dimidio minorib.; corolla tubulosa , tubo ad medium curvalo coarclato, dein subcyindrico, laciniis labii inferioris tribus subaequalib. obovatis flimbriatis saepeq, mucronalis, labio superiori retuso tenuilerq. denliculalo; staminib. glabris infra medium lobi insertis; ovario sligmateq. glabris; coroliis praeserlim intus inlense coeruleis. ^ — Crescit parasilice in radicibus Jr^emmae GaZ/icaein Gallia auslrali.

30. O. PICRIDIS F. W. Schultz mss. in Koch, Dtschlnd. Flor. IV. 453., Synops. 11. Germ. (edit. 1.) 536. — Sepalis uni-binerviis integris v. antice dente auciis tumum corollae superantib.; corolla tubuloso - campanulata, dorso recta, apice anlrorum curvala, labiis obluse denliculatis, superiori integro, margine lateraliter patulo; staminib. fere in medio tubi insertis, a basi ultra medium dense pilosis, superne verruculoso- scabrellis ; sligmalis disco sublaevi granulis minutissimis obtusissimis dense obtecto. O — Sigma sordide violaceum. Simillima O. loricatae, sed caulis superne et bracteae multo magis villosae, sepala uninervia, rarius dente aucta et lunc trinervia, corolla superne paullo magis antrorum curvata, labium superius integrum, slamina a basi supra medium dense pilosa et supera verruculosa. Quam O. flava pilosior est, sepala corollae tubum superant, corolla dorso mullo minus curvata est et labium superius integrum, lateribus vix patulis, nullo modo refraclis, filamenla longiora, apice mulio minus curvala sunt, stigma ultra filamentorum curvaluram prominent sordide violaceum nec cerino- flavum, latius et in disco subliliter granulatum non cicalrisalura. Ab O. lucorum differit: corolla recta, antice lantum paullo curvata, labiis obluse crenulatis, labio superiore integro, inserione staminum altiore el stigmate subliliter granulalo. — Crescit parasitice in radicibus Picridis hieracioidis in Germania.

31. O. STIGMATODES Wimmer, Flora v. Schlesien 280. — Sepalis subaequaliter bifidis, laciniis rectis lanceolatis, apice contiguis v. coalilis enerviis, lobo corollino paullo breviorib.; corolla tubuloso-campanulata, dorso arcuala, labio superiori obsolete trilobo, lobis rectis, laciniis labii inferioris subaequalib. oblongo-ovatis, omnib. margine eroso-denlatis; staminib. suprabasilarib., infra villosopubescentib., supra glandulosis arcuatim deQexis; stylo parce glandulifero. 2|- —
Siigma e labio superiori exsertum, primum cerino-flavum, tunc aureum holosericeum capitato-bilobum. Scapus l-r/o-pedalis. Spica semipedalis densiflora 20-30-flores exhibens. Sepala saepe antice in phyllum collariforme quadrifidum coalita. — Crescit parasilice in radicibus Centaureae Scabiosae in agris Silesiae (bci fccn ©S^jggruBcn bei 3)irf^e(in £)bcrcfc!^(efien).

32. O. FLAVA Martius mss. apd. F. W. Schultz, Beiträge zur Kntnss. d. deulschen Orobancheu 9. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 536. — Sepalis uninerviis v. obsolele trinerviis inlegris v. antice dente aulcis tubum dimidium aequanlib.; corolla tubuloso-campanulata, dorso curvata, labiis denticulatis, superiori bilobo, lobis reflexis retrorsum accumbentib.; staminib. fere in medio tubi inserlis, a basi ultra medium dense pilosis; stylo glabro, stigmalis disco verrucoso-cicatrizzato. ^ — Valde insignis est lobis labii superioris refractis et poslice sibi contiguis. Tota cerino- v. dilute flava, corolla 7 lineas longa, stamina longiora apice manubrii inslar valde arcuata et descendenta, stigma cerino-flavum. — Crescit parasilice in radicibus Tussilaginis niveae (auf fcen 3far*2tuen bei 3}iiin^en).

33. O. LUCORUM Alex. Braun mss. apd. Schultz, Annalen der Gwchsknde. V. 504.
— Koch 1. c. 537. — Sepalis binerviis inaequaliter bifidis, tubum corollae aequanlib.; corolla lubuloso-campanulata, dorso curvata, labiis subtiliier glanduloso-ciliatis obsolele denticulatis, superiore bilobo, lobis patenlib.; slaminib. prope basin corollae insertis a basi supra medium dense pilosis; stylo glabro, sligraaiis disco laevi velutino. ^ — Insigniter differt a praecedente: colore flavo-rubente,

corolla ampliore, rictu multo majore, lobis patenibus non refractis, filamentis
longioribus apice multo minus curvatis, stylo ultra staminum curvaturam emerso

[Begin Page: Page 472]

472 OROBANCHEAE. orobanche.

erstigmate majore fusco-rubro profundius bilobo, velulino nec verrucoso-cica-

trisato. — O. loricata Rchb. Plant. critic. VII. fig. 918. — An eliam Alb. Dietr.

Flor. Borussic. IX. t. 580.??? — Crescit parasilice in radicibus ^erJendjs rw/g-arw

(Bter^er Hc^ im (SngUf^cn ®avten ju Wmx^txi unb in bcn Baierfc^en 5lt^jen t»ei 5|3arten=

fir(3^cn BeoBad^tct).

^. Rubi Alex. Braun mss. apd. Koch, Dtschlnd. Flora IV. 458. (nec Vauch.) —

Florib. paulio majorib. et amplioribus. — O. Rubi Duby, Bot. Gallic. 350. —

Crescit parasitice in radicibus Rubt caesii.

34. 0. ARCUATA F. W. Schullz, Flora (B. Z.) XXVII. 129. - Sepalis obsolele 2-3-
nerviis e basi ovata lanceolalis integris v. dente divaricato tenuissimo bifidis,
lubum corollae aequantib.; corolla tubulosa arcuata horizontaliter patente et penes
sursum curvata, tubo supra ovarium vix coarctato et fauce ampliata, laciniis den-
ticulatis rotundatis, labio superiori inferiori multo majori ; staminib. supra basin

corollae insertis et ultra medium villoso-pilosis. 2]. — Species parva pilis albidis
sparsim lanuginosa, floribus xerampelinis brevioribus quam O. minoris instructa.
— Crescit in Graeciae provincia Atlica.

35. 0. KLUGEI Schmitz et Regel, Flora Bonnens. 190. — Sepalis corollae tubum
aequantib. e basi ovato-oblonga biOdis binerviis, laciniis subaequalib. subulato-
acuminatis; corolla tubulosa superne leviter antrorsum curvata, extus laevi, dorso
glanduloso-pubescente, labio superiori emarginato eroso-denticulato, demum
erecto, inferioris trilobi laciniis lateralib. e basi ovato-subrotunda acuminatis
obsolete Irifidis cuspidatis acute dentatis, media majori acute denticulata, saepis-
sime nervo medio excurrente cuspidata; staminib. supra basin insertis sparse
pilosulis; slylo glabro, stigmate cerino-flavo. 2]. — Planta pedalis v. sesquipedalis
eleganter carneo-purpurea glanduloso-pubescentis nilida. Bracteae floribus lon-
giiores pallide purpurascentes. Spica elongata apicem versus densiflora subco-
mosa. Corolla 6-8 lin. longa dorso laete purpurascens, antice pallida, venis in-
lensis coloratis percursa. — Crescit parasitice in radicibus Trifolii medii (6ci
bcm 2)orre Sinj in ber 9Za^c i^cn SSonn fcis^er aUein gefunben).

36. 0. PARVILOBA F. W. Schultz , Flora (B. Z.) XXVII. 128. — Sepalis obsolete
3-6-nerviis e basi ovata lanceolato-subulatis bifidis, rarissime indivisis corollae
tubum superanlib.; corolla tubulosa subarcuata, laciniis parvis obsolete denlicu-
latis; slaminib. infra medium tubi insertis sparsim villoso-pilosis. 2], — Habitus
O. Salviae. Planta praesertim in inflorescentia pilis albidis subvillosa, exsiccala
griseo-ochroleuca. — Crescit in Graecia ad Naupliam.

37. 0. SALVIAE F. W. Schultz, Annalen der Gwchsknde. V. 505. — Koch, Synops.
fl. German. (edit. 1.) 537. — Sepalis uninerviis inaequaliter bifidis tubum corollae
superantib.; corolla tubuloso-campanulata, dorso curvata, labiis denticulatis sub-

ciliatis, superiori bilobo, lobis porrectis; slaminib. supra basin corollae insertis, a basi ultra medium dense pilosis, superne pilis glanduliferis parce adspersis; stigmatis disco velutino. 2]. — Stigma intense cerino-luteum. Simillima O. lucorum, a qua differt sepalis semper uninervis, labiis copiose denticulatis, lobis labii superioris semper porrectis nunquam patenibus stigmateque cerino - flavis. — Crescent parasitice in radicibus Salviae glutinosae in subalpinis (in ben (SaljBurger 2t(i^en, bcr Otamlau Bei aSerc^teggaben unb in ben SSaierfc^en iUpin jnjifc^en ScnflrieS unb ber @la§]&iitte).

38. O. CAROTAE Moulins, Ann. sc. nat. III. 78. f — Scapo gracili, leviter striato, basi non aut vix incrassato; squamis baseos paucis, laxis elongatis acutis, reliquis perinde paucis, angustis, apice reflexis; spica densa laxave, brevi, dimidium scapum nunquam aequante; sepalis semper profunde bifidis; corolla parva, cylindracea, gracili, incurva; staminib. longe supra corollae basin affixis, basi villosis, stigmale violaceo. O — Planta 10-22-pollicaris rubro- violacea. — Crescent parasitice in radicibus Dauci Carotae in Gallia (prope Lanquais).

39. O. MIXOR Sutlton, Transact. of the Linn. Soc. IV. 178. — Rchb. Plant, critic. VII. fig. 876. 877. 879. 880. , Fi. Germ. excurs. 353. no. 8407. — Koch, Synops, fl. Germ. (edil. 1.) 587. — Sepalis plurinerviis, e basi ovata subilo angusle subulatis

[Begin Page: Page 473]

OROBANCHE OROBANCHEAE. 473

bifidisve, laciniis subulatis lubum coroiae aequaniib. v. longiorib.; coroiae tuberosa arcuata, labiis obtuse denticulatis venosis undulatis, superiore bilobo porrecto, lobis labii inferioris subrolundis subaequalib.; slaminib. sub medio tubi

insertis glabris, inferne pilis sparsis obsitis. © — Stigma purpureum v. lilacinum.

Similis *O. amethystea*, differt tamen bracteis e basi ovata lanceolatis, tubum v.

etiam corollam aequantibus, corolla aequilata quidem, sed breviore tubulosa

sensim curvata, nec subito in genu flexa, labii rotundatis obtuse denticulatis

staminibusque minus alle insertis. — *O. arvensis* Dumort. Florul. Belgic. prodr.

33? (diagnosis pessima). — Crescit parasitice in radicibus Trifolii pratensis (6 et

a Sonn, in ben (Santoncn a Uaabt unb 2 Battis, fo i Die Bei giume in Sfrten).

40. 0. HEDERAE Vauch. Monogr. Orob. 56. t. 8. — Scbmitz et Regel, Flora Bon-

nens. 191. — (Moulins, Ann. des sc. natur. III. 80. f) — Scapo gracili valde striato,

basi in sphaeram incrassato; squamis baseos lalis imbricatis, reliquis laxis lan-

ceolatis acutis; spica longissima dense multiflora; sepals magis minusve bifidis,

saepius integerrimis; corolla parva cylindracea gracili incurva, fauce coarctata,

laterib. compressissima; staminib. longe supra lobi basin affixis, basi parce pi-

losis (pilis deciduis), posticis ab invicem remotissimis; stigmate luleo. 2j. — Planta

6-21-pollicaris e luteo violascens. Odor levissime mellitus. Stamina poslica

saepe abortiva. — *O. harhata* Poir. et Rchb. Plant. critic. VII. fig. 881. 882., Rchb.

Fl. Germ. excurs. 353. no. 2408. — Crescit in radicibus Hederae Helicis in Eu-

ropa australiori.

41. O. AMETHYSTEAE Thuill. Fl. Paris. II. 317. - Rchb. Plant. critic. VII. fig. 920.

921. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 355. no. 2425. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.)

538. — Sepals 3-6-nerviis e basi ovata subito angustata subulato-atenuatis bi-

fidisve, laciniis angustis subulatis corollam aequantib.; corolla tubulosa, basi

subito in genu flexa et antrorsum curvata, deinde reciuscula, labii inaequaliter

acule denticulatis undulato-crispis ramoso-venosis, superiore galeato porrecto

emarginato v. subquadrilobo, lobis laterilib. labii inferioris subbilobis, interme-

dio duplo majore 2-3-fido; staminib. corollae curvatura insertis glabris, inferne

sparse pilosis. 2^- — Caulis violaceus v. purpureus, flores albidii v. dorso leviter

lilacini v. toti lilacini venisque purpureis picti. Stigma fuscum v. rubro-fuscum.

— O. Eryngii Duby, Bot. Gallic. I. 350. — O. elatior fi. microglossa Vf Unh. Gener.

Orob. d7aa)cEu-f} 51. — Crescente parasitice in radicibus Eryngii campestris in Europa occidentali-australi.

42. 0. HISPANICA Boiss Voyage bot .dans le midi dep Espagne no. 1282. — Caule simplici parce puberulo, spica densa; florib. bractea unica ovato-triangulari acuta nigricante glabrescente parallela sulcata-striata suffultis; calycis disepali glabriusculi sepalis multinerviis subbicoloriatis, ad terliam partem bifidis, lobis acutis bracteae aequantibus, corolla dimidio brevioribus; corolla parva glabrescente, coerulea incurva, supra ovarium coarctata, limbi vix ampliati lobis rotundatis subintegris; antheris paulo infra corollam dimidiata insertis glaberrimis. 2j. —

Crescit in arenosis Hispaniae australis.

43. O. FRAGRANS Koch, Dtschlnd. Flor. IV. 463., et Synops. fl. Gerraan. (edit. 1.)

638. — Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 58. - Sepalis integris v. inaequaliter bifidis; corolla basi tubulosa, superne sensim ampliata, dorso curvata; staminibus in medio tubi inseritis e basi arcuato-patenti ascendentibus, inferne piosis, superne glabris; sacculis antherarum breviter lenuissimeque mucronatis. 2^.? — Planta etiam exsiccata fragrans. - O. coerulea Friv. Hb. — Crescent in Austria inferiore et in Macedonia.

44. O. CURVIFLORA Viviani , Plantar. Aegypt. decad. 22. no. 29. t. 2. fig. 17. -

Furfuraceo-hirsuta: scapo squamoso; spica compacta multiflora; bracteis ovatis acutis corolla duplo brevioribus; calyx bipartito, laciniis bifidis, lacinia altera linearis-obtusa, altera antica ovalis; corollae tubo (candido) incurvalo cylindraceo, labio superiore bilobo, laciniis subrotundo-ovatis crenulatis, inferioris tripartiti subaequalibus similibus, omnibus crenulatis coeruleis, germine staminibus corollatis,

[Begin Page: Page 474]

474 OROBANCHEAE. orobanche

glaberrimis. ^ — Filamenta brevia medio lubo inserta. Corolla fere rectangule curvata. — Crescit parasitice in radicibus Phoenicis dactyliferae in Aegypto.

45. O. FERRUGINEA C. Koch, Linnaea XYII. 291. — Simplex, superne pilis ferrugineis obtecta: squamis raris minutis; bracteis ovato-lanceolatis; sepalis lanceolatis corolla ampliata minorib. minusq. denticulalis; labio corollae superiori galeato truncato, inferioris laciniis subaequalib.; staminib. et pistillo glaberrimis.
2^? — Species non sufficienter descripta! — Crescit in planicie ad Araxen sita.

46. O. COERULESCENS Stephan mss. in Willd. Spec. plantar. III. 349. — Rchb.
Plant. critic. VII. fig. 925. — Fl. Germ. excurs. 356. no. 2427. — Alb. Dielr. Flor.
Borussic. VIII. t. 511. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 538. — Sepalis indivisis bifidisq. tubo corollae longiorib.; corolla tubulosa, tubo curvato, inferne ovato, supra ovarium coarctato, laciniis labii inferioris concavis; staminib. supra medium tubi inseritis, basi parce pilosis. 2]. — Flores e minoribus coerulei. Spica lanatovillosa in speciminibus exsiccatis quasi mucore obducta. — Crescit parasitice in radicibus Artemisiae campestris ad ripas Danubii [Itz JRegensburg) et in planicie trans Araxen sita.

47. O. COLORATA C. Koch, Linnaea XVII, 291. — Rubro-brunnea glaberrima:
squamis aequalib. ovato-lanceolatis, superiorib. flores excedentib., crassiusculis;

sepalis ovato-lanceolatis ex basi subconnatis (antice? aut postice?); corollae carnosae labio superiori galeato bilobo, extus piloso, inferiore trilobo, palalo in-tracto(?); filamentis glabris ex basi porrigentib. (?); stylo bicapitato (!!) glabro. ^j.
— Species insufficienter descripta. — Crescit in Armenia.

48. 0. AMMOPIIILA C. A. Meyer in Ledeb. Flor. Allaic. II. 454. f, Icon. flor. Ross.
Altaic. illuslr. t. 3.S9. — Albo-lanala: squamis floralib. ovato-lanceolatis florem aequantib.; sepalis bifidis, lobis lanceolatis subaequalib. tubo corollae cylindri-cae incurvae breviorib.; labiis corollae subaequifloris, lobis labii inferioris ob-tusis denliculatis subaequalib.; filaraentis styloq. hirsutis, sligmate subbipartilo ; laciniis patentissimis. ^ — Differt ab 0. coerulescente sepalis minus profunde fissis tubo corollae brevioribus, coroliis amoene saturateque coeruleis, filamenlis slyloque semper hirsulis et loco natali arenoso. — Oabitat in deserto Kirghisico.

49. O. BOREALIS Turcz. Calal. pl. Baik. Dah. no. 877. in Bullel. de la soc. imp6r. des naturalistes de Moscou XV. no. IV, p. 722. — Albo-lanala: squamis caulinis floralibq. ovato-lanceolatis; sepalis bifidis, lobis lanceolatis subaequalib., tubo corollae cylindricae incurvae breviorib.; labiis corollae subaequifloris, superiore profunde bifido, inferiore trifido, laciniis obtusis denliculatis subaequalib.; fila-menlis styloq. glabris; stigmate subbipartito, laciniis patentissimis. 2^ — Simillima O. ammophilae, sed dislinguitur genitalibus glabris alque labio superiore corollae profunde bifido. — In montosis deserti Soongoro-Kirghisici prope Ajagus.

50. O. VARIEGATA Wllrlh. Gener. Orobanch. dcaax-u-^ 40, f — Rchb. Plant, critic. VIL fig. 903. 904. — Flor. Germ. excurs. 354. no. 2419. — Scapo basi leviter in-crassato; squamis bracleisq. ovalo-oblongis remolis furfuraceo-hirsulissimis, segmenlis calycinis ovato-lanceolatis in dentes lineares aequales divisis; corolla inflato-ventricosa, extus glanduloso-aspera dilutiore, intus purpurascente, labio superiore rotundato reflexo subintegro, inferiore trifido criso, lobo intermedio

produciore ; staminib. basi interna styloq. hirsutiusculis ; stigmate obcordato subdiviso. 2\|. — Scapus pedalis purpurascens. Spica 15-20-flora oblonga. Bractea corollam subaequans. Sepala hirsutissima. Corolla dilute flavescens, intus salutare purpurascens, labium superius retractum, margine replicatum, inferioris lacinia media major plicato-gibbosa, laterales rotundatae. — O. foetida DC. Flor. Franc. V. 392? (nec Dsf.) — O. Cytisi Duby, Bot. Gallic. 349. — Crescit parasitice in radicibus Sarothamni scopariae in Sicilia et Germania australi (6ei 3ns6vuf).

51. O. RETICULATA Wllrth. l. c. 42. | — Scapo subaequali, squamis ovato-oblongis munito; bracteis oblongo-lanceolata corollam aequanlib, hirsuto-furfuraceis ; calycis diphylly sepalis lanceolato-linearib. simplicib. corolla breviorib.; corolla

[Begin Page: Page 475]

OROBANCHE. OROBANCHEAE. 475

iuflato-lubulosa glandulosa, labio superiore emarginato venis saturationib, daedaleis nutrito, inferioris lobis rotundalis aequalib.; staminib. styloq. glabriusculis; stigmale sphaerico diviso. ^ — O. foetida Lapeyr. Abr. Pyr. l. 358? — O. elatior Fliigge mss. — Crescit in agro Tolotono.

52. O. BRACTEATA Vivian. Annali di Storia nat. IV. 235. — Calycib. bipartitis, laciniis lanceolatis acuminato-setaceis, corollam subaequantib.; bractea antica lanceolato-acuminata florem superante; coroliae labio superiore indiviso ovato-rotundato undulato, inferiore trilobo, lobis subaequalib. ovato-subrotundis crenato-undulatis; staminib. styloq. exsertis glabris. — Habitat in Corsica.

53. O. FOETIDA Dsf. Flor. Atlant. II. 59. t. 144. — Lnk. et Hfi^mnsgg. Flor. Portug.

I. 316. t t. 62. - Willd. Spec. planar. IIL 348. - Wllrth. Gener. Orob. diaexeu-fi

44. t — Scapo sensim in basin intumescente; bracteis lanceolatis acuminatis corollas superanlib. squamisq. remotis conformib. hirsuto-furfuraceis; segmentis calycinis (sepalis) ovato-lanceolatis in dentes linearis-subulatos divisis; corolla inflato-tubulosa nervosa (atro-purpurea), labio superiore profunde emarginato, inferioris lacinia intermedia rotundata porrecla lateralibq. subtrifidis denticulato-crispis; staminib. glaberrimis; stigmate bilobo connivente. C[^] — Scapus sesquipedalis, spica spithamea speciosa 50-70-flora. — O. barhata Broter. Fl. Lusitan.

I. 183. — O. fusca Lam. Encycl. mth. IV. 621. — O. major LngsdrfF. mss. — Orobanche major flore cucullato foetidissimo Tournef. ITerb. — Crescit in arenosus maritimis Barbariae, Lusitaniae et Hispaniae.

54. 0. SORDIDA C. A. Meyer mss. in Ledeb. Icon. flor. Ross. Alt. illustr. t. 386. — Ledeb. Flor. Aitaic. II. 455. t — Pubescens : squamis floralib. oblongo-lanceolatis flore duplo breviorib.; sepalis liberis bifidis, lobis lanceolatis subaequalib.; corollae cylindricae incurvae labiis subaequilongis, lobis labii iuferioris oblongis acutiusculis integerrimis planis, intermedio sublongiore; filamentis styloq. sub-hirsutis; stigmate bilobo. % — Valde affinis sequenti, sed omnino distincta. Differt enim pilis albis brevibus densis in tota plantae superficie, squamis floralibus longioribus flore duplo (non triplo) brevioribus, corolla sordide flavescente v. diluissime subfuscata (non amoene saturateque coeruleo-violacea), lobis labii inferioris integerrimis v. denticulis obsoletis perpaucis instruclis (non crebre aperteq. denliculatis). — Crescit rarissima in locis rupestribus montium Arkaul in deserto Soongarico-Kirghisico orientali non procul a lacu Saisan-Noor.

55. O. AMOENA C. A. Meyer mss. in Ldb. Icon. flor. Ross. Alt. illustr. t. 385. — Ldb. flor. Allaic. II. 457. t — Glabriuscula: squamis floralib. ovato-lanceolatis flore triplo breviorib.; sepalis liberis bifidis, lobis linearis-lanceolatis subaequalib.;

corollae cylindricae incurvae labiis aequilongis, lobis labii inferioris obtusiusculis denticulatis, intermedio sublongiore; filamentis basi hirsutiusculis , apice styloq. subglandulosis; stigmale bilobo. % — Scapus semipedalis. Corolla amoene saturate violaceo-coerulea, extus glandulis paucis adspersa, intus glaberrima tubulosa, leviter incurva, fauce modice ampliata. — Ab *O. arenaria* M. B., quacum labio corollae superiore bifido convenit valde differt squamis floralibus angustioribus longioribus, sepalis bifidis, lobis elongatis non brevissime bidentatis corolla denique quadruplo majore minus incurva. -- Crescit in locis rupestribus montium Arkaul in deserlo Soongarico-Kirghisico orientali non procul a lacu Saisan-Noor.

56. *O. ARENARIA* M. Bieberst. Flor. Tauric. Caucas. II. 83. — Glabrluscula: squamis lanceolatis; spica pauciflora, squamis floralib. corolla breviorib. sepalisq. glabriusculis; sepalis bifidis; laciniis corollae acutiusculis; staminib, glabris. 2|j

— Corollae coeruleae labium superius bifidum. — *Orobanche Cretica* procerior non ramosa, caule tenui, flore parvo subcoeruleo Tournef. Cor. 10. — *O. Cumana* Willrth. Gener. Orobanch. dcaaxsurj 58. — Rchb. Plant. critic. VII. t. 691. fig. ^6.

— Crescit in Podolia, Bessarabia, Tauria et Caucasia locis arenosis.

57. *O. ALBA* Stephan in Willd. Spec. plantar. III. 350. — [C. Koch, Linnaea XVII. 291?] — Scapo fulvo-villoso, squamis lanceolatis remotis munito; bracteis ovalis acutis tubo breviorib.; calycis diphyllic sepalis oblongis aculis; corollae lubulosae

[Begin Page: Page 476]

476 OKOBANCHEAE. orobanche.

labio superiori obcordalo, inferioris laciniis subaequalib. rolundatis denliculalis,
sligmate bilobo crasso. ^ — Scapus semipedalis glanduloso-rufescenli-pilosus.
Spica 1-3-pollicaris. Corolla speciosa alba cum purpura subeunte glandulosa.

— Orobanche major thyrso florum specioso Buxb. Cenlur. III. t. 2. (nec III. 2. t.
1. flg. 2.) — Crescit in Caucasi graminosis ubertim.

§. 2. Sepalis in parte posteriore basin versus concretis, antice liberis.

58. 0. MEDIA Dsf. Flor. Atlant. 11.59. — Scapo simplici piloso striato firmo; squa-
mis adpressis ovatis v. ovato-lanceolatis; florib. dense spicatis; bracteis ovalis
concavis calycem aequantib.; sepalis postice coalitis bifldis, laciniis anguste acu-
tis; corolla curvata calycem duplo superante, labio superiore bilobo, inferiore
irifido, lobis rotundatis subaequalib.; staminib. inclusis. 2]. — Corolla pallide
flavescens. — Crescit locis arenosis in Barbaria.

59. O. CERNUA Linn. Spec. plant. 882. — Wllrth. Geuer. Orob. dcaaxsurj 73. - Caule
simplicissimo; corollis recurvatis; bracteis ovatis corolla breviorib.; scapo nu-
diusculo. '2J. — Orobanche caule simplici, corolla incurva bracteis deltoideis lon-
giore Loeffl. Itin. 152. — Ex aucloritate Cl. C. A. Meyer species haec brevissime
et valde insufficienter descripta huc relala est. — Crescit parasitice in radicibus
Arlemisiae campestris in aridis Hispaniae.

60. 0. BICOLOR C. A. Meyer mss. in Ldb. Icon. fl. Ross. Alt. illustr. t. 390. - Ldb.
Flor. Allaic. II. 458. t — Furfuracea: squamis floralib. ovatis acutis, flore subdupo
longiorib.; sepalis bifidis v. indivisis, laciniis lanceolatis subaequalib.; corollae
cylindricae incurvae labio superiore sublongiore bilobo, lobis labii inferioris
parvis semiorbicularis denticulalis subaequalib.; filamentis basi puberulis, apice
styloq. glabris; stigmale emarginato. '^ — Scapus 4-8-pollicaris. Sepala rarius

indivisa, postice coalita, demum irregulariter erupta. Corolla valde incurva, fere
semiannularis albida v. dilutissime violacea, limbo saturate violaceo. — O. cernua
Pall. mss. — Crescit in deserto Soongoro -Kirghisico occidentali ad ripam rivuli
Tschuganka versus radicem montis Tschungistau.

61. O. CANESCENS Bunge. Mem. des div. sav. de St. Petersbrg. II. 124. — Albo-lanata:
squamis floralib. ovatis acuminatis florem excedentib.; sepalis postice basi con-
natis, altero bifido, altero trifido, lobis linearib. inaequalib. corollae cylindricae
incurvae labiis aequalib., superiore lato bilobo, inter lobos revolutos bidentato,
lobis labii inferioris rotundalis denticulatis; filamentis styloque glabris, stigmale
bilobo. ^ — Flores inlense coeruleo-violacei. — Typura novi generis praebere
videtur, ab Orobanchis calycis sepalis altero bifido, altero trifido, et labio corollae
superiore inter lobos bidentato diversi. — Crescit in Chine borealis monlosis
Lun-Zyan-ssy.

j- Species non satis notae.

62. O. RIGENS Loisel. Flor. Gallic. 384. ex G. Don, General syst. of gard. and bot.
IV. 628. no. 4. — Scapo glabro; squamis rigidis lanceolatis imbricatis pubescen-
tibus; florib. laxe spicatis; stylo staminib. glabris; laciniis labii corollini inferioris
acutiusculis; sligmatis bifidi lobis distantibus. 2j.? — Crescit in Corsica. — Spe-
cies e diagnosi data omnino non recognoscenda (sed cf. infra no. 65.).

63. O. SANGUINEA Prسل. Delic. Pragens. 176. — Pubescens: scapo simplici squa-
moso; squamis floralib. flores subaequantibus; spicis densis; corollae laciniis ae-
qualib. obtusis denticulatis; staminib. glaberrimis. 2(. — Crescit in Sicilia.

64. O. PLATYSTIGMA Rchb. Plant. critic. VH. p. 31., Flor. Germ. excurs. 353. no.

2409. — Stigmatis lobis deplano-securiformib. complicatis; stylo apice glanduliger; filamentis glabris ; antheris in vertice atque fissura brevi villo dehiscentib.; corolla brevi ampliala. ' ^ — Scapus robustus atropurpureus, bracteae sparsae remotae, spica densissima, flores ampli e testaceo purpureo-striati glandulosi.

— Crescit in Germania ausirali (Xmttbevcj tm ©aljlmrgifd^en).

65. O. NUDIFLORA Wllrth. Schedul. critic I. 310., Gener. Orobanch. dcaaxsur; 3i. t

— Rchb. Plant. critic. VII. fig. 883. 884. 916. — Scapo subaequali; squamis brac-

[Begin Page: Page 477]

OROBANCHE. OROBANCHEAE. 477 \

j

teisq. ovatis parce hirsulusculis; segmentis calycinis ovato-oblongis in dentes j

lineares subaequales bitidis; corolla ventricoso-subcampanulata inclinata gla- ^

berrima, labio superiore rotundalo emarginato crenulato, inferioris lobis lateralib. '

suorhombeis, interraedio ovato porrecto breviorib.; staminib. styloq. glaberrimis, stigmate emarginato inflexo. 1\l. — O. rigens Loisel. Fl. Gallic. II. 384? — O. mi- i

nor Flor. Danic. t. 1219? — Crescil parasitice in radicibus Pruni spinosae (6ci
Saiifanne).

66. O. CRINITA Viviani, Flor. Corsic. 11. — Scapo ad basin squamis linearib. elongatis obsoito, squamis floralib. linearib. acuminatis, extus pilosis, flore longiorib.; I corollis quadriditis incurvis subcylindricis, lobis rotundatis crenalo-ciliatis; filaments capsulisq. glaberrimis; stigmate bilobo recurvo. 2. — Spica elongata compacta, apice comosa. Corollae fulvae. — Crescit in Corsica prope San Bonifacio.

67. O. CRENATA Forsk. Aeg. Arab. 113. — Caule simplici viloso; corolla quinqueloba denticulato-crenata, stamina includente. — Crescit in Aegypto.

68. O. PURPUREA Linn. Suppl. 228. — Caule simplici ramoso; corollis quadrifidis; staminibus calcaratis. — Crescit in Promontorio bonae spei.

tt Species e genere expellendae.

O. ABORTIVA Leyss. = PHELIPAEA ARENARIA.

O. ACAULIS Rxb. = AEGINETIA ACAULIS.

O. AEGINETIA Linn. = AEGINETIA INDICA.

O. ALECTRA D. Dietr. = AULAYA CAPENSIS.

O. AMERICANA Linn. = CONOPHOLIS AMERICANA.

O. ARENARIA Brkhsn. = PHELIPAEA ARENARIA.

O. BIFLORA Nutt. = ANOPLANTHUS UNIFLORUS. ;

O. BRASILIENSIS Arrabida, Fl. Flumin. VL t. 63. = BESLERIA ?]

O. CAESIA M. Bieb. = PHELIPAEA CAESIA. \

O. CALIFORNICA Cham. et Schlehd. = PHELIPAEA CALIFORNICA. 1

O. CALOTROPIDIS Edgw. = PHELIPAEA CALOTROPIDIS. I

O. CAPENSIS Thnbrig. = AULAYA CAPENSIS. |

O. CARNOSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 61. = BESLERIA ?

O. CERNUA Arrabida 1. c. t. 71. = ?? \

O. CERNUA Pall. = PHELIPAEA COERULEA. >

O. COCCINEA M. Bieb. = ANOPLANTHUS COCCINEUS. ,

O. COERULEA Vill. = PHELIPAEA COERULEA. |

O. COMOSA Hook. = ANOPLANTHUS COMOSUS.]

O. COMOSA Willd. = PHELIPAEA ARENARIA. J

O. COMPACTA Viv. = PHELIPAEA COMPACTA.

O. CRENATA Arrabida, Fl. Flumin. VL t. 60. = ??

O. DELILEI Dcne. = PHELIPAEA DELILEI.

O. FASCICULATA Nutt. = ANOPLANTHUS FASCICULATUS.

O. FISSA Arrabida, Fl. Flumin. VL t. 69. = HYPOCYRTA ?

O. FLUMINENSIS Arrabida l. c. t. 62. = BESLERIA ?

O. FORNIX Arrabida, Fl. Flumin. VL t. 75. = HYPOCYRTA ?

O. FRAASII F. W. Schultz. = PHELIPAEA FRAASII.

O. GLABRA Hook. = BOSCHNIAKIA GLABRA. 1

O. HIRTA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 79. = GESNERIA ALLAGOPHYLLA j

O. INDICA Rxb. = PHELIPAEA INDICA. ^

O. INDICA Spr. = STRIGA OROBANCHOIDES. 1

O. INTERRUPTA Pers. = PHELIPAEA RAMOSA. i

O. LAEVIS Ehrh. = PHELIPAEA ARENARIA. i

O. LAEVIS Lam. = PHELIPAEA COERULEA. :

O. LONGIFLORA Pers. = PHELIPAEA LONGIFLORA. ;

O. LUDOWICIANA = PHELIPAEA LUDOWICIANA.

O. MELANCHOLICA Arrabida, Fl. Flumin. VL t. 77. =- HVPOCYRTA . -^

O. MONANTHEOS Arrabida l. c. t. 66. = HYPOCYRTA ?

[Begin Page: Page 478]

478 OROBANCHEAE. orobanche.

O. MONTANA Rudb. = CLANDESTINA RECTIFLORA.

O. PEDUNCULATA Arrabida, Fl. Flumin. VL I. 73. = ??

O. PEDUNCULATA Rxb. = AEGINETIA PEDUNCULATA.

O. PEDUNCULATA Viv. = PHELIPAEA PEDUNCULATA.

O. PERIANTHOMEGA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 68. = HYPOCYRTA ?

O. PHELIPAEA Wllrth. = PHELIPAEA TINCTORIA.

O. PHELIPAEA Willd. = PHELIPAEA VIOLACEA.

O. PURPURASCENS Gmel. = PHELIPAEA COERULEA.

O. PURPUREA Jcq. = PHELIPAEA COERULEA.

O. RACEMOSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 72. = RYDITOPHYLLUM PRASI-

NATUM.

O. RAMOSA Linn. = PHELIPAEA RAMOSA.

O. ROBUSTA Alb. Dietr. = PHELIPAEA ROBUSTA.

O. ROSSICA Cham. et Schlchtd. = BOSCHNIAKIA GLABRA.

O. SECUNDA Clus. = PHELIPAEA COERULEA.

O. SERPENS Arrabida, Fl. Flumin. VL t. 67. = HYPOCYRTA ?

O. SICULA Spenn. = PHELIPAEA SICULA.

O. SCHULTZII Mutel. = PHELIPAEA SCHULTZII.

O. SQUAMOSA Thnbrig. = AULAYA SQUAMOSA.

O. SPICATA Arrabida, Fl. Flumin. VL t. 78. = GESNERIA ALLAGOPHYLLA

O. TINCTORIA Forsk. = PHELIPAEA LUTEA.

O. TINCTORIA Willd. = PHELIPAEA TINCTORIA.

O. TUBEROSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 70. = ??

O. TUBEROSA Hook. = BOSCHNIAKIA HOOKERL

O. TUBULOSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 76. = ??

O. UMBELLATA Arrabida 1. c. t. 65. = ??

O. UNIFLORA Linn. = ANOPLANTHUS UNIFLORUS.

O. UITENHAGENSIS Ekl. = HARVEYA PURPUREA.

O. VENTRICOSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 74. = ??

O. VERTICILLATA Arrabida 1. c. t. 64. = ??

O. VIOLACEA Willrth. = PHELIPAEA VIOLACEA.

O. VIRGINIANA Linn. = EPIPHEJUS AMERICANUS.

,C. A. Meyer mss. ex Bngrd. Mem. de Tacad. imper. de St. Ptrsbrg. [N. Ser.] \\\

159. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225.)

1. B. (OROBANCHE Hook. Fl. Bor. Amer. II. 91. t. 167.) GLABRA C. A. Mejer mss.

ex Bngrd. 1. c. — Glaberrima: caule squamato, basi incrassato reticulato; squa-

mis cordalis acutis (siccitale) inlense fuscis opacis; calyce cyathiformi tridentato;

corollae tubo inflato, labio superiori elongato integro, inferiore abbreviato ob-

scure trilobo. 21. — Tuber pollice saepe crassior difformis solidus, radicibus

(Belulae ovatae??) lignosis insidet, caulem mox singulum, mox plures profert.

Scapus caulise simplicissimus crassissimus 6;-i0-12-pollicaris, squamis basi

obsitus densissime imbricatis, sursum dissitis sparsis. Squamae ovatae obtusae

acuminatae, inferiores subinde breviores omnino laeves, superiores (bracteae)

pilis albis crispatis ciliatae, calyce longiores, corolla breviores. Spica densissima

diamelro pollicari, basi paullulum relaxata majorem caulis occupans partem imo

fere integrum. Flores intra squamas brevissime pedicellali, calyce ebracteato, 6

circiter lineas longi. Calyx tubo corollae brevior monophyllus, pilis albis cris-

pato-ciliatus, subtruncatus v. inaequaliter quinquedeniatus, dente quinto postico

minimo, lateralibus majoribus, interdum luxurianibus. Corolla tubulosa ringens

glabra, pilis albis crispatis ciliata. Tubus brevis, labium superius fornicatum

porrectum bifidum v. saepius integrum, inferum minimum subtruncatum leviler

trilobum. Stamina 4 didynama raedio tubo inserita exserita, labio superiori bre-

viora. Filamenta basi dilataia subglandulosa, caeterum glabra. Aulherae iulrorsae

biloculares muticae. Stylus in labium inferum dellexus, stigma aequale. Capsula

BOSCHNIAKIA.

ORORANCHEAE. 479

subobliqua lentiformis. — Orobanche caule simplicissimo HUra climidium florifero
Gmel. Flor. Sibiric. III. 216. t. 46. fig. 2. — Orobanche Rossica Cham. et Schlchtd.
Ljnnaea III. 132. f — Stellara lathraeoides Fisch. mss. — Crescit in insula Cha-
missonis, ad Lenam et in Kamtschalka. — Kamlschadalis contra Haemoptysin
esl remedium.

2. B. HOOKERI WIprs. mss. — Glaberrima: scapo squamato, basi luberoso; squa-
mis ovatis acuminatis (siccate) intense fuscis opacis, tubere reticulato areolis
luberculiformib. pentagonis; spica densa; florib, unibracteatis; calyce cyathiformi
obliquo tridentato; corolla tubulosa bilabiata, labiis ereclis, superiore ovato in-
tegro, inferiore trilobo breviore, lobis ovali-oblongis obtusis erectis. ' — Para-

sitica in radicibus ? Scapus erectus simplex digitalis el ultra, squamosus,

basi in tuber reticulatum incrassatum squam^is laxiusculis fusco-nigrescentibus
tectum abiens. Flores in spicam elongatam congesti erecti paullulum curvati.
Slamina inclusa, Filamenta basi barbata. Antherae ovatae erectae apiculatae,
facie anteriori dehiscentes, rimis longitudinalibus superne junclis, Germen ovali-
subrolundum. Stylus supra curvatus. Stigma subquadrilobum, — Orobanche tu-
berosa Hook. Flor. Boreal. Americ. IL 92. t. 168, — Crescit in Americae borealis
ora occidentali.

4187. CLAXDESTI^A Tournef.

(Tournef. Instit. rei herb. 952, — Meisn, Gener. plant. vascul. L 314. II. 225.)

1. CL. RECTIFLORA Lam. Illustr. gener. t. 551. fig. 1. — Caudice hypogaeo ramoso squamalo; scapis brevissimis; florib. ex axillis squamarum solitariis longe pendunculatis strictis magnis coeruleis. 2(. — Clandestina flore subcoeruleo Tournef. Instit. rei herb. 952. — Lathraea Clandestina Linn. Spec. plant. 843. — Orobanche montana Rudb. Elys. II. 233. fig. 14, — Dentaria aphylllos Ray, Histor, 1230. — Moris, Oxon. Histor. III. 503. sect. 12. t. 16, fig. 15. — Crescit in locis umbrosis parasitice in radicibus arborum in Europa australi (in Gallia, Hispania et Italia).

4 188. L.ATHRAEA Linn.

(Linn. Gener. pl. no. 743. [excl. sp.] — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 314. II. 225.)

1. L. SQUAMARIA Linn. Spec. plant. 544. — Grtnr. De fructib. et seminib. I. 242.

t. 52. — Sm. Engl, bot. t. 50. — Flor. Danic. t. 136. — Schkhr. Bot. Hndbch. t. 70.

— Alb, Dietr, Flor, Borussic. IL t. 113. — Svensk bot. t. 316. — Rchb. Fl. Germ.

excurs. 357. no. 2431. — Koch, Synops, fl. Germ, (edit, 1,) 539, — Rhizoma crassum

ramosissimum, squamis brevibus carnosis dense imbricatis albidis undique ob-

situm; scapi plures semipedales crassi albidi, squamis sparsis albidis carnosis

instructi; flores in racemum unilateralem inclinalum collecti, breviter pedicellati

biseriali, squamis bracteantibus dorso pedunculi communi biseriatis crassis car-

nosis rubescentibus; calyx albido-rubescens; corolla calyce subdupo longior

albida, laciniis pallide purpurascentibus. 2]. — *Clandestina penduliflora* Lam. —

Blackw. Herb. t. 430. — *Squamaria Orobanche* Scopol. Flor. Carniol. 760. — Rivin.

Monop. irregul. t. 89. fig. 2. — *Amblatum* Dodon. Pemptad. 553. fig. 1. — Crescit

parasitice in radicibus arborum fruticumque frondosorum (praesertim *Coryli*

Avellanae) per totam fere Europam et in Himalayaem montibus.

/9, *erecta* C, Koch, Linnaea XVII. 291. — *Erecta* (nec *cernua*) coeruleascens: brac-

leis ovalis; calyce piloso inflato; corolla labulosa exserta, labio superiori

galeato, inferiori erecto subtrilobo; staminib. exsertis, antheris albo-villosis;

florib. densiorib. horizontalib. nec cernuis. ^ — Crescit in Somchetiae sylvis

carpineis. — Specie differre videtur.

t Species e genere expellendae.

L. ANBLATUM Linn. = *ANOPLANTHUS TOURNEFORTH*.

L. CLANDESTINA Linn. = *CLANDESTINA RECTIFLORA*.

L. PHELYPAEA Forsk. = *PHELIPAEA RAMOSA*.

L. PHELYPAEA Linn. = *PHELIPAEA LUTEA*,

L, PHELYPAEA A Linn. = *ANOPLANTHUS COCCINEUS*.

L. QUINQUEFIDA Forsk. == PHELIPAEA LUTEA.

[Begin Page: Page 480]

480 OROBANCHEAE.

4189. AXOPLAXTHrS Endl

(Endl. mss. el Iconogr. gener. t. 72. — Meisn. Gener. planl. vascular. 1. 314. II. 225.

— Anoj)lon Wllrth. Gener. Orobanch. Scacxsu-^ [Orobanches sect. 3. — nec Zoolog.]

— Anoplon G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 633.)

Sectio I. EUANOPLON Endl. Gener. plant. p. 727.

Corollae tubus longus incurvus, limbus patens. Scapus brevis v. obsoletus,
pedunculos elongatos graciles unifloros, basi squama vaginatos promens.

1. A. UNIFLORUS Endl. Iconogr. gener. t. 72. — Pedunculis unifloris longissimis gra-
cillimis hirtellis, basi squamis vaginaeformib. munitis, scapum radicalem obsoletum
longe superantib.; corolla tubulosa incurva, labio superiore bifido, laciniis la-
bium inferius trifidum aequantib. extus margineq. ciliatis; staminib. slyloq. glabris;
stigmate capitato emarginalo. 2]. — Habitus Pinguiculae. Scapus radicalis squamis
paucissimis ovatis crassiusculis acutis semiamplexicauli-decurrentibus munitus,
sesquiuncialis glaberrimus subsimplex pallide fuscescens, squamae florigerae
oblusae tenuiter pubentes. Pedunculi quadripollicares uniflori. Calyx campanu-
lalus quinquefidus ebracteatus, denles ovato-acuminati hirsuti. Corolla tubulosa

incurva longitudinaliter striata hirsuta pallide coerulescens subbiabiata quinquefida, laciniae ovato-oblongae obtusae aequales tenuiter ciliatae. Antherae glabrae. Capsula ovata. — Dentariae seii Aahlato cordi affinis, /lore pallide coeruleo Gronov. Virginic. 70. — Gentiana minor aurea, flore simplici amplio deflexo pallide flavescente Pluken. Mat. 29. t. 348. fig. 1. — Orobanche uniflora Linn. Spec plantar. 882. — Orobanche [Phelipaea Spr. Syst. vegetab. II. 818.) biflora Nutt. Gener. plant. Americ. II. 59. — Hook. Flor. Boreal. Americ. II. 93. — Anoplion biflorum G. Don I. c. 634. no. 4. — Crescit in Virginia, Canada et New Foundland.

2. A. COMOSUS Wiprs. mss. — Pubescens: caule brevi densissime fasciculatum ramoso; ramis squamosis; calyce quinquepartito ebracteato, laciinis lanceolatis acuminatis (nec subulatis ut ait auctor); corollae tubo longe exerto curvato, labiis elongatiis recurvis, superiori oblongo bifido, inferiori trifido, laciinis linearis oblongis, apice bidentatis; antheris pilosis. ^ — Planta quadripollicaris corymbo-so-ramosa, caulis sesquipoliicaris, densissime squamatus, squamae ovato-acuminatae breves. Pedunculi pollicares squamae linearis, calycis basin subattingentes supra medium vaginatim inclusi. Calyx fere basin usque quinquefidus breviter pilosulus. Corolla calyce ultra duplo longior, pollicaris, tubo parum incurvo, labium superius breviter bifidum, laciniae labii inferioris aequales, ad labiorum incisuram usque sectae, apice breviter bifidae paientim recurvae. Stylus apice fere reclangule inclinatus glaber, stigma infundibuliforme capitatum. Capsula ovata glabra. — Orobanche comosa Hook. Fl. Bor. Americ. II. 92. t. 169. — In ripis fl. Columbiae crescit.

3. A. FASCICULATUS Wiprs. mss. — Pulverulento-pubescent: caule brevi fasciculatum ramoso; ramulis seu pedunculis nudis unifloris; calyce quinquefido ebractealo, lobis triangularibus acutis; corollae tubo longe exerto curvalo, labiis erectis concavis brevibus, superiore bifido, inferiore trifido, laciinis integris; fia-mentis glandulosis, antheris glabris. ^ — Planta 2'/2-4-5-pollicaris. Scapus

simplex squamatus, squamae ovatae obtusae, floriferae acutiusculae. Pedunculi
solitarii ebracteali pollicares ex axillis squamarum 4-6 ultimorum. Calyx brevis
cupuliformi-campanulatus, breviter quinquedentatus. Corolla calyce mulloides
longior tubulosa incurva, laciniae tubo 4-5-ies breviores, superiores binae allius
coalitae, cum tubo piloso-pubescentes. Stylus glaber, sub apice deflexus, stigma
capitato-infundibuliforme. — Orobanche {Phelipaea Spr. Syst. vegetab. II. 818.)
fasciculata Nutl. Gener. plant. Americ. II. 59. — Hook. Flor. Bor. Americ. II. 93.
t. 170. — Anoplone fasciculatum G. Don I. c. 633. no 3. — Crescit in America bo-
reali (Saskatchewan, Columbia).

[Begin Page: Page 481]

ANOPLANTHUS. OROBANCHEAE. 481

4. A. COCCINEUS Wprss. mss. — Pinguis glaberrimus: scapo gquamis semlam-
plexicauli-vaginantib. remolis munilo in pedunculum unitlorum terminalem pro-
lenso; calyce monoptiyllo ebracleato irrculariler quinquefido; corolia inflato-
ventricosa quinquefida, lobis subaequalib. ovalo-rotundalis. ^ — Phelipaea
(Anoplone G. Don, General syst. of gard. and bol. IV. 633.) Tournefortii Dsf. Ann.
mus. d'hist. natur. X. 298. t. 21. — Phehpaea [Anoplone C. A. Mey. Verzeichn. der
Pflnzn. am Cauc. 104.) Biehersleinii Fisch. rass. — Phelipaea (Orobanche M. Bieb.
Fl. Casp. 58., Flor. Taur. Caucas. III. 418., Pl. rar. Ross. II. t. 58.) coccinea Pers.
Euchir. II. 181. — Wallrlh. Gener. Orob. dtaaxsu-^ 68. f — Lathraea Phelypaea /9,
tinn. Spec. plant. 844. — Pheli/paea orientalis, flore coccineo Tournef. Coroli. 47.
t. 479. — Lathraea Phelipaea Guldenst. Itin. I. 422. — [Phelipaea foliata Lamb.

Transact. of the Linn. Soc. X. 260. t. 7. — Spr. Syst. vegetab. II. 818??] — Aegi-
netia coccinea Juss. mss. — Orobanche Phelipaea M. Bieberst. Fl. Casp. Appndx.

179. — Crescit in Armenia, in Tauria, Caucasia et in Sibiria versus mare Caspium. — Planlam Tournefortianam a Biebersleiniana specie differre valde dubitamus simul cum Cl. Wallroth,

Sectio II. ANBLATDM EndL 1. c.

Corollae tubus brevis venlricosus, limbus bilabiatus. Scapus squamis raaclusculis amplexicaulibus vaginatus in pedunculum uniflorum desinens.

5. A. (AMBLATUxM G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 635.) TOURNEFOR-TII WIprs. mss. — Corollae labiis indivisis, ^1 — Lalhraea Anblatum Linn. Spec. plant. 844. — Anblatum orientale, flore purpurascente Tournef. Coroll. 48. t. 481.

— [Phelipaea foliata Lamb.??? — Cf. speciem praecedentem!] — Stirps a nemine post Tournefortium visa, valde dubia! — Crescil in Orienle.

4190. AEGIXETIA Linn.

(Linn. Spec. plant. [edit, 1.] 632. — Meisn. Gener. plant. vascular. I. 314. II. 224. —

G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 635.)

1. AE. INDICA Rxb. Plant. of the coast of Coromand. I. 63. t. 91. — Bth. Scrophul. Indic, 55. — Scapo elongato subsimplici nudo; corollae limbo breviter quadridifo. 2]. — (W^all. Catal. 3964.) — Orobanche Aeginetia Linn. Spec. plantar. 883.

— Tsiam-Cumulu Rheede, Hort. Malabar. XI. 97. t. 47. — Corolla curvata purpurea, calyx flavescentia. — In India orientali (Nepalia, Silhet, Circars, Taong Dong,

Tavoy, Dheyra Dhoun, Kidarkonta etc.) crescit.

2. AE. (OROBANCHE Rxb. Hort. Benghal. 45. et Fl, Indic. III. 29.) PEDUNCULATA

Wall. Plant. Asiatic. rario, IIL 13. f t. 219. — Glabra: scapo simplici squamis
paucis allenuatis carnosis instructo, squamis floralib. triangularib.; calyce spa-
lhaceo monophyllo interiore latere fisso; corollae tubo inflato calycem aequante;
limbo quinqueparlito subaequali, segmentis reniformib. denticulatis; filamentis
glabris; stigmate magno cordato-peltalo. 2f — Pedunculi uniflori scapum aequan-
tes. Flores maximi. Corollae tubus luteus, limbo obscure violaceo. Calyx liquore
viscoso repletus est. Stamina inclusa. Capsula ovata. — Crescit parasitice in ra-
dicibus Andropogi muricati et Bambusarum complurium in Benghalia.

3. AE. ABBREVIATA Hamilt. mss. in Wall. Catal. 3965. — Bth. 1. c. — Wlprs. Nov.

Act. acad. Caes. Leop. Carol. nat. curios. XIX. Suppl. I. 400. — Caule brevis-
simo ramoso (v. simplici) squamato; corollae ampliae limbo bilabiato, labio in-
feriore ample trilobo. 2|- — Crescit in Peninsula Indiae orientalis et in Manilla.

4. AE. (OROBANCHE Rxb. Flor. Indic. III. 29. et Plant. of the coast of Coromand.

t. 292.) ACAULIS W^prs. mss. — Acaulis: florib. in capitula irregularia radicalia
sessilia congestis; calycib. monophyllis spalhaceis unilateraliter fissis v. irregula-
riter bifidis; corollae laciniis crenatis; antheris simplicib., duabus interiorib.
glandula magna recurva ovali auctis; stigmate peltato. O — Bracieae triangula-
res, pedicellum unum v. plures includentes. Corolla extus purpurea, inlus flava.

— Crescit parasitice in radicibus China sugar-cane (11) in horto botanico Cal-
cullensi.

[Begin Page: Page 482]

482 OROBAINGHEAE, aeginetia.

t Species e genere expellendae.

AE. CAPITATA Grah. = LIPOSTOMA CAPITATUM.

AE. COCCLNEA Juss. = ANOPLANTHUS COCCINEUS.

AE. LONGIFLORA Cav. = BOUWARDIA LONGIFLORA.

AE. MULTIFLORA Cav. = BOUWARDIA CAVANILLESII.

4191. HYOBAXCHE Thnbrig.

(Thnbrig. ex Linn. Mantiss. plant. 263. — Meisn. Gener, plant. vascul. I. 314. II. 224.

— G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 635.)

1. H. SANGUINEA Linn. 1. c. — Syst. veget. 574. — Endlich. Iconogr. gener. I. 82.

— Tota planta sanguinea: spica villosa; flores purpurei, ^? — Petiv. Gaz. t. 37.

fig. 4. — H. coccinea Linn.mss.? — Crescit parasitice in radicibus ? in Pro-

montorio bonae spei.

Oenns dnbimn.

4192. EPIRHIZAXTHIS Blurne,

(Blume, Catal, hort, Buitenzorg. ex Flora [B. Z.] 1825. p. 133. — Meisn. Gener.

plantar. vascular. I. 314. II. 224.)

1. E. CYLINDRICA Blume I. c. 134. — Spicis densis cylindricis; germine oblongo; stylo crasso minimo. ^? — Crescit in insula Java.

2. E. ELONGATA Blume 1. c. — Spicis laxis elongalis; germine globoso; stylo simplici. ^? — Crescit in insula Java.

3. E. LINEARIS Blume 1. c. — Spicis minimis tenuissimis; germine globoso; stylo setaceo. ^j.? — Crescil in insula Java.

Onera affinia*

4l92/<i. PHOLIf^MA Nutt.

(Nutt. mss, in W. J. Hook, Icon. planlar. t. 626.)

Calyx profunde sexpartitus, laciniis linearis-subspatulatis. Corolla mo-

nopetala infundibuliformis, limbo subregiari scxlobo, lobis rotundalis

plicatis, aestivatione imbricatis. Stamina (> supra medium tubi inserta

inclusa uniserialia aequalia, cum lobis corollae alternanlia. Filamenta

brevia. Anthcrae oblongo-ovatae obtusae bioculares, loculis prope margi-

nem longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium superum subglobosum, ad

circumferentiara multiloculare, loculis uni-ovulatis, ovulis ad angulum

internum circa axin crassissimum affixis. Stylus elongatus crassiusculus

inclusus. Stigma dilatum, centro depresso, margine lobato-dentato.

Fructus immaturus baccatus?? loculis seminibusque ut in ovario. Semina

ex angulo interiori pendentia. — Herba succulenta colorala (parasitica?)

in arenosis Californiae proveniens facie Orobanches aphylla, scapo simplici

squamoso, floribus parvis densissime spicatis ut videtur ebracteatis.

1. PH. ARENARIUM Nutt, mss. in Hook, I, c, — Planta septem pollices alta habitu

Orobanchen v, Phelipaeam referens. Scapus erectus simplex dense el subimbri-

catim squamatus, squamae e basi aequilata elliptico-oblongae oblusae adpressae.

Florum spica bipoliicaris, pollicem crassa ovalis nulliflora. Calycis laciniae li-

neari-subspalhulatae acutiusculae, margine dorsoquc pilosulaec, orollae tubo pa-

rum breviores. Corolla infundibuliformi- tubulosa , ore leviter constricto, limbi

sexfidi laciniae rotundatae oblusae undulato-crenatae aequales patentes. Fila-

menta antherarum longitudine. Stylus stamina aequat. — Crescit locis arenosis

in California (Monterey et St. Diego).

4192/2. LEWOA Llawe et Lexarza.

(Llawe et Lexarza, Nov. veget. Mexic. descript. I. 7. — Meisn. gener. plant. vascul.

I. 254. II. 164. — *Corallophyllum* H, B. Klh. Nov. gcn. et spec. planl. VII. 276. t

I, 660bis, — Kth, Synops. pl. aequin. IV. 267. — Endl. Gener. pi. p. 1329. no. 6361.)

1, **L. MADREPOROIDES* Llawe et Lexarza 1. c. — *Corallojhyllum coeruleum* H.

B. Klh. 1. I. c. c. — Crescit parasilice in radicibus ? in Mexico.