

FLORE FRANÇAISE

DESTINÉE AUX

HERBORISATIONS,

OU

DESCRIPTION DES PLANTES

GROISSANT NATURELLEMENT EN FRANCE, OU CULTIVÉES POUR L'USAGE
DE L'HOMME ET DES ANIMAUX,

AVEC

L'ANALYSE DES GENRES

ET LEUR TABLEAU D'APRÈS LE SYSTÈME DE LINNÉ;

Ornée de planches représentant les caractères de 550 espèces
critiques;

PAR A. MUTEL,

Capitaine-commandant d'artillerie, Chevalier de la Légion d'honneur,
ancien élève de l'École Polytechnique, membre correspondant des
sociétés d'histoire naturelle de Strasbourg, Falaise, etc., auteur de
la Flore du Dauphiné, d'une Arithmétique et d'une Géométrie
adoptées par l'Université.

*Exponere non confundere naturam;
sed evidenter conjuncta non disjungere.*

TOME SECOND.

PARIS,

Chez F. G. LEVRULT, rue de la Harpe, n.° 81;
STRASBOURG, même maison, rue des Juifs, n.° 33.

1835,

no 9891

que glabres, anthères blanchâtres, barbues; style parsemé de poils glanduleux; stigm. jaunâtre, glabre, à 2 lobes divariqués. — Diffère de l'*O. fatida* Desf. par la couleur, par les bractées ternées, par le cal. d'une seule pièce, par le manque d'odeur, etc.

29. *O. RAMEUSE.* — *O. ramosa* (L. — Schultz Beitrag, avec fig. Rchb. cent. 7. f. 993. 994. Bull. méd. 399. Eng. bot. 184. Mut. t. 43. f. 313. *O. du Chanvre* Vauch. t. 16). Tige de 4-10 po., pubescente, peu écailleuse, d'un violet pâle ou jaunâtre, rameuse, rar. simple; cal. pédicellé à 4-5 lobes égaux, atteignant au plus le milieu du tube de la cor. étroite, courbée; style, anthères et filets presque glabres; stigm. blanchâtre, presque glanduleux, à 2 lobes. — Varie à tige de 10 po., très-rameuse. — Fl. bleuâtres, pâles à la base, petites, ord. peu nombreuses, lâches (été).

Sur le *Chanvre*, le *Tabac*, le *Sarsin*, etc. C. 4

Obs. J'ai récolté à Bone sur les coteaux escarpés au bord de la mer, au milieu de plusieurs légumineuses, probablement sur l'*Anthyllis tetraphylla*, une *Orobanchée* que j'avais rapportée en var. à cette espèce. M. Schultz, à qui je l'ai communiquée, me marque qu'après l'avoir com-

parée avec toutes les *Orobanches* de son herbier et avec toutes les descriptions, il a reconnu que c'était une nouvelle espèce très-distincte, qu'il a nommée *O. Muteli* (Schultz Mut. t. 43. f. 314. [cor. étalée]). — Plante de 3-4 po., presque simple ou rameuse (sèche), d'un brun violet, blanchâtre-pubescente et presque laineuse; écailles inf. plus serrées, plus étroites, les sup. éparses et les bractées largement ovales, égalant le tiers de la cor.; fl. très-brièvement pétiolées, à bractées latérales linéaires-lancéolées, adhérent à la base du cal. qui les dépasse; cal. bleu-violet, blanchâtre à la base, fendu presque jusqu'au milieu en 4-5 lobes lancéolés-acuminés; cor. longue de 8-9 l., striée-nerveuse, blanchâtre à la base, bleu-violette, blanchâtre-pubescente en dehors, presque glabre en dedans, embrassant étroitement l'ovaire, rétrécie-étranglée au-dessus de lui, presque droite, tubuleuse-en entonnoir, à gorge renflée, très-large, à lobes de la lèvre infér. presque égaux, largement arrondis, presque crénelés; étam. blanchâtres, très-glabres, insérées au 8.^e inf. de la cor., larges et épaisses jusque vers le milieu à l'étranglement du tube, filiformes au-dessus, n'atteignant pas les lobes de la cor.; anthères blanchâtres presque très-glabres; ovaire ovale-arrondi; style presq. glabre; stigm. petit, peu distinct, presq. trifide.

Phrase: Calix monophyllus, 4-5 dentatus, dentes lanceolato-acuminati; corolla penes recta, tubus medio supra ovarium anguste constrictus, faux inflata latissima, lobi labii inferioris rotundati subcrenulati; stamina basi corollæ inserta, subglabra; antheræ glaberrimæ; stigma parvum subtrifidum (Schultz).

II. *CLANDESTINE.* — *LATHRÆA* L. — Cal. large, en cloche, à 4 lobes; cor. tubuleuse à 2 lèvres, la sup. en casque; ovaire glanduleux à la base; stigm. à 2 lobes; valves de la caps. à placenta large solitaire. — Fl. en grappe unilatérale.

1. *C. ÉCAILLEUSE.* — *L. Squamaria* (L. — Eng. bot. 50. Fl. dan. 136. Schk. 70. Sv. bot. 316). Tiges de 2-6 po., très-simples, dressées, écailleuses à la base; pédoncules penchés. — Fl. purpurines ou blanchâtres (m.).

Haies, bois froids; Fontaine et Gières près Grenoble (Mut.); Montfermeil près Paris; Côte-d'Or, etc. (Lorey). 4

2. *C. SOUTERRAINE.* — *L. clandestina* (L. — Lam. ill. t. 551. f. 2. — *Madrone*, *Herbe cachée*, *Herbe de la matrice*, *Clandestine de Léon*). Tigerameuse, presq. souterraine, écailleuse; pédoncules dressés. — Fl. purpurines (av. m.).

Lieux ombragés, surtout dans l'Ouest; Picardie (Tillette); Rennes, Anjou, le Mans, Nantes, Sables d'Olonne, le