

CXCIV. PHYLLIS Linn. gen. n. 323. Gærtn. fr. 1. p. 123. t. 25. Juss. mém. mus. 6. p. 370. A. Rich. mem. soc. h. n. Par. 5. p. 140. t. 12. f. 3. — Nobula Adans. fam. 2. p. 145. — Baplevroides Boerh. — Valerianellæ spec. Dill.

Calycis tubus obovato-compressus, limbus obsoletus. Corolla brevè tubulosa, limbo patente 5-lobo. Stam. 5, antheris ad faucem sessilibus.

RUBIACEÆ.

579

Stylus subnnullus. Stigmata 2. Capsula obovata compressa apice nuda bipartibilis, mericarpiis 1-spermis (ex Gærtn.) ex axi filiformi centrali (ut in Knoxiâ et Umbelliferis) pendulis ex A. Rich. axi centrali nullo. Semen erectumocco conforme, albumine carnosâ, embryone erecto dorsali, radiculâ filiformi, cotyledonibus cordatis foliaceis. — Frutex glaber, rami teretes. Folia opposita aut 3-4 verticillata acuminata. Stipulæ membranaceæ petiolis adnatæ in setas plurimas filiformes productæ. Panicula terminalis composita. Flores parvi ex albo virescentes.

1. P. NOBLA (Linn. spec. 335.). ♂ in insulis Canariis. — Dill. elth. 405. t. 299. f. 386. Paniculæ multifloræ. (v. v. c. et s. sp.)

♂. pauciflora, pedunculis 1-3-floris folio brevioribus. ♂ hab. cum priore. Phyllis pauciflora A. Rich. mem. soc. h. n. Par. 5. p. 141. (v. s.)

CXCV. GALOPINA Thunb. diss. nov. gen. 1. p. 3. Juss. mém. mus. 6. p. 371. Crus. rub. cap. p. 18. A. Rich. mem. soc. h. n. Par. 5. p. 140. — Anthospermi spec. Thunb. prodr.

Flores hermaphroditi. Calycis tubus obovatus, limbus minutissimus vix ullus. Corolla subrotata 4-partita. Stamina imæ corollæ inserta, antheris oblongis. Styli 2 in stigmata longissima pilosa abeunt. Fructus obovato-didymus constans mericarpiis 2 commissurâ planâ coadunatis demùm separatis indehiscentibus 1-spermis dorso gyroso verrucosis. — Herba glabra Circæ facie. Caulis teres lineis 2 angulatus. Folia opposita ovato-lanceolata acuminata basi attenuata. Stipulæ 3-furcatæ. Panicula terminalis laxa. Flores parvi.